

This is a title and this is too

Paulo Henrique Brasil Ribeiro
UFSCar, ICMC

Milene Regina dos Santos
UFSCar, ICMC

Mathews
UFSCar, ICMC

Resumo Na atualidade, o volume de dados existentes sobre as pessoas como um todo tem sido cada vez maior. Essas informações podem ser utilizadas entre outras coisas para construir informações e posteriormente análises e ilações sobre os indivíduos estudados. Dados mais “completos” podem ser utilizados para captação de padrões, possibilitam deduzir sobre os demais. No presente trabalho, utilizando técnicas de Regressão Logística num banco de treinamento no intuito de inferir se a renda das pessoas no banco de validação excede 50 mil dólares. Também faremos a apuração de precisão destas predições e demais métricas referentes ao modelo ajustado.

Keywords: stylesheet, glossa, article

Tabela 1: e

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

Tabela 1

1 Introdução

Seção 1

As presentes informações foram extraído por Barry Becker no banco de dados Censo de 1994 e um dos locais onde está disponível disponibilizada em [University of California, School of Information and Computer Science - Machine Learning Repository](#) ¹.

Os dados de treinamento são compostos inicialmente de 32561 observações e 13 variáveis:

- Idade
- Trabalho
- Escolaridade
- Anos de estudo


¹ Acessado em 09/jul/2022 - 11h40m

- Estado civil
- Profissão
- Raça
- Sexo
- Ganho de capital
- Perda de capital
- Horas trabalhadas (por semana)
- Nacionalidade
- Renda anual
- Grupo ($\leq 50k$, $> 50k$)

Enquanto os dados de teste ou validação compõe as mesma variáveis porém com 16282 observações. Considerado uma quantidade relativamente grande de observações em ambos as partições, decidiu-se manter essa proporção de 67% e 33%

Sendo variável resposta uma variável binária categoria (relacionada ao evento de interesse a Renda anual ser maior do que \$50.000), decidiu-se efetuar a modelagem com o através de regressão logística. Para os aspectos inferenciais a seguir, admitiu o nível de significância ($\alpha = 0,01$) visto a quantidade de expressiva observações.

1.1 Regressão Logística




1.2 Motivação

Na atualidade, o volume de dados existentes sobre as pessoas como um todo tem sido cada vez maior. Essas informações podem ser utilizadas entre outras coisas para construir informações e posteriormente análises e ilações sobre os indivíduos estudados. Dados mais “completos” podem ser utilizados para captação de padrões, possibilitam deduzir sobre os demais.

No presente trabalho, utilizando técnicas de Regressão Logística num banco de treinamento no intuito de inferir se a renda das pessoas no banco de validação excede 50 mil dólares. Também faremos a apuração de precisão destas predições e demais métricas referentes ao modelo ajustado.

2 Análise exploratória

2.1 Associação



3 Transformação e Seleção de variáveis

Uma forma bastante utilizada para a transformação de variáveis contínuas em categóricas, ou a recategorização de uma variável discreta,

A criação de categorias para as covariáveis de natureza contínua ou o reagrupamento das discretas é baseada no teste de associação Qui-Quadrado, buscando a melhor categorização da amostra com relação a cada uma dessas covariáveis ou conjunto delas

Como o presente trabalho possui como foco principal na construção do modelo a predição, a seleção de variáveis foi executada de formas que privilegiam a precisão do ajuste, dando menor importância a interpretabilidade do modelo, portanto tendeu-se a modelo mais saturados com inúmeras variáveis preditoras

3.1 Modelo encaixados - Aula 21 - 45

Para seleção do modelo utilizou-se a estratégia com uma sequência de modelos encaixados nas duas “direções”:

- Começar do modelo nulo e adicionar uma nova variável categórica, que é escolhida por ser aquela que mais aumenta a ‘Deviance’ [vide equação (3.1)] entre os os modelos, efetuado isso repetidas vezes até que a adição de nenhuma variável seja significativa através do teste de F para um dado nível de significância e após isso avalia-se as variáveis quantitativas,
- A partir do modelo saturado e remover uma nova variável categórica, que é escolhida por ser aquela que menos aumenta ‘Deviance’ entre os modelos, efetuado isso repetidas vezes até que a remoção nenhuma variável seja significativa através do teste de F para um dado nível de significância, após isso avalia-se as variáveis quantitativas.

Onde a estatística de teste se dá por:

$$D^* = -2 \sum_{i=1}^n \left[y_i \left(\frac{\hat{\pi}_i}{y_i} \right) + (1 - y_i) \log \left(\frac{1 - \hat{\pi}_i}{1 - y_i} \right) \right]$$

Outro método similar de seleção método de variáveis regressoras muito utilizado que também aplicou-se nesse estudo foi o stepwise AIC. Este método possibilita a determinação de um conjunto de variáveis estatisticamente significantes ao utilizar os critérios de AIC num conjunto de ajustes avaliados.

Tabela 2: dnaokl

Resid. Df	Resid. Dev	Df	Deviance
32543	23953.69	NA	NA
32517	23801.39	26	152.3037

3.2 Modelo Final

$$\hat{Y} = X\beta$$

3.3 Curva Receiver Operating Characteristic (ROC)

[1] 0.5624863

3.4 Ponto de corte

3.5 Outliers e Pontos de influência

3.6 Resíduo - Aula 22 50min

3.7 Comparação nas estimativas com a retirada dos pontos influentes

Tabela 3: eopvno

	Modelo Final	Modelo sem pontos influentes	Diferença (%)
(Intercept)	-7,937	-7,936	0
est_Never-married	-1,795	-1,789	0,003
est_Separated	-1,94	-2,25	-0,16
ans__	0,351	0,351	0
cptl	0	0	-0,015
sexMale	1,369	1,375	-0,005
hr__	0,029	0,029	0,002
classeOthers	-0,227	-0,232	-0,022
classeProduction	-0,141	-0,143	-0,01
classeService	-0,562	-0,564	-0,002
idad	0,021	0,021	0,005
trblOthers	-0,112	-0,093	0,169
trblPrivate	0,037	0,042	-0,125
trblSelf-emp	0,143	0,135	0,055
raceAsian-Pac-Islander	0,556	0,554	0,004
raceBlack	0,411	0,418	-0,016
raceOther	-0,028	-0,025	0,116
raceWhite	0,713	0,717	-0,006
edccLiberal	-0,254	-0,28	-0,104
edccNon-Grad	-0,019	-0,021	-0,113
est_Never-married:trblOthers	-0,834	-0,679	0,186
est_Separated:trblOthers	-9,764	-10,332	-0,058
est_Never-married:trblPrivate	-0,172	-0,177	-0,032
est_Separated:trblPrivate	0,074	0,269	-2,645
est_Never-married:trblSelf-emp	0,634	0,632	0,004
est_Separated:trblSelf-emp	-0,233	-0,177	0,243
est_Never-married:sexMale	-0,534	-0,541	-0,013
est_Separated:sexMale	0,407	0,612	-0,502
sexMale:trblOthers	-0,708	-0,735	-0,039
sexMale:trblPrivate	-0,036	-0,045	-0,268
sexMale:trblSelf-emp	-0,54	-0,535	0,009
sexMale:classeOthers	-0,162	-0,158	0,027
sexMale:classeProduction	-0,667	-0,668	-0,003
sexMale:classeService	0,027	0,027	0
trblOthers:edccLiberal	-0,208	-0,312	-0,501



Figura 1: glossa

	Modelo Final	Modelo sem pontos influentes	Diferença (%)
trblPrivate:edccLiberal	-0,188	-0,151	0,198
trblSelf-emp:edccLiberal	0,562	0,604	-0,076
trblOthers:edccNon-Grad	-0,546	-0,417	0,236
trblPrivate:edccNon-Grad	0,023	0,02	0,16
trblSelf-emp:edccNon-Grad	0,904	0,905	0
est_Never-married:edccLiberal	0,684	0,656	0,041
est_Separated:edccLiberal	0,735	0,374	0,491
est_Never-married:edccNon-Grad	0,721	0,782	-0,084
est_Separated:edccNon-Grad	-0,713	-10,933	-14,34

3.8 Matriz de confusão e predições

Com o auxílio da curva ROC podemos escolher um ponto de corte igual a 0,29. Assim, as medidas relacionadas ‘a capacidade preditiva do modelo são: SENS = 0,75, SP EC = 0,76, V P P = 0,58, V P N = 0,87, CAT = 0,76 e MCC = 0,48, o que é indicativo de uma boa capacidade preditiva. Esta conclusão é corroborada pela curva ROC apresentada na Figura 2.1.

4 Conclusões e interpretações dos parâmetros

Figura 1
2

² Examples in footnotes are numbered with lower case Roman numerals enclosed between brackets:

- (i) a. Colorless green ideas sleep furiously.

b. *The child seems sleeping.

More text can follow the example.