



- Сведения конфиденциального характера -

Медицинский Центр Ассута

Рамат-А-Хаяль

Отделение онкологии

А-Барзель 20, Тель-Авив 69710, Израиль

Тел.: +973 – 7645177

Факс: +973 – 7645119

Эл. почта: cimo@assuta.co.il

Пациент: Жерлицина Анастасия

Уд. /л. №: ME923960-9

Дата рождения: 25/04/1976

Возраст: 47

Пол: Ж

Адрес: А-Барзель 20, Тель-Авив-Яффа

Телефон: 03-7645177

Дата консультации: 07/06/2023

«Конфиденциальные медицинские данные»: информация, содержащаяся в данном документе, защищена законом о неприкосновенности частной жизни. Разглашение данной информации является нарушением закона.

Заключение специалиста - онкологическое отделение

Телемедицинская консультация по Zoom

Клинический диагноз:

Диагноз	Код	Сторона	Дата	S/P	M/P	Rec
Гастроинтестинальная стромальная опухоль (ГИСО)	H89363					

Обсуждение и заключение

Дата и время последнего осмотра: 07/06/2023 в 12:57.

Отчет / обсуждение:

Проведена Zoom – консультация с братом пациентки Егором.

В сентябре 2022 г. у пациентки диагностированы метастазы печени, абдоминальные поражения, опухоль желудка.

Результаты патоморфологического исследования образца ткани, взятого из печени: выявлена лейомиосаркома.

Пациентка начала лечение препаратами Gemzar, Taxotere и Razoranib, в результате чего наблюдались в основном неврологические побочные эффекты. Ревизия выявила гастроинтестинальную стромальную опухоль. Тот же результат получен в ходе лабораторных анализов, проведенных в Израиле, при помощи окрашивания гена cKIT и дефицита гормона SDH.



Месяц назад пациентка начала приема препарата Imatinib в дозировке 400 мг в день, без каких-либо побочных эффектов.

Результаты геномного тестирования: выявлена мутация KIT Q556_V559DelinsHis. По данным портала cBioPortal описано всего три случая такой мутации при ГИСО и ни одного случая при лейомиосаркоме матки.

Рекомендации:

- Продолжить прием препарата Imatinib. Мы обсудили возможные побочные эффекты лечения.
- Через три месяца лечения пройти повторное ПЭТ-КТ – исследование, чтобы оценить ответ на лечение.
- Рассмотреть возможность проведения эндоскопического УЗИ в целях обнаружения первичной опухоли в желудке.
- Если ответа на лечение не произойдет, возможно, стоит взять повторную биопсию для оценки дефицита гормона SDH и мутации гена cKIT, которые, согласно специальной литературе, являются взаимоисключающими. Если будет выявлен дефицит гормона SDH, препарат Imatinib принимать не рекомендуется.
- Генетическое тестирование на герминальную мутацию – вся панель анализов. Можно подумать о применении теста Tempus в обоих анализах – специфичного к гормону SDH.
- Необходимо следить за результатами исследования матки: обнаруженные образования считаются доброкачественными, однако за ними необходимо последующее медицинское наблюдение.

estherta@assuta.co.il

С уважением,

Д-р Эстер Таховер

Специалист в области онкологии

№ медицинской лицензии: 80855

/Подпись/