



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КЛІНІКА
"ІННОВАЦІЯ"**

07352, Київська область, Вишгородський район,
село Лютіж, вулиця Вітряного, 69-А

Код за ЄДРПОУ 36076865

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
№ 028/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України від 14.02.2012 року
№ 110

(у редакції наказу МОЗ України
від 08 серпня 2014 року № 549)

Консультаційний висновок онколога

1. Найменування закладу охорони здоров'я, який направив пацієнта на консультацію

2. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

Жерліцина Анастасія Станіславівна

3. Дата народження 25.04.1976

4. Спеціальність, прізвище, ім'я, по батькові лікаря-консультанта

Лікар онколог Лаціннікова Оксана Миколаївна

5. Результати лабораторного дослідження

6. Результати функціонального, рентгенологічного та інших спеціальних досліджень:

7. Висновок спеціаліста (встановлений діагноз):

Основний: Діагноз: GIST шлунку з вторинним враженням печінки.

Стан після EUS-FNA біопсії шлунку (21.04.2023), core-біопсії

печінки (25.04.2023), гістологічно - гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD).

Стан після трепан-біопсії печінки (28.08.2022 р. НІР). ПГЗ: лейоміосаркома матки.

Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (МРТ ОЧП, ОМТ 14.10.2022, КТ 01.12.2022).

Виявлено мутації Kit, MET (повногеномне секвенування ONCOMINE, 12.2022).

Лікування Пазопанібом 05-12.01.2023р. з розвитком синдрому задньої зворотньої енцефалопатії та позитивною динамікою по даним КТ від 09.02.2023р.

Повторна біопсія печінки (23.01.2023р., Оберіг). ПГЗ: метастаз лейоміосаркоми матки.

Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектідин з мінімальною негативною динамікою по даним ПЕТ-КТ (11.04.2023): Відомі маси в печінці та маса ліворуч, що за конфігурацією скоріш походить зі стінки шлунку незначно збільшилися, метаболічно активні. Маси в матці та в біля правого яєчника з низькою метаболічною активністю, структурно стабільні. Істотна різниця в активності мас печінки/шлунку та матки дозволяє припустити різні неопластичні процеси, зокрема , первинно агресивну з шлунку/GIST.

Первинна біопсія від 08.2022р. в процесі перегляду в лабораторії CSD.

15 травень 2023

М.П.

Лікар-консультант

/Лаціннікова Оксана Миколаївна /

**Завідувач поліклініки або
стаціонарного відділення**

Супутній діагноз: Залізодефіцитна анемія. Цукровий діабет 2 тип. Гіповітаміноз Д.

Закритий відламковий перелом дистального метаепіфізу лівої променевої кістки зі зміщенням відламків (11.02.2023р.)

Стан на фоні лікування Іматинібом (з 03.05.2023) з клінічною вираженою позитивною динамікою.,

8. Рекомендації:

1. Продовжити прийом Іматиніба по 400 мг/доба з контролем ефективності ПЕТ-КТ/КТ через 3 міс.
2. При нудоті - Зофетрон по 8 мг (1 таб) всередину 1- 3 рази на день , максимальна добова доза - 32 мг (4 таблетки на добу), також можливий прийом Церукалу по 10-20 мг (1-2 таблетки), до 6 таблеток на день, у 2-3 прийоми.
3. При явищах мукозиту (почервоніння, набряклість, виразка слизової ротової порожнини) - почати обробку ротової порожнини оральними антисептиками (орасепт, гивалекс, стоматидин), при погіршенні стану - дифлюкан по 150 мг всередину (за узгодженням).
4. Дотримання питного режиму - вживання не менше 2 -2.5л рідини на добу (вода РЕО) (під контролем діурезу та показників артеріального тиску!)
5. При сухості шкіри – використання жирних кремів та косметичних масел, при сухості кон'юнктиви – краплі «Штучні сльози» або «Хіло-Кеа». При сухості слизової носа – спрей «Аква-Марис» або «Х'юмер», «Марімер», масляні розчини хлорофіліпту, масло обліпихи, оливкова олія. Обробляти слизову оболонку носа синтоміциновою маззю 2-3 рази на день 10 днів.
6. Загальний аналіз, біохімічний аналіз крові 1 раз на міс.
7. При запорах - Дуфалак по 20 мл 1 раз на день щодня після сніданку.
8. При проносі почати Імодіум-2 капс. одразу, потім по 1 капс. після кожного епізоду рідкого випорожнення (до 8 капс на добу).
9. При погіршенні самопочуття-тел. чергового лікаря 096 8151618
10. Еліквіс по 2.5 мг 2 рази на день тривало.
12. Контроль рівня віт Д3 через 1 тиждень.
13. Виконувати рекомендації ендокринолога.
14. Гепавіста -детокс по 1 таб мг 2 рази на день.
15. Кальцій+вітД3 (1000мг Кальція /доба) 1 міс.
16. Контрольний огляд через 1 міс

15 травень 2023

М.П.

Лікар-консультант

/Лациннікова Оксана Миколаївна /

Завідувач поліклініки або
стаціонарного відділення
