7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

Скарги: загальна слабкість. Анамнез захворювання: хворіє з 08.2022, коли було виявлено множинне білобарне ураження печінки, парагастральне утворення та утворення малого таза. Первинно процес трактувався як метастатична лейоміосаркома матки, у зв'язку з чим отримувала системну терапію гемцитабіном, доцетакселом, бевацизумабом, надалі пазопанібом та трабектедином, без стійкого ефекту. Після повторних біопсій і перегляду гістологічного матеріалу у 2023 році діагноз переглянуто на GIST шлунка з метастатичним ураженням печінки. З 03.05.2023 отримувала іматиніб 400 мг/добу з вираженою метаболічною відповіддю та стабілізацією захворювання до 2025 року. З 06.2026 за даними ПЕТ-КТ відзначено прогресування метастатичного ураження печінки. Молекулярне дослідження від 08.2026 виявило первинну мутацію KIT exon 11 та вторинні мутації KIT exon 13 і exon 18, що відповідають резистентності до іматинібу. За даними ПЕТ-КТ від 23.09.2026 — подальше метаболічне прогресування множинних вогнищ печінки. Розглядались локорегіонарні та хірургічні методи лікування; термоабляція вогнища лівої частки визнана технічно недоцільною. 30.09.2026 призначено регорафеніб 160 мг/добу, лікування на момент госпіталізації не розпочато. Пройшла МОК в умовах ННЦХТ. Госпіталізована в плановому порядку в IV відділення ННЦХТ для оперативного лікування. Копії усіх обстежень прикріплені до історії хвороби. З основних обстежень: 02.10.2026 ЕКГ Ритм синусовий регулярний з ЧСС 70/хв. Вертикальна ЕВС. ЕКГ графіка - без патологічних змін. 23.09.2026 ПЕТ-КТ від надрівних дуг до с/3 стегна ПЕТ/КТ-ознаки приросту метаболічної активності в множинних вогнищах ураження паренхіми печінки в порівнянні з ПЕТ/КТ від 19.06.2026р., що характерно для прогресії основного захворювання. Стабільне низькоінтенсивне утворення тіла матки та стабільний метаболічний вузол тіла матки без вираженої динаміки. Зберігається стабільне FDG-негативне утворення тіла шлунку. Фіксація РФП в стравоході може відповідати запальному генезу, проте, рекомендовано дообстеження - ЕГДС. нших даних за FDG- позитивний патологічний процес не виявлено. 02.10.2026 ФЕГДС Еритематозна гастропатія. Дуодено-гастральний рефлюкс жовчі. 02.10.2026 ВКС Стан після апендектомії (1982р.). Поодинокі (3) неоплазії товстої кишки. Ендоскопічні ознаки доліхосигми. Хронічний внутрішній геморой. 06.10.2026 ПГД №422/26 ННЦХТ Фрагмент утворення шлунку представлений гіалінізованою тканиною, без вітальних клітин пухлини, що може бути наслідком проведеної терапії. У матеріалі трепан-біопсії печінки - метастаз гастроінтестинальної стромальної пухлини (GIST), веретеноклітинний варіант, Low Grade. 14.10.2026 Цитологія №996/26 CSD За міжнародною класифікацією (IRSSFC) – категорія AUS (Atypia of undetermined significance) якість зразка та техніка приготування препаратів, відсутність цитоблоку, не дають можливість цитологічно визначити походження клітин в щільних групах (враховуючи клінічний діагноз). Страховий анамнез: лікарняний лист – не потребує, на момент госпіталізації на лікарняному листку не перебуває. Анамнез життя: зі слів пацієнтки, туберкульозом, венеричними та іншими інфекційними захворюваннями не хворіла. Соматичні захворюваня: заперечує. Прийом препаратів на постійній основі: див. в IX. Алергологічний анамнез: заперечує. Онкологічний анамнез: див. діагноз. Перенесені операції: 1982 – Апендектомія. 05.10.2026 - Діагностична лапароскопія. Інцизійна біопсія новоутворення шлунка. Трепан-біопсія вогнищевого утворення Sg II-III печінки під УЗ-контролем. Інфекційний анамнез: не обтяжений.

Група крові: O(I) Rh –

Аналізи:

Дата	Назва аналізу	Результат
20.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 5,34 Г/л (4,0 - 8,4); Нейтрофіли (NEU, відносна кількість) 51,9 % (40,0 - 75,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 37,6 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 5,3 % (1,0 - 9,0); Еозинофіли (EOS, відносна кількість) 4,4 % (0,5 - 5,0); Базофіли (BAS, відносна кількість) 0,8 % (0 - 1); Нейтрофіли (NEU#, абсолютна кількість) 2,78 Г/л (1,80 - 6,30);

		Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 2,01 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,28 Г/л (0,1 - 0,7); Еозинофіли (EOS#, абсолютна кількість) 0,23 Г/л (0,03 - 0,4); Базофіли (BAS#, абсолютна кількість) 0,04 Г/л (0 - 0,1); Еритроцити (RBC) 3,14 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 112 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 31,6 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,6 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 35,7 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 354,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 12,7 % (12,0 - 15,0); Тромбоцити (PLT) 265,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 9,0 фл (7,0 - 10,0); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,0 фл (9,0 - 17,0); Тромбокрит (PCT) 0,238 % (0,108 - 0,282); Швидкість осідання еритроцитів (ESR) 28 мм/год (2 - 15);
20.10.2026	A34030 - Аналіз; біохімія	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 24 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 29 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 11,0 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 2,1 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 5,0 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 71,1 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 99,0 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 3,9 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 91 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 247 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 69 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 20 Од/л (< 30); Альбумін 39,6 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 4,35 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 140,1 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 104,1 ммоль/л (98,0 - 107,0);
20.10.2026	B34025 - Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)	Фібриноген [Маса/об'єм] у Плазмі, бідній тромбоцитами Методом коагуляції: 350 (мг/дл); Протромбіновий індекс (ПТІ): 97 (відсоток); Міжнародне нормалізоване відношення у Крові Методом коагуляції: 1.02 ((мнв)); Протромбіновий час: 13.5 (секунда)
21.10.2026	A34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 8,09 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,74 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,29 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 6,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 21,5 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 3,6 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,9 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,53 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 86 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 25,5 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,8 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 34,1 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 338,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,8 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 47,6 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 160,7 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,4 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,120 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,0 фл (9,0 - 17,0);
21.10.2026	B34029 - Аналіз; коагулограма	Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 20,1 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 54 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,58 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,3 г/л (2,0 - 4,0); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 35,4 сек (30,0 - 45,0);
22.10.2026	A34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 7,86 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 0,87 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,13 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 6,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 11,1 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 1,6 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 87,3 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,46 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 83 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 24,8 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,8 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,9 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 336,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,9 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 48,0 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 141,6 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,7 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,110 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,9 фл (9,0 - 17,0);
22.10.2026	A34030 -	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 558 Од/л (< 41);

	Аналіз; біохімія	Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 530 Од/л (< 40); Білірубін загальний (ВТ, DPD) 17,8 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Креатинін 71,9 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 4,5 ммоль/л (< 8,3); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 555 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 57 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 16 Од/л (< 30); Альбумін 34,1 г/л (35,0 - 50,0);
22.10.2026	В34029 - Аналіз; коагулограма	Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 20,4 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 53 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,60 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,3 г/л (2,0 - 4,0);
23.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 6,59 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,06 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,14 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,4 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 16,1 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,1 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 81,8 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,26 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 78 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 22,8 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 100,9 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 34,3 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 340,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 11,8 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 47,6 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 127,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,6 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,8 фл (9,0 - 17,0);
23.10.2026	А34030 - Аналіз; біохімія	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 322 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 261 Од/л (< 40); Білірубін загальний (ВТ, DPD) 19,7 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 5,2 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 4,8 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 55,3 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 67,1 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 4,0 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 147 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 321 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 62 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 15 Од/л (< 30); Альбумін 34,7 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 3,70 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 134,8 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 101,0 ммоль/л (98,0 - 107,0);
23.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 6,37 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,12 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,19 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 17,7 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,9 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 79,4 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,68 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 91 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,3 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 98,1 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,8 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 344,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,8 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 108,6 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 7,5 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,080 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 17,3 фл (9,0 - 17,0);
24.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 6,19 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 0,95 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,12 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 5,1 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 15,3 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 2,0 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 82,7 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,78 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 93 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 27,0 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,1 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,6 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 346,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,3 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 117,5 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,9 фл (9,0 - 17,0);

25.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 5,23 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,04 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,30 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 3,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 19,9 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 5,8 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,4 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,73 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 92 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,6 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,4 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,7 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 345,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,4 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 122,1 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,100 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 18,3 фл (9,0 - 17,0);
26.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 5,27 Г/л (4,0 - 8,4); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,20 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,17 Г/л (0,1 - 0,7); Гранулоцити (GRN#, абсолютна кількість) 3,9 Г/л (1,6 - 7,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 22,8 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 3,2 % (1,0 - 9,0); Гранулоцити (GRN, відносна кількість) 74,0 % (42,0 - 85,0); Еритроцити (RBC) 2,65 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 89 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 25,7 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 97,0 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 33,4 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 345,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 13,2 % (12,0 - 15,0); Ширина розподілення еритроц. по об'єму (RDW-SD) 51,2 фл (35,0 - 56,0); Тромбоцити (PLT) 144,5 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,1 фл (7,0 - 10,0); Тромбокрит (PCT) 0,120 % (0,108 - 0,282); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 18,0 фл (9,0 - 17,0);
26.10.2026	А34030 - Аналіз; біохімія	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 77 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 61 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 9,4 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 2,5 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 5,4 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 53,7 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 62,0 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 3,6 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 134 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) 215 Од/л (200 - 450); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 52 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 28 Од/л (< 30); Альбумін 33,6 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 3,88 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 135,0 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 97,9 ммоль/л (98,0 - 107,0);
26.10.2026	В34029 - Аналіз; коагулограма	Протромбіновий час (ПЧ, PT, сек) 14,5 сек (10 - 17); Відсоток протромбіну за Квіком 87 % (80 - 110); Міжнародне нормалізоване відношення (INR) 1,10 (0,90 - 1,20); Фібриноген (за Клаусом) 2,7 г/л (2,0 - 4,0); Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 36,5 сек (30,0 - 45,0);
26.10.2026	А33007 - Аналіз; посів на флору і чутливість до антибіотиків	Біоматеріал Вміст черевної порожнини; Виділений мікроорганізм Ріст не виявлено;
30.10.2026	А34011 - Клінічний аналіз крові	Лейкоцити (WBC) 6,68 Г/л (4,0 - 8,4); Нейтрофіли (NEU, відносна кількість) 66,2 % (40,0 - 75,0); Лімфоцити (LYM, відносна кількість) 19,8 % (19 - 47); Моноцити (MON, відносна кількість) 9,0 % (1,0 - 9,0); Еозинофіли (EOS, відносна кількість) 4,7 % (0,5 - 5,0); Базофіли (BAS, відносна кількість) 0,3 % (0 - 1); Нейтрофіли (NEU#, абсолютна кількість) 4,43 Г/л (1,80 - 6,30); Лімфоцити (LYM#, абсолютна кількість) 1,32 Г/л (1,2 - 3,6); Моноцити (MON#, абсолютна кількість) 0,60 Г/л (0,1 - 0,7); Еозинофіли (EOS#, абсолютна кількість) 0,31 Г/л (0,03 - 0,4); Базофіли (BAS#, абсолютна кількість) 0,02 Г/л (0 - 0,1); Еритроцити (RBC) 2,64 Т/л (4,2 - 4,6); Гемоглобін (HGB) 94 г/л (119 - 145); Гематокрит (HCT) 26,2 % (34 - 46); Середній об'єм еритроцитів (MCV) 99,2 фл (80,0 - 100,0); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 35,6 пг (28,0 - 33,0); Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) 359,0 г/л (315,0 - 355,0); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) 14,4 % (12,0 - 15,0); Тромбоцити (PLT) 273,0 Г/л (156,0 - 327,0); Середній об'єм

		тромбоцитів (MPV) 9,6 фл (7,0 - 10,0); Ширина розподілу тромбоцитів (PDW) 16,3 фл (9,0 - 17,0); Тромбокрит (PCT) 0,262 % (0,108 - 0,282);
30.10.2026	A34030 - Аналіз; біохімія	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) 42 Од/л (< 41); Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) 38 Од/л (< 40); Білірубін загальний (BT, DPD) 6,1 мкмоль/л (5,0 - 21,0); Білірубін прямий (BD, DPD) 1,6 мкмоль/л (< 3,4); Глюкоза 6,9 ммоль/л (3,9 - 6,1); Білок загальний 56,7 г/л (65,0 - 85,0); Креатинін 91,5 мкмоль/л (53,0 - 115,0); Сечовина 9,2 ммоль/л (< 8,3); Амілаза 144 Од/л (20 - 104); Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH, IFCC) 212 Од/л (< 247); Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP, IFCC) 58 Од/л (35 - 118); Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT) 27 Од/л (< 30); Альбумін 37,7 г/л (35,0 - 50,0); Електроліти: Калій 4,84 ммоль/л (3,50 - 5,30); Натрій 127,7 ммоль/л (135,0 - 145,0); Хлор 91,9 ммоль/л (98,0 - 107,0);
30.10.2026	B34025 - Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)	Протромбіновий індекс (ПТІ): 89 (відсоток); Протромбіновий час: 14.3 (секунда); Міжнародне нормалізоване відношення у Крові Методом коагуляції: 1.08 ((мнв)); Фібриноген [Маса/об'єм] у Плазмі, бідній тромбоцитами Методом коагуляції: 350 (мг/дл)
02.11.2026	A34030 - Аналіз; біохімія	Білок загальний 55,0 г/л (65,0 - 85,0);
03.11.2026	D37001 - Аналіз; гістопатологія; травлення	**ПГЗ №4488/26:** **1. Гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, веретеноклітинний варіант з явищами лікувального патоморфозу IIIст. (визначаються поодинокі групи CD117-позитивних клітини на фоні гіалінізованої тканини, що займають до 1% об'єму). У лімфатичних вузлах прилеглого фрагменту малого чепця – реактивна гіперплазія (2 шт.). У тканині печінки метастази гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунку, High Grade (мітотичний індекс >5/50 полів зору x400), у вигляді двох поруч розташованих утворень: одне з них з вираженою кістозною трансформацію, друге у вигляді солідного вузла. В обох метастатичних вогнищах на фоні поширених ділянок гіпоклітинного гіалінозу (прояв лікувального патоморфозу) наявні осередки збереженого пухлинного росту. Лікувальний патоморфоз пухлин печінки II-IIIст. Краї резекції по тканині печінки та шлунку без ознак пухлинного росту (R0). Хронічний атрофічний холецистит, у лімфатичному шийки жовчного міхура (1шт.) – явища синусового гістіоцитозу. ypT2 ypN0(0/2) ypM1(hep), High Grade, R0. ICD-O-4 code 89360/3.** **2. У жировій клітковині малого чепця поруч зі стінкою шлунку, в окремо надісланому фрагменті жирової клітковини та у фрагменті тканини, що була надана на експрес-гістологію – осередки росту десмоїдного фіброматозу. ICD-O-4 code 88210/1.**

Обстеження:

Дата	Назва аналізу	Результат
20.10.2026	11700-00 - [ЕКГ]	Синусовий ритм з чсс 72 уд. ВЕВС. Графіка без патологічних змін.
20.10.2026	55113-00 - Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі	Атеросклероз аорти. Дегенеративні зміни мітрального клапану.Порожнини серця не розширені.Нормокінезія.Систолічна функція міокарда хороша.ФВ 70%
26.10.2026	55036-00 - Ультразвукове дослідження черевної порожнини	Ліва доля печінки - неоднорідна, в/п ж/п не розширені. В 3 сегменті, на межі з 2 сементом, з лівою портальною веною - неоднорідне гіпоехогенне утворення 4.5 x 4.0 см. По краю резекції, без додаткових утворень. В ч/п, порожнині м/т - рідинних скупчень не виявлено.
30.10.2026	55036-00 – УЗД ОЧП	В черевній порожнині, порожнині малого тазу - вільної рідини немає.

05.11.2026	**Консультація лікаря-онколога (Петельський П.В.)**	Д-з: GIST шлунку cT2N0M1 (hep), (ypT2N0M1(hep)), IV стадія. Стан після терапії іматинібом та хірургічного лікування. Рек-но: 1. Регорафеніб 40 мг 4 таб. 1 р/добу протягом 21 дня. 2.Контроль КТ ОГП, ОЧП, ОМТ із в/в к.п. через 1 місяць.

Оперативне втручання:

Дата	Час	Код процедури/ хірургічної операції	Назва процедури/ хірургічної операції	Спеціаліст
21.10.2026	09:10	92514-29	Загальна анестезія	Лисенко А. Ю.
21.10.2026	**13:10**	**30443-00** **30418-00** **30520-00**	**Правобічна гемігепатектомія. Холецистектомія. Клиновидна резекція шлунку**	**Федоров Д.О.**

Післяопераційний період протікав без ускладнень. Станом на 05.11.2026 дані за гостру хірургічну патологію відсутні.

Пацієнтка в задовільному стані виписується під нагляд та лікування хірурга, онколога та сімейного лікаря за місцем проживання. Усі рекомендації надано.

8. Лікувальні і трудові рекомендації:

1. Спостереження та подальше лікування у хірурга та сімейного лікаря за місцем проживання.
2. Догляд за п/о раною: перев’язки 1р/день розчином «Бетадин».
3. Суворе обмеження фізичного навантаження та обов’язкове носіння післяопераційного бандажу протягом 3 місяців.
4. Омепразол (Нольпаза/Проксіум/Нексіум/Контролок) по 40 мг/2 на добу – 07:00, 19:00 – за умови прийому НПЗП.
5. Німесил 1 пакетик - при потребі.
6. Контроль КТ ОГП, ОЧП, ОМТ із в/в к.п. через 1 місяць.
7. Подальше лікування та спостереження у лікаря-онколога за місцем проживання. Консультація видана на руки.
8. Рекомендовано експертний перегляд гістологічних препаратів (скелець) з метою отримання незалежного патоморфологічного висновку (second opinion) з приводу «осередків росту десмоїдного фіброматозу». ПГЗ видано на руки.
9. Консультація в ННЦХТ за результатами КТ з вирішенням питанням про другий етап хірургічного лікування новоутворень лівої частки печінки.

Лікуючий лікар **Олександр Остапишен**

Завідуючий відділенням **Олег Симонов**

05.11.2026 року

44. ЛИСТОК ОГЛЯДУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТАМИ

05.11.2016 GIST шлунку $cT_2N_0M_1$(hep.)
~~[illegible]~~ (ур T_2N_0 ур M_1(hep)) [illegible]
Стан після терапії іматинібом
та хірургічного лікування

Рекомендовано

1) Регорафеніб 40 мг 4т × 1 р/добу
21 день

2) КТ - контроль через 1 міс

П. Євтушенко