



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп» Лікарня ізраїльської онкології LISOD Місце провадження діяльності: 08270, Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вул. Малишка, 27 Код в ЄДРПОУ 32109302	Медична документація
	Форма первинної облікової документації № 028/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14.02.2012 N 110
Консультаційний висновок спеціаліста	

1. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта ID 110889 Жерліцина Анастасія Станіславівна

2. Дата народження 25.04.1976

3. Спеціальність, прізвище, ім'я, по батькові лікаря-консультанта Лікар-онколог Єрмаков Максим Сергійович

4. Скарги:

5. Результати лабораторного дослідження:

6. Результати функціонального, рентгенологічного та інших спеціальних досліджень:

7. Висновок спеціаліста (встановлений діагноз)

Код за МКХ-10: C16.9 - Злоякісне новоутворення шлунка, неуточнене

Діагноз:

Лейоміосаркома тіла матки, T2NxM1, вторинне ураження печінки, брюшини. Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін + Доцетаксел + Авастин з прогресією хвороби в печінці (за даними КТ, МРТ від 10/2022). Виявлена мутація C-KIT, MET (ONCOMINE). Стан після лікування Пазопанібом (05-12/01/2023) з розвитком синдрому задньої зворотньої енцефалопатії та позитивною динамікою за даними КТ.

01/2023 - повторна біопсія печінки. ПГД - метастаз лейоміосаркоми матки. Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектидін з негативною рентгенологічною динамікою (ПЕТ/КТ від 11/04/2023). Підозра на наявність синхронної неоплазії шлунку (GIST?). Стан після EUS-FNA біопсії шлунку, core-біопсії печінки, гістологічно - гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD).

08/2023 - стан після 4-х місяців лікування Іматинібом з вираженою позитивною радіологічною (ПЕТ/КТ) відповіддю.

03/2025 - стан після 2х років лікування Іматинібом з позитивною клінічною картиною.

05/2025 - стабільна радіологічна динаміка на тлі лікування Іматинібом.

07/2026 - повернення пристінкових компонентів в відомих печінкових ураженнях на тлі терапії Іматинібом протягом 3.5 років.

8. Рекомендації:

Перехід на терапію Сунітінібом 50 мг 1-28 дні з подальшою перервою 2 тижні.



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Огляд онколога + ПЕТ/КТ в порівнянні або КТ грудної, черевної порожнини і тазу з контрастуванням через 3-4 цикли.

30.07.2026

М.П.

Лікар-онколог

Єрмаков М.С.

(П.І.Б.) (підпис)

Якщо у Вас є пропозиції або зауваження щодо роботи нашої лікарні, повідомте нам на «Гарячу лінію лікарні LISOD» - 0 800 50 51 58 (безкоштовно з будь-яких телефонних номерів в межах України).