

12.12.2022 Protocol of ultrasound examination of abdominal organs

Liver:

Enlarged, +7 cm. The right lobe of the liver: oblique vertical size 220mm, thickness 136mm. Left lobe of the liver: craniocaudal size 64 mm, thickness 49 mm. Diffusely compacted, inhomogeneous structure due to a cystic formation that occupies almost 80% of the liver, with clear even contours and heterogeneous content due to multiple membranes and ossified areas of free fluid, the size of the formation is 180x132x156mm. With color doppler and power doppler, blood flow is not determined.

Gallbladder: Not determined

Pancreas: Due to the large size of the liver, it is not reliably determined.

Additional formations: not detected

Spleen: 129x68mm. Located typically. Non-homogeneous structure due to the formation of the liver, which is closely adjacent to the gate of the spleen, of normal echogenicity. The contour is even, clear. The vascular pattern is unchanged.

Conclusion:

Hepatosplenomegaly. A large solid-cystic formation of the liver. Gallbladder and pancreas are not reliably determined.

Consultation with an oncologist is recommended.

12/21/2022 Ultrasound consultation before minimally invasive intervention

The patient has uterine leiomyosarcoma with multiple secondary foci in the liver and retroperitoneum. Directed to address the issue of possible puncture or drainage of cystic lesions in the liver under ultrasound control.

Ultrasound examination in the liver reveals large (up to 16 cm in diameter) foci of heterogeneous mixed solid-cystic structure containing multiple cystic cavities, occupying up to 20% of the volume of foci.

Percutaneous aspiration or drainage of the cystic component of the tumor is inappropriate.

Control examination after chemotherapy.

ІННОВАЦІЯ

онкологічна клініка

Міністерство охорони здоров'я України

ТОВ "Медична клініка "Інновація"
тел. (044) 331-21-00, (067)
503-59-22

Ліцензія АЕ 459319 від 27.08.2014
видана МОЗ України

Протокол органів чер

Пацієнт **Жерліцина Анастасія Станіславівна**, 46 років

Телефон № (м):0685975246

ЕМК № 7140773

Документ №

Картка № Амбулаторна карта №28689 від 12.12.2022

Відділення Поліклінічне відділення

Печінка

Розміри

- мм (права доля) - мм (ліва доля)

Опис

Збільшена, + 7см. Права доля - товщина - 49мм. Дифузно змінена, яке займає майже 80% печінки, з множинних перетинок та осередків, розміром 180x132x156мм. При КД та ЕД - к

Об'ємні утвори

+

Choledoch - мм

Жовчний міхур

Розміри

довжина - мм, ширина - мм.

Опис

Не визначається.

Підшлункова залоза

Розміри

- х - х - мм.

Опис

Через великі розміри печінки дост

Додаткові утвори ☒ не виявлені.

Селезінка

Розміри

129 x 68 мм.

Опис

Розташована типово. Не однорідно до воріт селезінки, звичайної ехоген

Об'ємні утворення ☐

Наявність рідини в черевній порожнині ☐

Лімфатичні вузли з заходом магістральних судин черевної
Стан черевної аорти -

УЗ - Ознаки

Гепатоспленомегалія. Велике солідно-кістозне утворення п
визначаються.


Рекомендовано

Консультація онколога.

УЗ контроль

в динаміці

Лікар УЗД



ІННОВАЦІЯ

онкологічна клініка



Міністерство охорони здоров'я України

ТОВ "Медична клініка "Інновація"

тел. (044) 331-21-00, (067)

503-59-22

Ліцензія АЕ 459319 від 27.08.2014

видана МОЗ України

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО 36076865

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 0 2 8 / 0

Затверджена наказом МОЗ України

14.02.2012 р. № 110

**Протокол УЗ-дослідження
органів черевної порожнини**Пацієнт **Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 років**

Телефон № (м):0685975246

ЕМК № 7140773

Документ №

Картка № Амбулаторна карта №28689 від 12.12.2022

Відділення Поліклінічне відділення

СК

Поліс №

Координатор

від 12.12.2022 13:11:00

Лікар **Христенко Олександр Олександрович**

Апарат УЗД Toshiba Aplio 500

Умови дослідження після підготовки

Печінка

Розміри

- мм (права доля) - мм (ліва доля)

Опис

Збільшена, + 7см. Права доля - КВР - 220мм, товщина - 136мм. Ліва доля - ККР - 64мм, товщина - 49мм. Дифузно ущільнена, не однорідної структури за рахунок кістозного утворення яке займає майже 80% печінки, з чіткими рівними контурами та неоднорідним вмістом за рахунок множинних перетинків та осумкованих ділянок вільної рідини, розміри утворення 180x132x156мм. При КД та ЕД - кровопилн достовірно не визначається. Контури рівні, чіткі.

Об'ємні утвори

+

Choledoch - мм

V.porta - мм

V.cava inf - мм

Жовчний міхур

Розміри

довжина - мм., ширина - мм.

Опис

Не визначається.

Підшлункова залоза

Розміри

- х - х - мм.

Опис

Через великі розміри печінки достовірно не визначається.

Додаткові утвори ☒ не виявлені.**Селезінка**

Розміри

129 x 68 мм.

Опис

Розташована типово. Не однорідної структури за рахунок утворення печінки яке тісно прилягає до воріт селезінки, звичайної ехогенності. Контур рівний, чіткий. Судинний малюнок без змін.

Об'ємні утворення

☐

Об'ємні утворення

☐Наявність рідини в черевній порожнині ☐Кількість - см³

Лімфатичні вузли з заходом магістральних судин черевної порожнини:-

Стан черевної аорти -

УЗ - Ознаки

Гепатоспленомегалія. Велике солідно-кістозне утворення печінки. Жовчний міхур та підшлункова залоза достовірно не визначаються.

Рекомендовано

Консультація онколога,

УЗ контроль

в динаміці

Лікар УЗД

/Христенко Олександр Олександрович /





ТОВ "КАПІТАЛ"
Ліцензія МОЗ України
АГ №599781 від 17.01.2012

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Код закладу за ЗКПО: 32381903

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

Консультація лікаря УЗД перед малоінвазивним втручанням

Пацієнт: Жерліцина Анастасія Станіславівна, 46 р.

Амбулаторна картка № 90877

Дата: 21.12.2022

У пацієнтки лейомиосаркома матки с множественными вторичными очагами в печени и забрюшинном пространстве. Направлена для решения вопроса о возможной пункции или дренировании кистозных очагов в печени под контролем УЗ.

При УЗ-осмотре в печени определяются больших размеров (до 16 см в диаметре) очаги неоднородной смешанной солидно-кистозной структуры, содержащие множественные кистозные полости, занимающие до 20 % объема очагов.

Проведение чрескожной аспирации или дренирования кистозного компонента опухоли нецелесообразно.
Контрольный осмотр после химиотерапии.

Лікар: Чирков Ю. Е.



ДОКУМЕНТАЦІЯ

Універсальна клініка Оберіг
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Зоологічна, 3, корпус "в" і "г"

(044) 521-30-03
невідкладна допомога 3003

ЗКПО: 32381903

5213003@oberig.ua
www.oberig.ua

малоінвазивним втручанням

вторичними очагами в печені и забрюшинном
рентгенографічній пункції или дренировании кистозных очагов в

печени (до 16 см в диаметре) очаги неоднородной
структуры, множественные кистозные полости, занимающие до 20

процентов объема печени. Кистозного компонента опухоли нецелесообразно.

Лікар: Чирков Ю. Е.