

线性代数 A1 期中考试

2022.5.15;14:30-17:00

1. 判断下述论断是否成立, 并简述理由.

- (1) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解.
- (2) 存在 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 使得线性方程组 $ABx = x$ 有非零解, 而 $BAy = y$ 只有零解, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)^T, y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 为不定元.
- (3) 两个对称方阵的乘积仍是对称方阵.
- (4) 设 \mathbb{F} 是域, $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 A 可逆当且仅当存在常数项非零的非常值多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $f(A) = 0$.
- (5) 存在 3 阶复方阵 A , 使得 $\text{rank}(A^*) = 2$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.
- (6) 设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 $A^2 = A$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(A)$.

2. 利用 Cramer 法则求解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 3 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ 1 & & & & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$

- (1) 令 $\omega = e^{2\pi\sqrt{-1}/n}$. 试找一个可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}\{1, \omega, \dots, \omega^{n-1}\}$.
- (2) 试求 $Z(A) = \{B \in \mathbb{C}^{n \times n} | AB = BA\}$, 并证明 $BC = CB, \forall B, C \in Z(A)$.

4. 证明:

(1) 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{p \times q}$. 证明: $\text{rank} \begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix} = \text{rank}(C)$ 当且仅当存在 $X \in \mathbb{F}^{m \times p}, Y \in \mathbb{F}^{n \times q}$ 使得 $A = XC, B = CY$, 且 $XCY = 0$.

(2) 设 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $\text{rank}(A+B) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 当且仅当存在可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0 \end{pmatrix}, PBQ = \begin{pmatrix} 0 & \\ & I_s \end{pmatrix}$$

其中 $r = \text{rank}(A), s = \text{rank}(B)$, 且 $r + s \leq \min\{m, n\}$.

5. 判断下面矩阵是否可逆, 若可逆求出逆矩阵.

(1)
$$\begin{pmatrix} 2 & & & \\ -1 & 2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2)
$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

6. (1) 设 A, B 为 n 阶复方阵, 证明:

$$\det \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A + \sqrt{-1}B) \cdot \det(A - \sqrt{-1}B)$$

(2) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且满足 $a_{ii} > 0, a_{ij} < 0, i \neq j, \sum_{j=1}^n a_{ij} > 0$. 证明: $\det(A) > 0$.

7. 记 $V = C^\infty(\mathbb{R})$ 为 \mathbb{R} 上连续函数全体, $S = \{1, \cos x, \cos 2x, \cos^2 x, \cos 3x\}$ 为 V 中的向量组, 试求出 S 的全部极大线性无关组.