



非线性方程 (组) 在 MATLAB 中的求解方法

教学内容



- 一元方程的图解法
- 二元方程组的图解法
- 图解法的局限性
- 多项式型方程的求解 (**solve**)
- **solve** 函数的局限性
- 非线性方程 (组) 数值解的一般求法 (**fsolve**)
- **fsolve** 函数总结



一元方程的图解法

一个有阻尼的振动系统，振动方程如下，求出 $x(t) = 0.1$ 对应的时刻 t

$$x(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t)$$

根据振动方程，有

$$x(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) = 0.1$$


移项，可得

$$0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) - 0.1 = 0$$

设 $f(t)$ 为

$$f(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) - 0.1$$

以上问题，转换为求非线性方程 $f(t) = 0$ 的根






一元方程的图解法

图解法，即，绘制方程的曲线，然后找出对应的 t 值

$$f(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) - 0.1 = 0$$

在 MATLAB 中绘制 $f(t)$ 的曲线，以及 $y=0$ 的直线，相交点即 $f(t)=0$ 的根



在 $[0, 2]$ 区间内，方程有四个根，约为

0.004

0.097

0.226

0.288



二元方程组的图解法

用图解法，求二元方程组的解，其中 x 和 y 的范围均为 $[-5, 5]$


$$\begin{cases} x^2 e^{-xy^2} = 5 \\ x^3 \cos(x + y^2) + y^2 e^{x+y} = 10 \end{cases}$$

将方程组移项，改写成 $f(x, y) = 0$ 的形式

$$\begin{cases} x^2 e^{-xy^2} - 5 = 0 \\ x^3 \cos(x + y^2) + y^2 e^{x+y} - 10 = 0 \end{cases}$$

分别绘制两个方程的曲线，相交点即为方程组的解

二元方程组的图解法



在指定的区间内，方程组有三组根，约为 **$[-0.71, 1.8]$** , **$[4.1, 0.54]$** , **$[4.36, -0.555]$**

图解法的局限性

- 仅适用于一元和二元方程的求解
- 目测选点，不够精确
- 无法求解方程的复数根





多项式型方程的求解

求解二次方程的解

$$x^2 + 4 = 0$$

```
>> syms a b c x  
>> eq1=x^2+4;  
>> solve(eq1)
```

求解二次方程 (系数为参数) 的解

$$ax^2 + bx + c = 0$$

```
ans =
```

```
2*i  
-2*i
```

solve 函数

- ✓ 一次求出多项式方程的**所有根**
- ✓ 结果为**解析解**

```
>> eq2=a*x^2+b*x+c;  
>> solve(eq2,'x')
```

```
ans =
```

```
-(b + (b^2 - 4*a*c)^(1/2))/(2*a)  
-(b - (b^2 - 4*a*c)^(1/2))/(2*a)
```




多项式型方程的求解


求解多项式方程组的解

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} = 5 \\ x^3 + 9y^3 + 4y = 12 \end{cases}$$

将方程组移项，改写成 $f(x, y) = 0$ 的形式

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} - 5 = 0 \\ x^3 + 9y^3 + 4y - 12 = 0 \end{cases}$$

- ✓ 使用 **solve** 函数求解方程组
- ✓ 将求解结果带回方程组验算



图解法只能显示实数根

多项式型方程的求解



求解多项式方程组 (含变量倒数) 的解

$$\begin{cases} x^2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{y^2} = 7 \\ x^3 + \frac{1}{x^2} + y^3 = 2 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x^2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{y^2} - 7 = 0 \\ x^3 + \frac{1}{x^2} + y^3 - 2 = 0 \end{cases}$$

在以上的方程组里，多增加一项，求解并查看错误信息

$$\begin{cases} x^2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{y^2} - 7 = 0 \\ x^3 + \frac{1}{x^2} + y^3 - \frac{3}{y^2} - 2 = 0 \end{cases}$$

多项式型方程的求解



求解多项式方程组 (含参数系数) 的解

$$\begin{cases} ax^2 + bx + 7y - cz = 0 \\ 2x + dy - 3z - 5 = 0 \\ y - z - 6 = 0 \end{cases}$$

在以上的方程组里，修改一项，求解并查看警告信息

$$\begin{cases} ax^2 + bx + 7y - cz = 0 \\ 2x + dy - 3z - 5 = 0 \\ y^2 - z - 6 = 0 \end{cases}$$



solve 函数的局限性

求解一元非线性方程 (超越方程)


$$f(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) - 0.1$$

```
>> syms t
>> eq1=0.8*exp(-6*t)*sin(30*t)-0.1;
>> solve(eq1)

ans =

0.0042870417963290871380573439799886
```

对于非多项式方程，只能求出一个解





solve 函数的局限性

求解一元非线性方程 (超越方程)

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x^x) - 10$$

```
>> syms x
>> eq2=sin(x)+cos(x^x)-10;
>> s2=solve(eq2)
```

s2 =

98.395408219472484524557308589775

```
>> err2=subs(eq2,x,s2)
```

err2 =

-11.086710325428119092194367518788

对于稍许复杂的方程，求解结果出现很大误差



solve 函数的局限性

- ✓ 求解复杂的多项式方程时，可能会产生错误的求解结果
- ✓ 求解复杂的多项式方程时，可能无法求解，且非常耗时
- ✓ 求解超越方程时，只能返回一个解
- ✓ 求解超越方程时，可能返回错误解
- ✓



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

fsolve 函数的调用格式 (仅列出两种)

x = fsolve(fun,x0)

[x,fval,exitflag] = fsolve(fun,x0,options)

fun: 函数，用于定义方程 (组)

x0: 计算初值

x: 求解结果 (方程的根)

fval: 将求解结果 **x** 带入方程 (组) **fun**，对应的值，即 **fun(x)**

exitflag: 返回方程组求解结果的状态 (详见 **help** 文档)

options: 方程的求解设置



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

使用 **fsolve** 函数，求解以下**超越方程**的根

$$f(t) = 0.8 \times e^{-6t} \times \sin(30t) - 0.1 = 0$$

为了便于代码书写和理解，将方程的**变量统一用 x 表示**，**输出值用 F 表示**

$$F = 0.8 \times e^{-6x} \times \sin(30x) - 0.1 = 0$$

在函数 **myfun1** 中定义方程 **F**

```
function F=myfun1(x)
    F=0.8*exp(-6*x)*sin(30*x)-0.1;
end
```

初值 **x0** 分别设定为**0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5** 等，求解方程 **F** 的根，并观察结果



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

- 使用 **fsolve** 函数的第二种调用格式，求解方程 **F** 的根

`[x,fval,exitflag] = fsolve(fun,x0,options)`

- 使用 **optimset** 函数，设置 **options**

`options = optimset('Display','iter','TolFun',1e-8);`

✓ 显示每次迭代的结果

✓ 求解精度设置为 **10^{-8}**

- 运行求解程序，并观察求解结果
- 修改求解精度，再次运行求解程序，并观察求解结果



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

使用 **fsolve** 函数，求解以下**超越方程组**的根

$$\begin{cases} x^2 e^{-xy^2} = 5 \\ x^3 \cos(x + y^2) + y^2 e^{x+y} = 10 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x^2 e^{-xy^2} - 5 = 0 \\ x^3 \cos(x + y^2) + y^2 e^{x+y} - 10 = 0 \end{cases}$$

将方程的**变量**统一用 **x1, x2** 表示，**输出值**用 **F** 表示

$$\begin{cases} F_1 = x_1^2 e^{-x_1 x_2^2} - 5 = 0 \\ F_2 = x_1^3 \cos(x_1 + x_2^2) + x_2^2 e^{x_1 + x_2} - 10 = 0 \end{cases}$$

在函数 **myfun2** 中定义方程 **F**，给定不同的初值，求解方程组的根

```
function F=myfun2(x)
    F1=x(1)^2*exp(-x(1)*x(2)^2)-5;
    F2=x(1)^3*cos(x(1)+x(2)^2)+x(2)^2*exp(x(1)+x(2))-10;
    F=[F1;F2];
end
```



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

使用 **fsolve** 函数，求解以下**多项式方程组**的根

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} = 5 \\ x^3 + 9y^3 + 4y = 12 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{5} - 5 = 0 \\ x^3 + 9y^3 + 4y - 12 = 0 \end{cases}$$

将方程的**变量**统一用 **x1, x2** 表示，**输出值**用 **F** 表示

$$\begin{cases} F_1 = \frac{x_1^2}{2} + \frac{x_2^2}{5} - 5 = 0 \\ F_2 = x_1^3 + 9x_2^3 + 4x_2 - 12 = 0 \end{cases}$$

在函数 **myfun3** 中定义方程 **F**，给定不同的初值 (复数初值)，求解方程组的根

```
function F=myfun3(x)
    F1=x(1)^2/2+x(2)^2/5-5;
    F2=x(1)^3+9*x(2)^3+4*x(2)-12;
    F=[F1;F2];
end
```



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

使用 **fsolve** 函数，求解以下**超越方程组**的根

$$\begin{cases} x_1 x_2 - 5x_3 + e^{x_3} = 6 \\ x_1 - 3e^{x_2 x_3} = -3 \\ 8x_2 - x_3^2 - 6e^{x_1/x_2} = 10 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} F_1 = x_1 x_2 - 5x_3 + e^{x_3} - 6 = 0 \\ F_2 = x_1 - 3e^{x_2 x_3} + 3 = 0 \\ F_3 = 8x_2 - x_3^2 - 6e^{x_1/x_2} - 10 = 0 \end{cases}$$

在函数 **myfun4** 中定义方程 **F**，给定不同的初值，求解方程组的根

```
function F=myfun4(x)
    F1=x(1)*x(2)-5*x(3)+exp(x(3))-6;
    F2=x(1)-3*exp(x(2)*x(3))+3;
    F3=8*x(2)-x(3)^2-6*exp(x(1)/x(2))-10;
    F=[F1;F2;F3];
end
```



非线性方程 (组) 数值解的一般求法

使用 **fsolve** 函数，求解以下**矩阵方程**的根

$$X * X * X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad F = X * X * X - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

在函数 **myfun5** 中定义方程 **F**，给定初值，求解方程组的根

```
- function F=myfun5(x)
    F=x*x*x-[1 2;3 4];
end
```



fsolve 函数总结

- **fsolve** 可以求解方程 (组) 的实数根和复数根
- **fsolve** 采用迭代的数值算法，速度快
- 给定不同的初值，可以求得不同的根 (局部寻根)
- 初值给的不好，可能导致求解失败
- 关于初值如何给定的问题
 - ✓ 一元 / 二元方程 (组)，通过图解法，可以得到根的个数，并粗略地估计出根的值，用做 **fsolve** 的初值
 - ✓ 根据方程组中变量的实际意义，合适地给出初值。例如，时间 / 长度 / 质量等物理量，应该大于 0
 - ✓ 通过更多的练习和经验积累，自然会见多识广

教学视频获取

获取本课程的教学视频，和更多学习资源，请联系

QQ: 993878382 (上下求索)

微信号: sxqiuso (上下求索)

扫一扫下面的二维码，可直接加我微信

