

# Advanced Physical Chemistry II

## HW

王石嵘

161240065

September 30, 2019

### 13 Molecular Spectroscopy

3, 7, 14, 18, 24, 28, 32, 37, 40, 43, 45, 51

13-3

$$\mu = \frac{1.01 \times 126.9}{1.01 + 126.9} \times 1823 \text{ a. u.} = 1.827 \times 10^3 \text{ a. u.} \quad (13.1)$$

$$\begin{aligned} \tilde{B} &= \frac{\hbar}{4\pi c \mu R_e^2} = \frac{1}{4\pi \times 137 \times 1.827 \times 10^3 \text{ a. u.}} \times \frac{1}{(160.4 \text{ pm})^2} \\ &= 1.682 \times 10^{-5} \text{ pm} \times \frac{1}{(160.4 \text{ pm})^2} \\ &= 6.54 \text{ cm}^{-1} \end{aligned} \quad (13.2)$$

$$c\tilde{B} = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{Hz} \times 6.54 \times 10^2 \text{ m}^{-1} = 1.96 \times 10^5 \text{ MHz} \quad (13.3)$$

13-7

$$\mu = \frac{38.96 \times 34.97}{38.96 + 34.97} \text{ amu} = 18.44 \text{ amu} = 3.06 \times 10^{-26} \text{ kg} \quad (13.4)$$

$$k = \mu(2\pi c\tilde{\nu})^2 = 3.06 \times 10^{-26} (2\pi \times 3 \times 10^8 \times 27800)^2 = 84.0 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (13.5)$$

$$T = \frac{1}{c\tilde{\nu}} = \frac{1}{3 \times 10^8 \times 27800} = 1.20 \times 10^{-13} \text{ s} \quad (13.6)$$

13-14

$$R(0) = \tilde{\nu} + 2\tilde{B}_1 = 2642.60 \text{ cm}^{-1} \quad (13.7)$$

$$R(1) = \tilde{\nu} - 2\tilde{B}_0 + 6\tilde{B}_1 = 2658.36 \text{ cm}^{-1} \quad (13.8)$$

$$P(0) = \tilde{\nu} - 2\tilde{B}_0 = 2609.67 \text{ cm}^{-1} \quad (13.9)$$

$$P(1) = \tilde{\nu} - 6\tilde{B}_0 - 2\tilde{B}_1 = 2592.51 \text{ cm}^{-1} \quad (13.10)$$

thus

$$\tilde{B}_1 = 8.12 \text{ cm}^{-1} \quad (13.11)$$

$$\tilde{B}_0 = 8.35 \text{ cm}^{-1} \quad (13.12)$$

Then

$$\tilde{B}_1 = \tilde{B}_e - \frac{1}{2}\tilde{\alpha}_e = 8.12 \text{ cm}^{-1} \quad (13.13)$$

$$\tilde{B}_0 = \tilde{B}_e - \frac{3}{2}\tilde{\alpha}_e = 8.35 \text{ cm}^{-1} \quad (13.14)$$

∴


$$\tilde{B}_e = 8.47 \text{ cm}^{-1} \quad (13.15)$$

$$\tilde{\alpha}_e = 0.23 \text{ cm}^{-1} \quad (13.16)$$

13-18 Since

$$\tilde{\nu}(J \rightarrow J+1) = 2\tilde{B}(J+1) - 4\tilde{D}(J+1)^3 \quad (13.17)$$

we can fit the  $\tilde{\nu} \sim J+1$  curve as follows



and thus

$$2\tilde{B} = 3.845 \text{ cm}^{-1} \quad (13.18)$$

$$-4\tilde{D} = -2.555 \times 10^{-5} \text{ cm}^{-1} \quad (13.19)$$

i.e.

$$\tilde{B} = 1.923 \text{ cm}^{-1} \quad (13.20)$$

$$\tilde{D} = 6.388 \times 10^{-6} \text{ cm}^{-1} \quad (13.21)$$


13-32 Since

$$\tilde{\nu}_{\text{obs}} = \tilde{T}_e + \left( \frac{1}{2}\tilde{\nu}'_e - \frac{1}{4}\tilde{x}'_e\tilde{\nu}'_e \right) - \left( \frac{1}{2}\tilde{\nu}''_e - \frac{1}{4}\tilde{x}''_e\tilde{\nu}''_e \right) + (\tilde{\nu}'_e - \tilde{x}'_e\tilde{\nu}'_e)v' - \tilde{x}'_e\tilde{\nu}'_ev'^2 \quad (13.22)$$

Rewrite that as

$$\tilde{\nu}_{\text{obs}}(v') = A + Bv' + Cv'^2 \quad (13.23)$$

thus we can fit the data as



and

$$\tilde{\nu}_{\text{obs}}(v') = 14020.1 + 257.114v' + 1.57143v'^2 \quad (13.24)$$

thus

$$(\tilde{\nu}'_e - \tilde{x}'_e \tilde{\nu}'_e) = 257.114 \text{ cm}^{-1} \quad (13.25)$$

$$\tilde{x}'_e \tilde{\nu}'_e = -1.571\,43 \text{ cm}^{-1} \quad (13.26)$$

i.e.

$$\tilde{\nu}'_e = 255.542 \text{ cm}^{-1} \quad (13.27)$$

$$\tilde{x}'_e \tilde{\nu}'_e = -1.571\,43 \text{ cm}^{-1} \quad (13.28)$$

13-37

13-40

13-43

13-45

13-51