

PREVENCIÓN




- Vacunación de los perros
Los programas de vacunación masiva de los perros, incluidos sus cachorros, es la estrategia más rentable para prevenir la enfermedad en el ser humano, porque se interviene en la fuente de infección. El sacrificio de los perros vagabundos no es una forma eficaz de combatir la rabia.



¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA MORDEDURA DE PERRO?

- Lavar minuciosamente las heridas con agua y jabón durante al menos 15 minutos poco después de la mordedura; Acuda a su unidad de salud más cercana para:
- Administrar la vacunación antirrábica completa; y
- Administrar inmunoglobulina antirrábica o anticuerpos monoclonales en la herida, si está indicado.





ELABORO: ANA JAZMIN B.S

REFERENCIAS:

RABIA, Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies>



RABIA




HOSPITAL REGIONAL TOLUCA

RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR EL PERRO

La rabia es una virosis zoonótica que afecta al sistema nervioso y que se puede prevenir administrando una vacuna. En el 99% de los casos, la transmisión al ser humano se produce a partir de un animal infectado. Los niños de 5 a 14 años son víctimas frecuentes.

El virus de la rabia infecta a mamíferos como los perros, los gatos, el ganado y la fauna silvestre. La vía de propagación a personas y animales es la saliva, con la que se entra en contacto a través de mordeduras, arañazos o mediante el contacto directo con las mucosas (de los ojos, la boca o en heridas abiertas). Una vez que aparecen los síntomas clínicos, la enfermedad es mortal en prácticamente todos los casos.



RABIA TRANSMITIDA POR ANIMALES DISTINTOS A LOS PERROS

En las Américas, donde la rabia transmitida por el perro está prácticamente bajo control, los murciélagos hematófagos son ahora la principal fuente de rabia humana. Las defunciones de seres humanos por rabia contraída por contacto con zorros, mapaches, mofetas, chacales, mangostas y otros huéspedes carnívoros salvajes infectados son muy raras, y no hay casos conocidos de transmisión a través de mordeduras de roedores.

También se puede contraer la enfermedad por el trasplante de órganos infectados, el consumo de carne o leche de animales infectados y la inhalación de aerosoles que contengan el virus, aunque se dan poquísimos casos.

ANIMALES SILVESTRES QUE PUEDEN TRANSMITIR RABIA



SINTOMAS

- Fiebre,
- Dolor
- Sensaciones de hormigueo, y picor o quemazón en la herida inusuales o no explicables por otra causa.
- Cuando el virus se desplaza al sistema nervioso central aparece una inflamación progresiva del encéfalo y la médula espinal que acaba produciendo la muerte.

La enfermedad puede adoptar dos formas:

- En la primera, la **rabia furiosa**, los enfermos presentan signos de hiperactividad, excitación, alucinaciones, falta de coordinación, hidrofobia (miedo al agua) y aerofobia (miedo a las corrientes de aire o al aire libre). La muerte se produce a los pocos días por paro cardiorrespiratorio.
- La segunda forma es la **rabia paralítica**, que abarca aproximadamente el 20% de los casos humanos. Esta forma tiene una evolución menos grave y, por lo general, más prolongada. Los músculos se paralizan gradualmente, empezando por los más cercanos a la herida. El paciente entra en coma lentamente y acaba falleciendo. A menudo, la forma paralítica no se diagnostica correctamente, lo cual contribuye a la infranotificación de la enfermedad.