Задача про мышку и кошку

1. $v = const$

$$|\bar{v}_c| = const = |\bar{v}_{0_c}|$$
$$|\bar{v}_m| = const = |\bar{v}_{0_m}|$$
$$\bar{v}_c = \frac{\bar{r}_m - \bar{r}_c}{|\bar{r}_m - \bar{r}_c|} * |\bar{v}_c|$$
$$\bar{v}_m = \frac{-\bar{r}_m}{|r_m|} * |\bar{v}_m|$$
$$\bar{r}_c = \bar{r}_{c_{prev}} + \bar{v}_c \Delta t$$
$$\bar{r}_m = \bar{r}_{m_{prev}} + \bar{v}_m \Delta t$$

2. $v_c = const$

$$|\bar{a}| = k_1 \frac{\bar{r}_m - \bar{r}_c}{|\bar{r}_m - \bar{r}_c| + k_2};\ k_1, k_2 = const$$
$$|\bar{v}_c| = const = |\bar{v}_{0_c}|$$
$$\bar{v}_c = \frac{\bar{r}_m - \bar{r}_c}{|\bar{r}_m - \bar{r}_c|} * |\bar{v}_c|$$
$$\bar{v}_m = \frac{-\bar{r}_m}{|\bar{r}_m|} * |\bar{v}_{m_{prev}}| + \bar{a}\Delta t$$
$$\bar{r}_c = \bar{r}_{c_{prev}} + \bar{v}_c \Delta t$$
$$\bar{r}_m = \bar{r}_{m_{prev}} + \bar{v}_m$$

1.1. (v = const)

$kill\_dist = 0.5$
$r_m = (0.0; -3.0)$
$r_c = (3.0; 0.0)$
$v_c = v_m = 1.0$
$\Delta t = 0.1$

Мышка успела забежать в норку



1.2 (v = const)

$kill\_dist = 0.5$
$r_m = (0.0; -3.0)$
$r_c = (3.0; 0.0)$
$v_c = 2.0, v_m = 1.0$
$\Delta t = 0.1$

Кошка поймала мышку



2.1 $v_m \neq const$

$kill\_dist = 0.05$
$r_m = (0.0; -5.0)$
$r_c = (5.0; 0.0)$
$v_c = 8.0, v_{0_m} = 1.0$
$k_1 = 5.0, k_2 = 0.001$
$\Delta t = 0.05$







2.2 $v_m \neq const$

$kill\_dist = 0.05$
$r_m = (0.0; -10.0)$
$r_c = (15.0; 0.0)$
$v_c = 8.0, v_{0_m} = 1.0$
$k_1 = 2, k_2 = 0.05$
$\Delta t = 0.05$