

Lic. Jay Ehrenstein

ENTRENAMIENTO INTELIGENTE DE GLÚTEO

PARTE II: PROGRAMACIÓN

EDICIÓN REVISADA

OBJETIVOS

- Conocer las DISTINTAS CLASIFICACIONES de EJERCICIOS que OPTIMIZAN el DESARROLLO del GLÚTEO**
- Aprender a PROGRAMAR las VARIABLES de ENTRENAMIENTO a fin de OPTIMIZAR el PROGRAMA de ESPECIALIZACIÓN/PRIORIDAD de GLÚTEO**
- DESGLOSAR y ANALIZAR un PROGRAMA en CONJUNTO a DISTINTAS ESTRATEGIAS de ENTRENAMIENTO**




CONSIDERACIONES DE PROGRAMACIÓN

CLASIFICACIÓN DE EJERCICIOS

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES


LONGITUD LARGA




LONGITUD INTERMEDIA




LONGITUD CORTA DE EXTENSIÓN



LONGITUD CORTA DE HIPEREXTENSIÓN



LONGITUD CORTA DE ABDUCCIÓN Y
ADDUCCIÓN HORIZONTAL



Las categorías se desarrollan sobre el patrón de movimiento, ángulo de flexión/extensión de cadera, y la tensión contráctil activa y pasiva

LONGITUD LARGA — INTEGRACIÓN

EJERCICIOS

- Sentadilla
- Desplante
- Step up
- Prensa de pierna

incluyendo sus variantes

PROGRAMACIÓN

1-3 sesiones por semana
1-2 ejercicios por sesión, 2-5 por semana
2-5 series por ejercicio
5-15 repeticiones (bilateral 5-10, unilateral 10-15)
~3-5 RIR

CONSIDERACIONES

-Debido a la gran flexión/extensión de rodilla involucrada en esta categoría, los músculos del cuádriceps se desarrollarán en conjunto al glúteo por lo que se puede reducir la cantidad de estímulos si se desea evitar el crecimiento adicional de los cuádriceps. Esta consideración deberá poner sobre la balanza el potente estímulo que se pierde para los glúteos al reducir dicha categoría.

-Si se desea mayor crecimiento de los cuádriceps, y un crecimiento de todas las cabezas, será necesario agregar más volumen a través de ejercicios de extensión de rodilla aislada (probablemente con cargas más ligeras [+15 repeticiones] y más próximas al fallo muscular [0-2 RIR] por 2-4 series con una frecuencia de 1-3 semanal); específicamente el recto femoral.

-Debido a la elongación del tejido, y la gran extensión de cadera, la porción distal/inferior del glúteo es aquella que recibe mayor desarrollo muscular.

-Esta categoría causará la mayor cantidad de ruptura homeostática al glúteo por lo que se deberá programar la frecuencia, volumen y distribución de entrenamiento con dicha consideración. Por ejemplo: considerar que la fatiga puede alterar negativamente los ejercicios que se realizan posterior a estos.

-Se puede enfatizar realizar cada repetición lenta (un par de segundos) y controlada con una pausa ligera en el momento de mayor elongación durante la porción de descenso/excéntrica.

LONGITUD LARGA — INTEGRACIÓN

DOSIS BAJA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 2 x 5-10 @ 3-5 RIR

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 2 x 5-10 @ 3-5 RIR

SESIÓN 2

Sentadilla Split con Mancuernas 2 x 10-15 @ 3-5 RIR

<8 series semanales

DOSIS MODERADA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Sentadilla Split con Mancuernas 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Sentadilla Split con Mancuernas 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

8-16 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Sentadilla Split con Mancuernas 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Desplante Invertido con Mancuernas
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

16-24 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Prensa de Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Sentadilla Split con Mancuernas 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 3

Sentadilla con Barra Trasera 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Desplante Invertido con Mancuernas 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Extensión de Cuádriceps en Máquina 2 x 15-30 @ 2-3 RIR

LONGITUD INTERMEDIA — INTEGRACIÓN

EJERCICIOS

Peso Muerto
Peso Muerto Rumano
Reverencia
Pullthrough
Extensión de cadera en banco romano*

incluyendo sus variantes

PROGRAMACIÓN

1-3 sesiones por semana
1-2 ejercicios por sesión, 2-5 por semana
2-5 series por ejercicio
5-15 repeticiones (bilateral 5-10, unilateral 10-15)
~3-5 RIR

CONSIDERACIONES

-Debido a la gran elongación a la que se exponen los isquiosurales, esta categoría desarrolla estos mismos en conjunto a los glúteos por lo que se puede reducir la cantidad de estímulos si se desea evitar el crecimiento adicional de los isquiosurales

-Si se desea mayor crecimiento de los isquiosurales, y un crecimiento de todas las cabezas y porciones, será necesario agregar más volumen a través de ejercicios de flexión de rodilla aislada probablemente con cargas más ligeras [+15 repeticiones] y más próximas al fallo muscular [0-2 RIR] por 2-4 series con una frecuencia de 1-3 semanal

-Debido a la elongación del tejido, y la gran extensión de cadera, la porción distal/inferior del glúteo es aquella que recibe mayor desarrollo muscular.

****Probablemente, de acuerdo con prioridades, preferencias y fatiga, se debería balancear apropiadamente el trabajo de longitudes largas e intermedias. La presencia abundante de una categoría debería combinarse con una reducción en la otra. Esto puede ser dentro de una sesión, por ejemplo: 2 longitudes largas con 1 intermedia. Dentro de la semana, más longitudes largas al inicio de la semana, y más intermedias al final. O en un esquema alternado, más longitudes largas en la semana A, y más intermedias en la semana B, o viceversa. Cualquier estrategia puede combinarse.***

LONGITUD INTERMEDIA — INTEGRACIÓN

DOSIS BAJA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 2 x 5-10 @ 3-5 RIR

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 2 x 5-10 @ 3-5 RIR

SESIÓN 2

Extensión de Cadera en Banco Romano
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

<8 series semanales

DOSIS MODERADA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR
Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR
Extensión de Cadera en Banco Romano
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR
Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Peso Muerto Rumano con Mancuernas
4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Extensión de Cadera en Banco Romano
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

8-16 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR
Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR
Extensión de Cadera en Banco Romano
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Peso Muerto Rumano con Mancuernas
4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Extensión de Cadera en Banco Romano a
Una Sola Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

16-24 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 2

SESIÓN 1

Peso Muerto con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR
Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR
Extensión de Cadera en Banco Romano
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 3

Peso Muerto Rumano con Mancuernas 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Extensión de Cadera en Banco Romano a
Una Sola Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Flexión de Rodilla Sentado 2 x 15-30 @ 2-3 RIR

LONGITUD CORTA DE EXTENSIÓN — INTEGRACIÓN

EJERCICIOS

Puente de cadera

Hip Thrust

Extensión de cadera en banco romano*

Hiperextensión Revertida

incluyendo sus variantes

PROGRAMACIÓN

2-4 sesiones por semana

1-3 ejercicios por sesión, 2-6 por semana

2-5 series por ejercicio

5-15 repeticiones (bilateral 5-10, unilateral 10-15)

~2-4 RIR

CONSIDERACIONES

-Debido al rango de movimiento reducido, la elongación a los tejidos es menor, lo que promueve una recuperación más acelerada. En consecuencia, pese a representar un estímulo hipertrofico menor en comparación con los ejercicios de longitudes largas su presencia puede ser más constante; lo que “igual” su capacidad final dentro del programa total.

-Al ser una categoría enfocada a la tensión mecánica activa, se complementan los ejercicios de longitud corta con los de distintas longitudes a fin de lograr el máximo potencial hipertrofico.

-Esta clasificación representa una estrategia ideal cuando se desea lograr mayor crecimiento muscular de los glúteos sin necesariamente crecer de manera significativa los isquiosurales o cuádriceps. Su presencia, tanto en frecuencia y volumen debería aumentar por antedicha razón.

-Debido a la gran extensión de cadera, la porción distal/inferior del glúteo es aquella que recibe mayor desarrollo muscular. Asimismo, por la relación del punto de dificultad y la longitud corta, estos ejercicios pueden complementarse apropiadamente con la integración de bandas de resistencia. Este efecto probablemente será de un tamaño de efecto pequeño.

-Se puede enfatizar realizar cada repetición rápida y controlada con una pausa ligera en el momento de mayor contracción durante la porción de ascenso/concéntrica.

LONGITUD CORTA — INTEGRACIÓN

DOSIS BAJA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Hip Thrust con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Hipextensión Revertida 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Hip Thrust con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Puente de Cadera a Una Sola Pierna
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

8-16 series semanales

DOSIS MODERADA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Hip Thrust con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Hipextensión Revertida 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Puente de Cadera a Una Sola Pierna
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Hip Thrust con Barra con Pausa ISO de 3
Segundos 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Hipextensión Revertida 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Puente de Cadera a Una Sola Pierna con Pies
Elevados 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

16-24 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Hip Thrust con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Hipextensión Revertida 4 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 2

Puente de Cadera a Una Sola Pierna
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Puente de Cadera a Una Sola Pierna
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

Extensión de Cadera en Banco Romano con
Torso Flexionado 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

SESIÓN 3

Hip Thrust con Barra con Pausa ISO de
3 Segundos 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

Puente de Cadera a Una Sola Pierna con
Pies Elevados 4 x 10-15 @ 2-4 RIR

LONGITUD CORTA HIPEREXTENSIÓN — ABDUCCIÓN/ABD HORIZONTAL — INTEGRACIÓN

EJERCICIOS

Hiperextensión Revertida Corta
Extensión/Patada de glúteo

Abducción de cadera
Abducción horizontal

incluyendo sus variantes

PROGRAMACIÓN

2-6 sesiones por semana
1-2 ejercicios por sesión, 2-6 por semana
2-4 series por ejercicio
+15 repeticiones (-30 repeticiones)
~0-2 RIR

CONSIDERACIONES

-Debido al rango de movimiento reducido, la elongación a los tejidos es menor, lo que promueve una recuperación más acelerada. En consecuencia, estas categorías pueden integrarse múltiples veces por semana. Representan las categorías con mayor posibilidad de frecuencia, pero quizás las de menor importancia.

-Estas categorías representan complementos al programa general, en consecuencia su aparición dentro del programa (dentro de la sesión y la semana) tenderá a ser posterior al desarrollo fundamental del glúteo.

-Esta clasificación representa una estrategia ideal cuando se desea lograr mayor crecimiento muscular de los glúteos sin necesariamente crecer de manera significativa los isquiosurales o cuádriceps. Su presencia, tanto en frecuencia y volumen debería aumentar por antedicha razón.

-Durante los ejercicios de abducción se puede enfatizar la porción superior del glúteo, mientras que durante los ejercicios de abducción horizontal se puede enfatizar la porción inferior

-Se puede enfatizar realizar cada repetición rápida y controlada con una pausa ligera en el momento de mayor contracción durante la porción de ascenso/concéntrica.

-Esta categoría es esencial, y no debería omitirse por variantes de ejercicios combinados (que agregan resistencia lateral a ejercicios de extensión de cadera [puente con bandas de resistencias]). Se requiere resistencia directa al patrón de movimiento

LONGITUD CORTA HIPEREXTENSIÓN-ABDUCCIÓN/ABDUCCIÓN H – INTEGRACIÓN

DOSIS BAJA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Extensión de Cadera en Máquina Smith
4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie con Polea
2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 2

Hipextensión Revertida Corta 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie y Tronco
Flexionado con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

8-16 series semanales

DOSIS MODERADA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Extensión de Cadera en Máquina Smith
4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie con Polea
2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 2

Hipextensión Revertida Corta 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie y Tronco
Flexionado con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 3

Extensión de Cadera en Máquina Smith
4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie y Tronco Flexionado
con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

16-24 series semanales

DOSIS ALTA

EJEMPLO 1

SESIÓN 1

Extensión de Cadera en Máquina Smith 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 2

Hipextensión Revertida Corta 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie y Tronco Flexionado con
Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 3

Extensión de Cadera en Máquina Smith 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera de Pie y Tronco Flexionado con
Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 4

Hipextensión Revertida Corta 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

Abducción de Cadera en Máquina 2 x 15-20 @ 0-2 RIR + MYOREPS

INTEGRACIÓN DE CATEGORÍAS

SESIÓN 1

A1 Hip Thrust con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

A2 Abducción de Cadera de Pie con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

B1 Peso Muerto con Barra 4 x 5-10 @ 3-5 RIR

C1 Pull Through con Polea Baja 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

D1 Hipextensión Revertida 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

E1 Puente de Cadera a Una Sola Pierna 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

F1 Extensión de Cadera en Máquina Smith 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 2

A1 Sentadilla con Barra Trasera 2 x 5-10 @ 3-5 RIR

B1 Flexión de Rodilla Sentado 2 x 15-30 @ 2-3 RIR

C1 Hipextensión Revertida Corta 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

C2 Abducción de Cadera de Pie y Tronco Flexionado con Polea 2 x 15-20 @ 0-2 RIR

SESIÓN 3

A1 Hip Thrust con Barra con Pausa ISO de 3 Segundos
4 x 5-10 @ 3-5 RIR

A2 Abducción de Cadera de Pie y Tronco Flexionado con Polea
2 x 15-20 @ 0-2 RIR

B1 Peso Muerto Rumano con Mancuernas 4 x 5-10 @ 3-5 RIR


C1 Extensión de Cadera en Banco Romano 2 x 10-15 @ 2-4 RIR

D1 Hipextensión Revertida 2 x 10-15 @ 2-4 RIR


E1 Puente de Cadera a Una Sola Pierna con Pies Elevados
2 x 10-15 @ 2-4 RIR

F1 Extensión de Cadera en Máquina Smith 4 x 15-20 @ 0-2 RIR

PROGRAMACIÓN - DISTRIBUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO



ACOMODO/FRECUENCIA SEMANAL DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO



NOTA:

Esta gráfica representa el concepto general, la magnitud y recuperación podrían cambiar en ejercicios y músculos específicos. Por ejemplo, aunque el peso muerto rumano es de longitud intermedia para el glúteo es de una longitud larga en los isquiosurales.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Respuesta global al programa de entrenamiento

Naturaleza del estímulo (ejercicio, capacidad y sobrecarga)

Alternancia de cargas

Recuperación incompleta

Gestión de la fatiga

a) Volumen

b) Carga/repeticiones

c) Ejercicio

d) Proximidad al fallo muscular

VARIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO HORIZONTAL

3 FRECUENCIA

	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Largo	X		X		X		
Intermedio	X		X		X		
Corto	X		X		X		

Largo	X				X		
Intermedio	X	X			X		
Corto	X	X			X		

4 FRECUENCIA

	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Largo	X			X	X		
Intermedio	X	X		X	X		
Corto	X	X		X	X		

Largo	X		X		X		
Intermedio	X		X		X	X	
Corto	X		X		X	X	

5/6 FRECUENCIA

	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Largo	X		X		X		
Intermedio	X	X		X	X		
Corto	X	X	X	X	X	X	



Estimulo bajo



Estimulo moderado



Estimulo alto

El estímulo no hace necesariamente referencia a la carga de entrenamiento, más bien es un término conceptual de un estímulo en general más o menos estresante. Esto será en referencia a las capacidades de recuperación del individuo y la totalidad del programa de entrenamiento estipulado. Factores que incrementan el estrés de una sesión:

-Mayor cantidad de entrenamiento enfocado a elongadores

-Mayor cantidad de series

-Series de repeticiones más altas

-Mayor proximidad al fallo

Nota: Entre mayor es la frecuencia, el volumen por categoría por sesión tenderá a ser menor.

CONSIDERACIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN

- Los ejercicios que proveen mayor beneficio por la tensión contráctil total (sesgada a la tensión contráctil pasiva) son aquellos que también proveen mayor fatiga. En consecuencia, pese a sus beneficios, su inclusión deberá ser más estratégica y menos frecuente. De tal modo, los ejercicios orientados a la tensión contráctil activa podrán presentarse con mayor frecuencia. Por ejemplo: menor frecuencia de la sentadilla frente al hip thrust.
- Los ejercicios deberán distribuirse dentro de la sesión y acorde a su prioridad, la fatiga resultante, y la interacción con el resto del programa. El acomodo “perfecto” solo existe en relación con tus objetivos, horarios de entrenamiento, etc. Por ejemplo: si se desea un estímulo de glúteo+cuádriceps, la sentadilla* debería presentarse con más frecuencia en la semana, y en primera instancia dentro de la misma y la sesión.
- La distribución general buscará distanciar los ejercicios de longitud larga e intermedia, contrastándolos. Complementando con los ejercicios de longitud corta, y los de hiperextensión y abducción se integrarán de manera lógica e individual acorde al tiempo disponible, teniendo estos un rol secundario. Probablemente al final de la sesión, o en bi-series que no se vean afectadas directamente por la fatiga.
- Las bi-series compuestas (dos ejercicios para el mismo grupo muscular o categoría) deberían evitarse en su totalidad. Se pueden utilizar las bi-series superseries (dos ejercicios para distinto grupo muscular o categoría) siempre y cuando esto no afecte a músculos estabilizadores, al sistema cardiorrespiratorio o la fatiga en general.
- Los descansos/períodos de recuperación deberán establecerse de manera individual acorde a 1) la recuperación del tejido en cuestión, 2) la recuperación de los músculos sinergistas, 3) la recuperación del sistema cardiorrespiratorio y 4) la recuperación de la producción de fuerza (fatiga central).
- Si se desea mayor volumen de entrenamiento para una categoría en particular, se deberá incrementar la frecuencia, lo que da lugar a mayor volumen de entrenamiento. En ocasiones, para realizar esto se tendrá que reducir el volumen orientado a otra categoría a fin de abrir recursos y tiempo de entrenamiento. La recomendación de volumen total por categoría es de <10 series (siendo este un límite) y la recomendación general de 6-8 series.
- La progresión del entrenamiento deberá realizarse acorde a los marcadores de fatiga y aptitud física, considerando la importancia del músculo en cuestión.
- La integración de RIR, por si solo puede representar una sobrecarga de entrenamiento al permitir que acorde al progreso de la fuerza se utilicen cargas más pesadas para las mismas RIR. Probablemente, sea mejor y más práctico utilizar un rango de RIR (0-5) dependiendo de la categoría al igual que las repeticiones.

CONSIDERACIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN

- Acorde a las recomendaciones de ejercicios, probablemente se deba repetir un estímulo (¿si es un buen ejercicio por qué no repetirlo?). No obstante, cierta variación es recomendada (repeticiones, volumen, cercanía al fallo muscular, implemento, etc.).
- La variación deberá ser suficiente para cumplir con las categorías. La sustitución o eliminación de ejercicios debe ser objetiva, considerando:
 - 1) El rendimiento en el ejercicio
 - 2) Las sensaciones en el ejercicio
 - 3) Molestias/dolencias en el ejercicio
 - *Lo que requiere de monitoreo y de un sistema de puntuación.
- El trabajo de abdomen debería incluirse probablemente en los días de cuerpo inferior con menor cantidad de trabajo de longitudes largas e intermedias (estas tienden a fatigar los músculos del tronco). Considera especialmente como el trabajo de abdomen puede afectar a la sentadilla y el peso muerto.
- El trabajo de gastrocnemio puede integrarse acorde a cuestiones prácticas. Por ejemplo, si se realiza una prensa de pierna como ejercicio de longitud larga se puede integrar junto a este la elevación de pantorrilla en prensa.
- Se deberán incorporar medios de longitudes largas, intermedias y cortas. Adicionalmente, dentro de las cortas se deben integrar aquellas de hiperextensión y las de abducción y abducción horizontal para complementar el desarrollo del complejo glúteo.
- Para enfatizar la porción inferior se deberán integrar mayor cantidad de medios de extensión de cadera, especialmente de longitudes largas y aquellos de abducción horizontal. Para la porción superior, los medios de abducción son esenciales.
- El trabajo de "activadores" ha sido removido del modelo por a) ausencia de datos que fundamenten su integración, b) los rangos de repeticiones necesarios para aproximarse al fallo tienden a salir del rango ideal de la hipertrofia máxima y c) el mito de la amnesia glútea y necesidad de "despertar/activar" los glúteos no ha sido fundamentada; más bien rechazada.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

JAY EHRENSTEIN

LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA



Jayehrenstein@gmail.com



JAY EHRENSTEIN



33 1062 5792



coachehrenstein