

Exercícios selecionados:

1, 6, 15-22, 24, 25, 31-33, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 55, 61, 64, 69, 75, 76, 83, 87

14.3 Exercícios

1. A temperatura T (em $^{\circ}\text{C}$) de uma localidade do Hemisfério Norte depende da longitude x , da latitude y e do tempo t , de modo que podemos escrever $T = f(x, y, t)$. Vamos medir o tempo em horas a partir do início de janeiro.
- (a) Qual o significado das derivadas parciais $\partial T/\partial x$, $\partial T/\partial y$ e $\partial T/\partial t$?
- (b) Honolulu tem longitude de 158° W e latitude de 21° N. Suponha que às 9 horas em 1 $^{\circ}$ de janeiro esteja ventando para noroeste uma brisa quente, de forma que a Oeste e a Sul o ar esteja quente e a Norte e Leste o ar esteja mais frio. Você esperaria que $f_x(158, 21, 9)$, $f_y(158, 21, 9)$ e $f_t(158, 21, 9)$ fossem positivos ou negativos? Explique.
2. No início desta seção discutimos a função $I = f(T, H)$, onde I era o humidex; T , a temperatura; e H , a umidade relativa. Utilize a Tabela 1 para estimar $f_T(34, 75)$ e $f_H(34, 75)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
3. O índice de sensação térmica W é a temperatura sentida quando a temperatura real é T e a velocidade do vento, v . Portanto, podemos escrever $W = f(T, v)$. A tabela de valores a seguir foi extraída da Tabela 1 da Seção 14.1.

		Velocidade do vento (km/h)					
Temperatura real ($^{\circ}\text{C}$)	v	20	30	40	50	60	70
	T	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-10	-18	-20	-21	-22	-23	-23
	-15	-24	-26	-27	-29	-30	-30
	-20	-30	-33	-34	-35	-36	-37
	-25	-37	-39	-41	-42	-43	-44

- (a) Estime os valores de $f_T(-15, 30)$ e $f_v(-15, 30)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
- (b) Em geral, o que se pode dizer sobre o sinal de $\partial W/\partial T$ e $\partial W/\partial v$?
- (c) Qual parece ser o valor do seguinte limite?

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\partial W}{\partial v}$$


4. A altura h de ondas em mar aberto depende da velocidade do vento v e do tempo t durante o qual o vento se manteve naquela intensidade. Os valores da função $h = f(v, t)$ são apresentados na seguinte tabela.

		Duração (horas)						
Velocidade do vento (km/h)	t	5	10	15	20	30	40	50
	v	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	20	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	30	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
	40	1,5	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8
	60	2,8	4,0	4,9	5,2	5,5	5,8	5,9
	80	4,3	6,4	7,7	8,6	9,5	10,1	10,2
	100	5,8	8,9	11,0	12,2	13,8	14,7	15,3
	120	7,4	11,3	14,4	16,6	19,0	20,5	21,1

- (a) Qual o significado das derivadas parciais $\partial h/\partial v$ e $\partial h/\partial t$?
- (b) Estime os valores de $f_v(80, 15)$ e $f_t(80, 15)$. Quais são as interpretações práticas desses valores?
- (c) Qual parece ser o valor do seguinte limite?




$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\partial h}{\partial t}$$

- 5-8 Determine os sinais das derivadas parciais da função f cujo gráfico está mostrado.




5. (a) $f_x(1, 2)$ (b) $f_y(1, 2)$
6. (a) $f_x(-1, 2)$ (b) $f_y(-1, 2)$
7. (a) $f_{xx}(-1, 2)$ (b) $f_{yy}(-1, 2)$
8. (a) $f_{xy}(1, 2)$ (b) $f_{xy}(-1, 2)$

9. As seguintes superfícies, rotuladas a , b e c , são gráficos de uma função f e de suas derivadas parciais f_x e f_y . Identifique cada superfície e dê razões para sua escolha.



10. Um mapa de contorno de uma função f é apresentado. Utilize-o para estimar $f_x(2, 1)$ e $f_y(2, 1)$.



11. Se $f(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$, determine $f_x(1, 2)$ e $f_y(1, 2)$ e interprete esses números como inclinações. Ilustre ou com um esboço à mão ou utilizando o computador.
12. Se $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$, determine $f_x(1, 0)$ e $f_y(1, 0)$ e interprete esses números como inclinações. Ilustre ou com um esboço à mão ou utilizando o computador.
- 13-14 Determine f_x e f_y e faça os gráficos f , f_x e f_y com domínios e pontos de vista que lhe permitam ver a relação entre eles.

13. $f(x, y) = x^2y^3$

14. $f(x, y) = \frac{y}{1 + x^2y^2}$

15-40 Determine as derivadas parciais de primeira ordem da função.

15. $f(x, y) = y^5 - 3xy$

16. $f(x, y) = x^4y^3 + 8x^2y$

17. $f(x, t) = e^{-t} \cos \pi x$

18. $f(x, t) = \sqrt{x} \ln t$

19. $z = (2x + 3y)^{10}$

20. $z = \lg xy$

21. $f(x, y) = \frac{x}{y}$

22. $f(x, y) = \frac{x}{(x + y)^2}$

23. $f(x, y) = \frac{ax + by}{cx + dy}$

24. $w = \frac{e^v}{u + v^2}$

25. $g(u, v) = (u^2v - v^3)^5$

26. $f(x, t) = \arctg(x\sqrt{t})$

27. $w = \sin \alpha \cos \beta$

28. $f(x, y) = x^y$

29. $F(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt$

30. $F(\alpha, \beta) = \int_\alpha^\beta \sqrt{t^3 + 1} dt$

31. $f(x, y, z) = xz - 5x^2y^3z^4$

32. $f(x, y, z) = x \sin(y - z)$

33. $w = \ln(x + 2y + 3z)$

34. $w = ze^{xyz}$

35. $u = xy \sin^{-1}(yz)$

36. $u = x^{yz}$

37. $h(x, y, z, t) = x^2y \cos(z/t)$

38. $\phi(x, y, z, t) = \frac{\alpha x + \beta y^2}{\gamma z + \delta y^2}$

39. $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

40. $u = \sin(x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$

41-44 Determine as derivadas parciais indicadas.

41. $f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$; $f_x(3, 4)$

42. $f(x, y) = \arctg(y/x)$; $f_x(2, 3)$

43. $f(x, y, z) = \frac{y}{x + y + z}$; $f_y(2, 1, -1)$

44. $f(x, y, z) = \sqrt{\sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z}$; $f_z(0, 0, \pi/4)$

45-46 Use a definição de derivadas parciais como limites [4] para encontrar $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$.

45. $f(x, y) = xy^2 - x^3y$ 46. $f(x, y) = \frac{x}{x + y^2}$

47-50 Use a derivação implícita para encontrar $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$.

47. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 48. $x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$

49. $e^z = xyz$ 50. $yz + x \ln y = z^2$

51-52 Determine $\partial z/\partial x$ e $\partial z/\partial y$.

51. (a) $z = f(x) + g(y)$ (b) $z = f(x + y)$

52. (a) $z = f(x)g(y)$ (b) $z = f(xy)$
(c) $z = f(x/y)$

53-58 Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem.

53. $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$ 54. $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$

55. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ 56. $v = \frac{xy}{x - y}$

57. $z = \arctg \frac{x + y}{1 - xy}$ 58. $v = e^{xy}$

59-62 Verifique se a conclusão do Teorema de Clairaut é válida, isto é, $u_{xy} = u_{yx}$.

59. $u = x^4y^3 - y^4$

60. $u = e^{xy} \sin y$

61. $u = \cos(x^2y)$

62. $u = \ln(x + 2y)$

63-70 Determine a(s) derivada(s) parcial(is) indicada(s).

63. $f(x, y) = x^4y^2 - x^3y$; f_{xxx} , f_{yyx}

64. $f(x, y) = \sin(2x + 5y)$; f_{yxy}

65. $f(x, y, z) = e^{xyz^2}$; f_{xyz}

66. $g(r, s, t) = e^r \sin(st)$; g_{rst}

67. $u = e^{r\theta} \sin \theta$; $\frac{\partial^3 u}{\partial r^2 \partial \theta}$

68. $z = u\sqrt{v - w}$; $\frac{\partial^3 z}{\partial u \partial v \partial w}$

69. $w = \frac{x}{y + 2z}$; $\frac{\partial^3 w}{\partial z \partial y \partial x}$, $\frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y}$

70. $u = x^a y^b z^c$; $\frac{\partial^6 u}{\partial x \partial y^2 \partial z^3}$

71. Se $f(x, y, z) = xy^2z^3 + \arcsin(x\sqrt{z})$, determine f_{xyz} . [Dica: Qual ordem de diferenciação é a mais fácil?]


72. Se $g(x, y, z) = \sqrt{1 + xz} + \sqrt{1 - xy}$, determine g_{xyz} . [Dica: Use uma ordem de diferenciação diferente para cada termo.]

73. Use a tabela de valores de $f(x, y)$ para estimar os valores de $f_x(3, 2)$, $f_x(3, 2, 2)$ e $f_{xy}(3, 2)$.

$\begin{matrix} y \\ x \end{matrix}$	1,8	2,0	2,2
2,5	12,5	10,2	9,3
3,0	18,1	17,5	15,9
3,5	20,0	22,4	26,1

74. As curvas de nível são mostradas para uma função f . Determine se as seguintes derivadas parciais são positivas ou negativas no ponto P .

(a) f_x (b) f_y (c) f_{xx}
(d) f_{xy} (e) f_{yy}



75. Verifique se a função $u = e^{-\alpha^2 k^2 t} \sin kx$ é solução da equação de condução do calor $u_t = \alpha^2 u_{xx}$.

76. Determine se cada uma das seguintes funções é solução da equação de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

(a) $u = x^2 + y^2$ (b) $u = x^2 - y^2$
(c) $u = x^3 + 3xy^2$ (d) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$
(e) $u = \sin x \cosh y + \cos x \sinh y$
(f) $u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$

77. Verifique se a função $u = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ é uma solução da equação de Laplace tridimensional $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$.

78. Mostre que cada uma das seguintes funções é uma solução da equação da onda $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

(a) $u = \sin(kx) \sin(akt)$
(b) $u = t/(a^2 t^2 - x^2)$
(c) $u = (x - at)^6 + (x + at)^6$
(d) $u = \sin(x - at) + \ln(x + at)$

79. Se f e g são funções duas vezes diferenciáveis de uma única variável, mostre que a função

$$u(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$$

é solução da equação de onda dada no Exercício 78.

80. Se $u = e^{a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n}$, onde $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = 1$, mostre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = u$$

81. Verifique que a função $z = \ln(e^x + e^y)$ é uma solução das equações diferenciais

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

e

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$$

82. A temperatura em um ponto (x, y) de uma chapa de metal é dada por $T(x, y) = 60/(1 + x^2 + y^2)$, onde T é medido em $^\circ\text{C}$ e x, y em metros. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto $(2, 1)$ em (a) a direção x e (b) a direção y .

83. A resistência total R produzida por três condutores com resistência R_1, R_2 e R_3 conectados em paralelo em um circuito elétrico é dada pela fórmula

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Determine $\partial R / \partial R_1$.

84. Mostre que a função produção de Cobb-Douglas $P = bL^\alpha K^\beta$ satisfaz a equação

$$L \frac{\partial P}{\partial L} + K \frac{\partial P}{\partial K} = (\alpha + \beta)P$$

85. Mostre que a função produção de Cobb-Douglas satisfaz $P(L, K_0) = C_1(K_0)L^\alpha$ resolvendo a equação diferencial

$$\frac{dP}{dL} = \alpha \frac{P}{L}$$

(Veja a Equação 6.)

86. Cobb e Douglas usaram a equação $P(L, K) = 1,01L^{0,75}K^{0,25}$ para o modelo de economia norte-americana de 1899 a 1922, onde L é a quantidade de trabalho e K , a quantidade de capital. (Veja o Exemplo 3 na Seção 14.1.)

(a) Calcule P_L e P_K .

(b) Encontre a produtividade marginal de trabalho e a produtividade marginal de capital no ano de 1920, quando $L = 194$ e $K = 407$ (em comparação com os valores atribuídos $L = 100$ e $K = 100$ em 1899). Interprete os resultados.

(c) No ano de 1920, o que trouxe mais benefícios para a produção: um aumento no capital de investimento ou um aumento nos gastos com mão de obra?

87. A equação de van der Waals para n mols de um gás é

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

onde P é a pressão, V é o volume e T é a temperatura do gás. A constante R é a constante universal de gás e a e b são constantes positivas que são características de um gás em particular. Calcule $\partial T / \partial P$ e $\partial P / \partial V$.

88. A lei dos gases para uma massa fixa m de um gás ideal à temperatura absoluta T , pressão P e volume V é $PV = mRT$, onde R é a constante do gás. Mostre que

$$\frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

89. Para o gás ideal do Exercício 88, mostre que

$$T \frac{\partial P}{\partial T} \frac{\partial V}{\partial T} = mR$$

90. O índice de sensação térmica é modelado pela função

$$W = 13,12 + 0,6215T - 11,37v^{0,16} + 0,3965Tv^{0,16}$$


onde T é a temperatura ($^\circ\text{C}$) e v , a velocidade do vento (km/h). Quando $T = -15^\circ\text{C}$ e $v = 30$ km/h, quanto você espera que a temperatura aparente W caia se a temperatura real decrescer em 1°C ? E se a velocidade do vento aumentar em 1 km/h?

91. A energia cinética de um corpo com massa m e velocidade v é $K = \frac{1}{2}mv^2$. Mostre que

$$\frac{\partial K}{\partial m} \frac{\partial^2 K}{\partial v^2} = K$$

92. Se a, b e c são os lados de um triângulo e A, B e C são os ângulos opostos, determine $\partial A / \partial a$, $\partial A / \partial b$ e $\partial A / \partial c$ pela derivação implícita da Lei dos Cossenos.

93. Disseram-lhe que existe uma função f cujas derivadas parciais são $f_x(x, y) = x + 4y$ e $f_y(x, y) = 3x - y$. Você deve acreditar nisso?

 94. O parabolóide $z = 6 - x - x^2 - 2y^2$ intercepta o plano $x = 1$ em uma parábola. Determine as equações paramétricas para a reta tangente a essa parábola no ponto $(1, 2, -4)$. Use um computador para fazer o gráfico do parabolóide, da parábola e da reta tangente em uma mesma tela.

95. O elipsoide $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 16$ intercepta o plano $y = 2$ em uma elipse. Determine as equações paramétricas da reta tangente a essa elipse no ponto $(1, 2, 2)$.

96. No estudo de penetração do congelamento descobriu-se que a temperatura T no instante t (medido em dias) a uma profundidade x (medida em metros) pode ser modelada pela função


$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-\lambda x} \sin(\omega t - \lambda x)$$


onde $\omega = 2\pi/365$ e λ é uma constante positiva.

(a) Determine $\partial T / \partial x$. Qual seu significado físico?

(b) Determine $\partial T / \partial t$. Qual seu significado físico?

(c) Mostre que T satisfaz a equação do calor $T_t = k T_{xx}$ para uma certa constante k .

 (d) Se $\lambda = 0,2$, $T_0 = 0$ e $T_1 = 10$, use um computador para traçar o gráfico de $T(x, t)$.

(e) Qual é o significado físico do termo $-\lambda x$ na expressão $\sin(\omega t - \lambda x)$? 

97. Utilize o Teorema de Clairaut para mostrar que, se as derivadas parciais de terceira ordem de f forem contínuas, então

$$f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$$

98. (a) Quantas derivadas parciais de n -ésima ordem têm uma função de duas variáveis?

(b) Se essas derivadas parciais forem contínuas, quantas delas podem ser distintas?

(c) Responda a parte (a) da questão para uma função de três variáveis.

99. (a) Se $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-3/2} e^{\sin(x^2 y)}$, determine $f_x(1, 0)$.

[Dica: Em vez de determinar $f_x(x, y)$ primeiro, observe que é mais fácil utilizar a Equação 1 ou a Equação 2.]

100. (a) Se $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$, determine $f_x(0, 0)$.

101. (a) . Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) Use um computador para traçar o gráfico de f .

(b) Determine $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ quando $(x, y) \neq (0, 0)$.

(c) Determine $f_x(0, 0)$ e $f_y(0, 0)$ usando as Equações 2 e 3.


(d) Mostre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ e $f_{yx}(0, 0) = 1$.

(e) O resultado da parte (d) contradiz o Teorema de Clairaut?




Use os gráficos de f_{xy} e f_{yx} para ilustrar sua resposta.

EXERCÍCIOS 14.3

1. (a) A taxa de variação da temperatura quando a longitude varia, com a latitude e o tempo fixados; a taxa de variação quando apenas a latitude varia; a taxa de variação quando apenas o tempo varia.
(b) Positiva, negativa, positiva
3. (a) $f_T(-15, 30) \approx 1,3$; para uma temperatura de -15°C e velocidade do vento de 30 km/h, o índice de sensação térmica sobe para $1,3^\circ\text{C}$ para cada grau de elevação da temperatura. $f_v(-15, 30) \approx -0,15$; para uma temperatura de -15°C e velocidade do vento de 30 km/h, o índice de sensação térmica cai para $0,15^\circ\text{C}$ para cada km/h de aumento da velocidade do vento.
(b) Positiva, negativa (c) 0
5. (a) Positiva (b) Negativa
7. (a) Positiva (b) Negativa
9. $c = f$, $b = f_x$, $a = f_y$
11. $f_x(1, 2) = -8 =$ inclinação de C_1 , $f_y(1, 2) = -4 =$ inclinação de C_2



13.



15. $f_x(x, y) = -3y, f_y(x, y) = 5y^4 - 3x$

17. $f_x(x, t) = -\pi e^{-t} \sin \pi x, f_t(x, t) = -e^{-t} \cos \pi x$

19. $\partial z / \partial x = 20(2x + 3y)^9, \partial z / \partial y = 30(2x + 3y)^9$

21. $f_x(x, y) = 1/y, f_y(x, y) = -x/y^2$

23. $f_x(x, y) = \frac{(ad - bc)y}{(cx + dy)^2}, f_y(x, y) = \frac{(bc - ad)x}{(cx + dy)^2}$

25. $g_u(u, v) = 10uv(u^2v - v^3)^4, g_v(u, v) = 5(u^2 - 3v^2)(u^2v - v^3)^4$

27. $\partial w / \partial \alpha = \cos \alpha \cos \beta, \partial w / \partial \beta = -\sin \alpha \sin \beta$

29. $F_x(x, y) = \cos(e^x), F_y(x, y) = -\cos(e^y)$

31. $f_x = z - 10xy^3z^4, f_y = -15x^2y^2z^4, f_z = x - 20x^2y^3z^3$

33. $\partial w / \partial x = 1/(x + 2y + 3z), \partial w / \partial y = 2/(x + 2y + 3z),$
 $\partial w / \partial z = 3/(x + 2y + 3z)$

35. $\partial u / \partial x = y \sin^{-1}(yz), \partial u / \partial y = x \sin^{-1}(yz) + xyz / \sqrt{1 - y^2z^2},$
 $\partial u / \partial z = xy^2 / \sqrt{1 - y^2z^2}$

37. $h_x = 2xy \cos(z/t), h_y = x^2 \cos(z/t),$
 $h_z = (-x^2y/t) \sin(z/t), h_t = (x^2yz/t^2) \sin(z/t)$

39. $\partial u / \partial x_i = x_i / \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

41. $\frac{1}{5}$ 43. $\frac{1}{4}$ 45. $f_x(x, y) = y^2 - 3x^2y, f_y(x, y) = 2xy - x^3$

47. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{3y}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y}{3z}$

49. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz}{e^z - xy}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{e^z - xy}$

51. (a) $f'(x), g'(y)$ (b) $f'(x + y), f'(x + y)$

53. $f_{xx} = 6xy^5 + 24x^2y, f_{xy} = 15x^2y^4 + 8x^3 = f_{yx}, f_{yy} = 20x^3y^3$

55. $w_{uu} = v^2/(u^2 + v^2)^{3/2}, w_{uv} = -uv/(u^2 + v^2)^{3/2} = w_{vu},$
 $w_{vv} = u^2/(u^2 + v^2)^{3/2}$

57. $z_{xx} = -2x/(1 + x^2)^2, z_{xy} = 0 = z_{yx}, z_{yy} = -2y/(1 + y^2)^2$

63. $24xy^2 - 6y, 24x^2y - 6x$ 65. $(2x^2y^2z^5 + 6xyz^3 + 2z)e^{xyz^2}$


67. $\theta e^{\theta}(2 \sin \theta + \theta \cos \theta + r \theta \sin \theta)$ 69. $4/(y + 2z)^3, 0$

71. $6yz^2$ 73. $\approx 12,2, \approx 16,8, \approx 23,25$ 83. R^2/R_1^2

87. $\frac{\partial T}{\partial P} = -\frac{V - nb}{nR}, \frac{\partial P}{\partial V} = \frac{2n^2a}{V^3} - \frac{nRT}{(V - nb)^2}$

93. Não 95. $x = 1 + t, y = 2, z = 2 - 2t$ 99. -2

101. (a)



(b) $f_x(x, y) = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}, f_y(x, y) = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}$

(c) 0, 0 (e) Não, uma vez que f_{xy} e f_{yx} não são contínuas.