

# Mit dem Sinus modellieren

Kirill Heitzler

18. Januar 2021

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Rückblick</b>	<b>3</b>
1.1	Rechtwinkliges Dreieck - Beschriftung . . . . .	3
1.2	Der Sinus . . . . .	3
1.3	Der Sinus - Beispiel Aufgabe . . . . .	4
1.4	Der Kosinus und der Tangens . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Einheitskreis</b>	<b>6</b>
2.1	Einheitskreis - Beispiel . . . . .	6
2.2	Der Sinus und Kosinus am Einheitskreis . . . . .	7
2.3	Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus und Tangens . . . . .	7
2.4	Einheitskreis - Definition . . . . .	9
2.5	Einheitskreis - Aufgabe . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Mit dem Sinus modellieren</b>	<b>10</b>
3.1	Mit dem Sinus modellieren - Beispiel . . . . .	10
3.2	Winkel $\alpha$ mit $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ . . . . .	10
3.3	Erweiterter Winkel $\alpha$ mit $90^\circ < \alpha \leq 360^\circ$ . . . . .	11
3.4	Funktion $f$ mit $f(\alpha)$ . . . . .	11
3.5	Sinusfunktion im Gradmaß - Definition . . . . .	11
3.6	Graph einer Sinusfunktion zeichnen . . . . .	12
3.7	Einen Zeitlichen Vorgang modellieren . . . . .	12
3.8	Erweiterter Winkel $\alpha$ mit $90^\circ < \alpha \leq 360^\circ$ - Aufgabe . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Anwendungsbeispiele / Weiter Anwendungen</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Quellen</b>	<b>14</b>

# 1 Rückblick

## 1.1 Rechtwinkliges Dreieck - Beschriftung




Abbildung 1: Rechtwinkliges Dreieck

Das Rechtwinklige Dreieck wird folgendermaßen wie in Abbildung 1 beschriftet.

Die Ecken werden mit den Buchstaben A, B, C gegen den Uhrzeigersinn bei A angefangen beschriftet.

Die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  werden in die Ecken der entsprechenden Buchstaben A, B, C gesetzt.

Die anliegende Kathete zu Winkel  $\alpha$  wird 'Ankathete von  $\alpha$ ' genannt und die Kathete gegenüber von Alpha wird 'Gegenkathete von  $\alpha$ ' genannt.

Die Hypotenuse liegt gegenüber des Rechten Winkel  $\gamma$ .

## 1.2 Der Sinus

**Definition:** In einem rechtwinkligen Dreieck nennt man zu einem Winkel  $\alpha$  des Dreiecks das Streckenverhältnis

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (1)$$

den **Sinus von  $\alpha$**




Abbildung 2: Rechtwinkliges Dreieck

### 1.3 Der Sinus - Beispiel Aufgabe

**Gegenkathete von  $\alpha$  mithilfe des Sinus berechnen:**

**Aufgabe:** Berechne die Höhe des Freiburger Münsters. Das rechtwinklige Dreieck in Abbildung 3 besitzt einen rechten Winkel ( $90^\circ$ ), die Hypotenuse 164,05 Meter und die Winkelweite des Winkels  $\alpha$  mit  $45^\circ$ . Berechne die Gegenkathete von  $\alpha$  nennen's  $x$ . **Rechnung:**




Abbildung 3: Rechtwinkliges Dreieck am Münster

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypothenuse}} \quad (1)$$

$$\sin(45) = \frac{x}{164,05m} \quad | \cdot 164,05m \quad (2)$$

$$\sin(45) \cdot 164,05m = x \quad (3)$$

$$x \cong 116m \quad (4)$$

**Antwort:** Die Gegenkathete von  $\alpha$  beträgt etwa 116 Meter, somit ist das Münster auch etwa 116 Meter groß.

## 1.4 Der Kosinus und der Tangens

**Sinus von  $\alpha$ :**

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (1)$$




Abbildung 4: Rechtwinkliges Dreieck

**Cosinus von  $\alpha$ :**

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (1)$$




Abbildung 5: Rechtwinkliges Dreieck

**Tangens von  $\alpha$ :**

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Ankathete von } \alpha} \quad (1)$$




Abbildung 6: Rechtwinkliges Dreieck

## 2 Einheitskreis

### 2.1 Einheitskreis - Beispiel

**Aufgaben-Text:** Auf einem kresiförmigen Koordinatensystem eines Radarschirms Abbildung 7 wird die Lage von zwei Schiffen durch die Entfernung zum Hafen(0) und durch den Kurs gegenüber der x-Achse beschrieben.

**Aufgabe:** Ein Schiff **A** ist mit dem Kurs **30°** gegenüber der x-Achse **einen Kilometer** weit gefahren. Welche Koordinaten im **x-y-Kooradinatensystem** hat es? Welche Koordinaten hat das Schiff **B**, das mit dem Kurs **75°** textbfeinen Kilometer weit gefahren ist?




Abbildung 7: Radar

#### Lösung:

Das Schiff **A** mit dem Kurs **30°** befindet sich auf der x-Achse: etwa **0,86 Kilometer** und y-Achse: **0,5 Kilometer**. Also auf dem Punkt **A(0,86|0,5)**

Das Schiff **B** mit dem Kurs **75°** befindet sich auf der x-Achse: etwa **0,25 Kilometer** und y-Achse: **0,96 Kilometer**. Also auf dem Punkt **A(0,25|0,96)**




Abbildung 8: Radar Lösung

## 2.2 Der Sinus und Kosinus am Einheitskreis

Dreiecke mit der **Hypotenusenlänge 1** kann man in einem Koordinatensystem auf folgenden Weise darstellen:

1. Die Endpunkte der **Hypotenuse** sind der Ursprung  $O$  und ein Punkt  $P$ , der auf einem Kreis  $O$  mit dem **Radius 1** liegt. Diesen Kreis nennt man den **Einheitskreis**.
2. Die Ecke mit dem rechten Winkel liegt auf der **x-Achse senkrecht unter  $P$** . Der Punkt  $P$  hat somit Koordinaten  $P(\cos(\alpha)|\sin(\alpha))$




Abbildung 9: Sinus und Kosinus am Einheitskreis

## 2.3 Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus und Tangens




Abbildung 10: Beziehung 1

1. Für  $0 < \alpha < 90$  nimmt  $\sin(\alpha)$  mit wachsendem  $\alpha$  zu und  $\cos(\alpha)$  ab (Abbildung 10a).  $\sin(0) = 0, \cos(0) = 1$  (Abbildung 10b),  $\sin(90) = 1, \cos(90) = 0$  (Abbildung 10c).

**2.** Wendet man auf das im Einheitskreis dargestellte Dreieck den Satz des Pythagoras an (Abbildung 11), so erhält man den für jede Winkelweite gültigen Zusammenhang

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1.$$

Beispiel:

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \quad (1)$$

$$(\sin(45))^2 + (\cos(45))^2 = 1 \quad (2)$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1 \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2^2}}{2^2} + \frac{\sqrt{2^2}}{2^2} = 1 \quad (4)$$

$$\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1 \quad (5)$$

$$0,5 + 0,5 = 1 \quad (6)$$




Abbildung 11: Einheitskreis Dreieck Satz des Pythagoras

**3.** In Abbildung 12 sieht man:

$$\sin(90 - \alpha) = x = \cos(\alpha) \text{ und}$$

$$\cos(90 - \alpha) = y = \sin(\alpha)$$

**Beispiel:**

$$\sin(90 - \alpha) = x = \cos(\alpha) \quad (1)$$

$$\sin(90 - 30) = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos(30) \quad (2)$$




Abbildung 12:  $\sin(90^\circ - \alpha)$ ,  $\cos(90^\circ - \alpha)$

**4.** Ebenfalls in Abbildung 12:

$$\tan(\alpha) = \frac{y}{x} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}.$$



## 2.4 Einheitskreis - Definition

**Definition:** Es gilt:

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\sin(90 - \alpha) = \cos(\alpha)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}, \alpha \neq 90, \text{ weil: } \tan(90) = \frac{\sin(90)}{\cos(90)} = \frac{1}{0} = !.$$

## 2.5 Einheitskreis - Aufgabe

**Aufgabe:**  $\sin(\alpha) = 0,6$ .

**Bestimme:**

<b>a)</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>e)</b>
$\cos(\alpha)$	$\tan(\alpha)$	$\sin(90 - \alpha)$	$\cos(90 - \alpha)$	$\tan(90 - \alpha)$

**a) - Lösung:**

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \quad (1)$$

$$0,6^2 + \cos^2(\alpha) = 1 \quad | -0,6^2 \quad (2)$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - 0,36 \quad | \sqrt{\quad} \quad (3)$$

$$\cos(\alpha) = \sqrt{1 - 0,36} \quad (4)$$

$$\cos(\alpha) = \sqrt{0,64} \quad (5)$$

$$\cos(\alpha) = 0,8 \quad (6)$$

**b) - Lösung:**

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \quad (1)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{0,6}{0,8} = \frac{6}{8} \quad (2)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{3}{4} = 0,75 \quad (3)$$

**c) - Lösung:**

$$\sin(90 - \alpha) = \cos(\alpha) = 0,8 \quad (1)$$

**d) - Lösung:**

$$\cos(90 - \alpha) = \sin(\alpha) = 0,6 \quad (1)$$

**e) - Lösung:**

$$\tan(90 - \alpha) = \frac{\sin(90 - \alpha)}{\cos(90 - \alpha)} = \frac{0,8}{0,6} \quad (1)$$

$$\tan(90 - \alpha) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \quad (2)$$

### 3 Mit dem Sinus modellieren

#### 3.1 Mit dem Sinus modellieren - Beispiel

Aufgabe:



Abbildung 13: Schaufelraddampfer

Bei einem Schaufelraddampfer dreht sich das Rad mit einem Durchmesser von 2 Meter einmal vollständig in 60 Sekunden (Abbildung 13). In welcher Höhe über dem Wasserspiegel liegt der rot markierte Punkt A?

Erstelle eine Wertetabelle in 5 Sekunden Schritten.

**Lösung:**

Zeit t (in s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Winkel $\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$	$210^\circ$	$240^\circ$	$270^\circ$	$300^\circ$	$330^\circ$	$360^\circ$
Höhe h (in m)	0	0,5	0,87	1	0,87	0,5	0	-0,5	-0,87	-1	-0,87	-0,5	0

#### 3.2 Winkel $\alpha$ mit $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

Am Einheitskreis entspricht  $\sin(\alpha)$  der y-Koordinate des Punktes P (Abbildung 14).

$\sin(40^\circ) \approx 0,64$




Abbildung 14: Winkel  $\alpha$  mit  $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$

### 3.3 Erweiterter Winkel $\alpha$ mit $90^\circ < \alpha \leq 360^\circ$




Abbildung 15: Erweiterter Winkel  $\alpha$  mit  $90^\circ < \alpha \leq 360^\circ$

Wird  $\alpha$  über  $90^\circ$  vergrößert, wird der Sinuswert von  $\alpha$  ebenso als y-Koordinate des Punktes P festgelegt (Abbildung 15).

### 3.4 Funktion f mit $f(\alpha)$

Ordnet man jedem Winkel  $\alpha$  mit  $0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$  seinen Sinuswert zu, so erhält man eine Funktion f mit  $f(\alpha) = \sin(\alpha)$ .

Man kann mithilfe des Graphen von f (Abbildung 16) zu gegebenem Winkel den Sinuswert näherungsweise ablesen oder näherungsweise Winkel mit vorgegebenem Sinuswert ermitteln.




Abbildung 16:  $f(\alpha) = \sin(\alpha)$

### 3.5 Sinusfunktion im Gradmaß - Definition

Die Funktion f mit  $f(\alpha) = \sin(\alpha)$  heißt **Sinusfunktion im Gradmaß**.

### 3.6 Graph einer Sinusfunktion zeichnen

Zeit t (in s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Winkel $\alpha$	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°	360°
Höhe h (in m)	0	0,5	0,87	1	0,87	0,5	0	-0,5	-0,87	-1	-0,87	-0,5	0

Grafik

### 3.7 Einen Zeitlichen Vorgang modellieren

### 3.8 Erweiterter Winkel $\alpha$ mit $90^\circ < \alpha \leq 360^\circ$ - Aufgabe




Abbildung 17:  $\alpha = 0$

#### Aufgabe:

Ein Punkt P bewegt sich auf dem Einheitskreis (Abbildung 17) gegen den Uhrzeigersinn. Für  $\alpha = 0^\circ$  befindet er sich im Punkt (1|0).

a) Gib die y-Koordinate des Punktes P für  $\alpha = 140^\circ$  und für  $\alpha = 310^\circ$  an.

b) Bestimme zwei verschiedene Werte für  $\alpha$ , sodass seine y-Koordinate 0,8 beträgt.

#### Lösung:

#### Lösung - a)

Für  $\alpha = 140^\circ$ :

$$\sin(\alpha) = y \quad (1)$$

$$\sin(140) \approx 0,64 \quad (2)$$

$$\cos(\alpha) = x \quad (3)$$

$$\cos(140) \approx -0,77 \quad (4)$$

Punkt (-0,77|0,64)

Für  $\alpha = 310^\circ$ :

$$\sin(\alpha) = y \quad (1)$$

$$\sin(310) \approx -0,77 \quad (2)$$

$$\cos(\alpha) = x \quad (3)$$

$$\cos(310) \approx 0,64 \quad (4)$$

Punkt (0,64|-0,77)

**Lösung - b)**text

4 Zusammenfassung

5 Anwendungsbeispiele / Weiter Anwendungen

## 6 Quellen

- Freiburger Münster - <https://freiburg-schwarzwald.de/fotos06feb/freiburg12-060227.jpg>
- Vector Boot - <https://www.vecteezy.com/vector-art/170704-flat-ship-vectors>
- Lambacher Schweizer 9(S. 90 - 104) - Mathematik Buch