第 二 章

吃：一天三顿，能救回来

> 问题通常不是「不知道要健康」，是没时间、没条件、没得选。

返校那天下午，箱子摊在床上。

妈妈往缝里塞核桃，说这个顶饿。你说装不下了，她还是塞进去了。

箱子拉链是硬拉上的。

三周后回来，那袋核桃还在柜子最里面，一动没动。

返校那天的下午

2.1 返校那天，你其实在决定三周的饭

装行李的时候，大部分人是按「能放多久」挑的：饼干、面包、火腿肠、泡面，越耐放越往里塞。

结果背了三周，真吃进去的还是食堂那几样，多出来的全是碳水。家里塞的那袋核桃，往往到第三周还躺在柜子里。

所以挑之前先问一句：这东西**食堂有没有**？

按这三条筛：食堂给不了、放得住三周、补的是最容易缺的那几样。

补什么	带什么	为什么食堂补不上
钙	常温纯牛奶（利乐包），或全脂奶粉	食堂几乎不供奶。膳食指南建议每天 300ml 以上液态奶
好脂肪、镁	原味混合坚果，25g 小包	食堂不做坚果。膳食宝塔建议每周约 70g，合每天 10g
维生素 C、纤维	苹果、橘子、梨	食堂水果少，或者干脆没有。指南建议每天 200–350g
铁	真空装牛肉干、卤蛋	女生月经失血，铁需求比男生高；食堂红肉给多少不稳定
错过饭点的蛋白	无糖豆浆粉、奶粉，小袋装	食堂只在饭点开门，错过就是错过
早饭那一口	即食燕麦片，小袋	食堂早饭以白粥馒头为主，两节课后就饿

不要带的：酸奶（要冷藏）、切好的水果、熟食、奶油蛋糕。这些东西在柜子里放两天就开始变，而你吃不出来。

存放三条：柜子最下层，避光，离暖气远一点；开封的先吃；坚果买小包——一整袋开了封，油脂会慢慢氧化，吃到后面那股哈喇味就是坏了。橘子别提前洗，吃之前再洗。

带多少，先算重量。三周按每天 300ml 奶算，差不多六升；装利乐包差不多二十四五盒，十二斤上下。加上坚果、水果、燕麦，返校那天你背不动，柜子也塞不下。

所以这张清单的主力是奶粉：一样的量，重量不到五分之一，一袋能冲一个月。利乐包只带第一周的七八盒，当早饭的现成货。水果也一样，一次带一周的量；家里中途来不了，就只带放得住的那几种。

这张清单真正的作用不是「带齐」，是让你在返校那天分清：哪些东西撑得到第三周，哪些撑不到。

> **关于「补脑」，先说句实话。**没有任何一种食物能让人变聪明，也没有哪样东西吃了就能学进去。但有四件事，和上课那几个小时的状态确实有关。

空腹上课。不吃早饭的那一上午，注意力和记忆力都比吃了的差。这条在系统综述里是最稳的一个结论。

脱水。身体掉 2% 的水，注意力和反应速度就会往下走。而很多人一上午想不起来喝，因为不渴——不渴不等于不缺。

缺铁。缺铁最先表现出来的不是脸色苍白，是「累、注意力不集中」。青春期女生因为月经失血，是重点人群。

血糖大起大落。白粥馒头消化快，两节课后就饿；饿急了拿零食顶，半小时后更困，然后下一顿又吃不下。

这四条都不靠补品：早饭别跳、水别断、每周吃几次红肉、别拿零食当饭。就这样。

2.2 一天到底吃多少

不用称，不用记热量。用手比就行：

蛋白质，一掌心。手掌大小、手掌厚的一块肉，或者两个鸡蛋、一杯奶、一块豆腐，都算一份。

主食，一拳。米饭、馒头、面条，一顿一拳。

蔬菜，两捧。两只手捧起来那么多，生的熟的都算。

这个标准不精确，但足够用。它解决的是同一个问题：你不需要知道「65 克蛋白质」是多少，你只需要看一眼自己的饭盒。

一个更简单的判断：如果一天下来，你连一掌心蛋白质都没吃到，那问题不在「吃多少」，在「吃什么」。

2.3 食堂怎么选

站在窗口前，按这个顺序看，三步：

1. **先找蛋白质**
   有没有肉、蛋、豆制品。有就先定它，别的往后放。

2. **再找绿的**
   一份青菜，哪怕只有一样。没有绿叶的，就找冬瓜、茄子、豆角。

3. **最后才是主食**

> 米饭馒头负责管饱，但它们不负责让你撑到第四节课。

两句补充。汤别当菜——大部分食堂的汤，盐和油比营养多。油炸的算肉，一周两三次没问题，天天吃就是另一笔账。

今天窗口就这几样，怎么组合

只有面或者粉：加一个蛋、一份青菜，汤别喝完。面能吃饱，但蛋白质和纤维都不够，两小时后又饿。

只有盖饭：让阿姨少浇一点汁，米饭吃三分之二。汁里的油和盐，比你看出来的多。

只有包子馒头：两个包子配一杯奶。全是碳水的话，第三节课一定饿，而且会困。

2.4 早饭，只有两种情况

食堂还开着

一碗粥或者豆浆，一个鸡蛋，一份主食。五分钟能吃完，也够撑到第四节课。

食堂已经关了

柜子里的常温奶，一小袋即食燕麦，一小把坚果。三分钟，不用排队，不用出宿舍楼。

> **早饭的意义不是「养生」。**是让你在第四节课的时候还听得进去。空着肚子上掉的那三节课，基本是白上的——这笔账，比一份早饭贵得多。

2.5 喝水：靠「想起来」是没用的

有个很常见的误会：以为不喝水是因为忘了。实际情况往往是——不渴，所以不想喝。

「记得多喝水」这种提醒，对前者无效，对后者也无效。有效的做法不是设目标（一天八杯），是设锚点：把喝水挂在某件一定会发生的事后面。

刷完牙，一杯。每节课下课回座位，喝一口。跑操回来，半杯。

水太淡喝不下去，加一片柠檬，或者一撮茶叶。不加糖。

够不够，看尿色：浅黄就行，深黄说明少了。

2.6 夜宵

晚自习结束到熄灯，中间那段时间是最饿的。这不是意志力的问题——晚饭到那时候隔了五六个小时，胃早就空了。

能吃的：牛奶、一小袋燕麦、一个水果、一小把坚果。

尽量不选的：泡面（汤喝干净的话，一顿的盐就超了）、辣的东西、冰的。

时间上有个绕不开的冲突：理想是睡前 3 小时不进食，可晚自习结束到熄灯就那么多时间，做不到。做不到就按顺序退——先减量（半杯奶、半个水果，别吃一整份），再减种类（不碰油的、辣的、甜的），最后才是时间。三条里做到一条，夜里反酸的概率就低一截。

2.7 零食的账

零食不是不能吃。要看的只有一件事：它多久让你再饿一次。

一包饼干，二十分钟。一小把坚果加一杯奶，两小时。同样是一口东西，差别在这儿。

所以判断标准很简单：如果一样东西吃完，你半小时内还想再吃，它就不是食物，是味道。

食堂给什么，你说了不算。但一顿里挑哪几样、吃多快、吃多少，是你说了算。