给高中生的身体使用说明

高中生
身体健康指北

吃、睡、动、心情，还有你的胃。

可以查，可以打印，不用从头读到尾。

高中三年，你会听到很多「要加油」。

这本书不加油。它想的是另一件事：别让你在半路上垮掉。

做法只有三件——说清楚身体是怎么一点点出问题的；帮你判断现在这个状况算不算事；告诉你什么时候该停下来，去医务室或者医院。

先给你看正文里的一句——

> 「还行吧」这三个字，是这个群体最标准的一种回答。它不代表没事，它代表**还没到忍不住的程度。**

如果你读到这儿停了一下，这本书大概就是写给你的。

用法 三句话

不用从头读	翻一章，直接看你在意的那部分；难受的时候回到上面那张索引，对号入座。**它是一本说明书，不是一本小说。**
翻页靠页码	每一章都从新的一页开始，索引里标了每章从第几页起。纸面上没有链接，找东西先看那张索引，别一页一页翻。
红旗先看	出现黑便、持续剧痛、高烧这类情况，不用往下读了，直接翻到第七章最后一页。

入口 如果你现在就不舒服

胃胀、反酸、吃不下、老想上厕所

第一章 · 八种状况，对号入座

早饭来不及、食堂就那几样、返校该带什么 7

第二章 · 一张清单和一笔用量

躺下睡不着，越躺越清醒 11

第三章 · 越努力越睡不着的原理

一考试就肚子疼、三周没回家、夜里难受 14

第四章 · 紧张之后做什么

腰酸、下午犯困、一整天没站起来 16

第五章 · 课间三分钟

眼睛干、度数又涨了、早上洗漱赶不及 18

第六章 · 看远和九人间

发烧了、疼得厉害、不知道要不要请假 20

第七章 · 红旗清单在最后一页

一句说明。这本册子是科普，不是诊断。它给的是「大概率」和「怎么办」，不是「你得了什么病」。持续不舒服，去校医务室或者医院——那里的医生能看到你，而这本书看不到。

第 一 章

你的胃，最先撑不住

> 高中三年，身体最先出问题的地方，大概率不是脑子，是胃。

六点四十，从食堂出来，手里一个饼。走到宿舍楼下正好啃完，塑料袋扔进门口的桶里。

上午第二节课，胃里开始发胀，像塞了团湿棉花。中午不太想吃，扒了两口。晚自习前又饿，从柜子里翻出两个从家里带来的小面包。

十一点躺下，肚子里咕噜咕噜地响。药盒在枕头边上，一直没打开。

寄宿学校的一个普通早上

这不是谁的特例。你翻开任何一个高三学生的抽屉，大概率能找到一盒消食片；问一句「胃怎么样」，得到的回答多半是「还行吧」，然后补一句「就是有时候胀」。

「还行吧」这三个字，是这个群体最标准的一种回答。它不代表没事，它代表**还没到忍不住的程度**。

1.1 胃为什么最先垮

胃是个特别被动的器官。它不挑你给它什么，只按你给的节奏干活。你给它什么温度、什么速度、什么时间，它就照着反应——而且从不抗议，只是记账。

第一笔账：吃得太快

咀嚼是消化的第一步。牙齿没干的活，会原封不动地推给胃。一口饭嚼五下就咽，胃就得用几倍的力气去磨。更麻烦的是空气——边走边吃、边说话边吃，吞进去的气量会翻好几倍。你觉得「胀」，很大一部分不是食物，是气。

第二笔账：时间乱

胃酸不是随时待命的。它有自己的分泌节律，大致跟着你平时的饭点走。今天七点吃、明天十二点吃，胃酸就会在错的时间出现：该有食物的时候空转，烧的是自己的黏膜；食物真来了，酸又不够，消化不动，还是胀。

第三笔账：吃完就躺

胃和食管之间有个阀门，叫贲门。趴桌、平躺、弯腰，腹压一高，胃里的东西就往上顶。烧心、反酸、喉咙里泛酸味，多半是这么来的。二十分钟的午睡能救回下午的课，但趴着睡的那二十分钟，胃在倒着干活。

还有两笔，不那么直接

睡不够。胃黏膜的修复主要在夜里进行。睡不够，修复时间就不够，黏膜的防御力跟着下降。这也是为什么熬夜之后的第二天，胃特别容易不舒服——不是巧合。

压力大。人紧张的时候，身体会切到应急模式：血液优先供给肌肉和大脑，消化系统被暂时关掉。偶尔一次没事。但如果这种状态持续几个月——月考、排名、家长会、倒计时牌——胃肠就会换一种方式提醒你：一考试就肚子疼，一

进考场就想上厕所，吃什么都胀。

这不是「心理作用」。这是真实的生理反应，有明确的机制，也有明确的应对办法。

1.2 现在这个状况，算不算事

下面这八种，是寄宿学校里最常见的。找到最像你的那条，看右边两栏。

吃完饭胀、老打嗝

大概率是

吃太快、吞气多，或者一顿吃太饱

现在能做

这顿慢点吃，饭后走十分钟，别马上坐下

什么时候该去医务室

连续两周以上没好转，或者体重在掉

早上起来恶心、不想吃

大概率是

前一晚吃太晚或太多，胃还没排空

现在能做

睡前 3 小时别再进食；早上先喝两口温水

什么时候该去医务室

反复呕吐，或者吐到喝不进水

反酸、胸口烧

大概率是

吃完就躺、吃太饱，贲门关不严

现在能做

饭后两小时别躺；睡觉把枕头垫高一点

什么时候该去医务室

吞咽困难，或者体重不明原因下降

肚子咕噜、放屁多

大概率是

吞气、乳糖不耐、豆类或碳酸饮料

现在能做

少喝碳酸；吃东西时把嘴闭上嚼

什么时候该去医务室

伴随腹泻、发烧，或者便里有黏液

三四天没排便

大概率是

水喝太少、纤维太少、坐得太久

现在能做

今天多喝两杯水，课间绕操场走一圈

什么时候该去医务室

超过一周，或者便中带血

一紧张就肚子疼、想上厕所

大概率是

情绪相关的肠道反应，这个年龄段很常见

现在能做

把呼吸放慢，呼气比吸气长；别空腹喝冷饮

什么时候该去医务室

疼到没法上课，或者已经影响到考试

疼得冒冷汗、位置固定、按下去更疼

大概率是

不是普通的「胃不舒服」，需要人看一眼

现在能做

别再忍，也别自己加药

什么时候该去医务室

现在就去，别等下课

一天拉三次以上、水样

大概率是

急性腹泻，多数是吃坏了或受凉

现在能做

补口服补液盐，别只灌白开水

什么时候该去医务室

口干、尿少、站起来发晕——这是脱水

出现下面任何一条，不用再观察

- 大便发黑、像柏油，或者呕出血
- 肚子持续剧痛超过 6 小时，而且越来越重
- 发烧超过 38.5℃
- 明显脱水：口干、尿少、站起来发晕
- 没刻意减肥，体重却在往下掉

这几条不代表一定很严重，但它们都过了「自己扛一扛」的界限。去医务室，或者让家里来接。

去医务室之前，先在心里过三样：什么时候开始的、吃了什么、疼了多久。这三样比「我肚子疼」有用得多——第七章还会用到。

1.3 这几个习惯，代价是什么

不谈「应该不应该」，只算账。左边是你现在做的，中间是这周你就会感觉到的，右边是三年之后它会拿走的东西。

习惯	短期内	长期
边走边吃，五分钟解决一顿	上午胀气、打嗝	胃动力紊乱，吃一点就饱
吃完趴桌上睡二十分钟	醒来嘴里发酸	贲门松弛，反流变成常态
用零食顶掉一顿正餐	半小时后更困	胃酸空转，黏膜慢性受损
有便意憋着，等下课	肚子胀、放屁多	直肠反应变迟钝，便秘固化
胃疼就吃片止痛药顶过去	疼是压下去了	布洛芬这类药本身伤胃，还会盖住真实病情

最后一条值得多说一句。止痛药不是不能吃，但反复胃疼、反复靠止痛药顶，是最糟的一种处理方式——它既没解决问题，又让问题变得更难看清，还顺手在胃黏膜上添了一笔。

1.4 十分钟，怎么吃对一顿

不要求你每顿都吃好。要求的是：一天里有一顿，是坐下来、慢慢吃完的。有这一顿，剩下的就好办很多。

1 先找一个「有蛋白质」的

鸡蛋、牛奶、豆浆、瘦肉、豆腐。食堂打菜时优先挑带肉的，或者加个蛋。蛋白质是最能拖住饿的那样东西——一顿里只有碳水，两节课就见底了。

2 **再加一个「能嚼的」**

一份青菜、一个玉米、半个红薯。纤维让胃有活干，也让血糖升得慢一点，不至于第三节课就犯困。

3 **水放在饭前，不要饭中猛灌**

饭前一杯水不占地方；吃饭时灌一大杯，胃被撑开，胀气来得更快。

如果只有十分钟，只能在路上吃

食堂打包：米饭 + 一份带肉的菜 + 一份青菜。带回宿舍吃没问题，但坐下来吃，别站着扒完。

只能买个饼：配一杯奶，或者加个鸡蛋。奶要是食堂没有，就自己带一箱进来。饼管饱，但撑不到第四节课——缺的是蛋白质。

早饭是最不该省的一顿。一上午六节课，空着肚子撑到中午，胃酸空转的时间比你想的长。

真正决定这三周吃得好不好的，不是你每天在窗口前挑什么，是返校那天箱子里装了什么。**这件事放在第二章。**

胃很能忍。它不舒服的时候不吭声，等它吭声，通常已经忍了很久。

第 二 章

吃：一天三顿，能救回来

> 问题通常不是「不知道要健康」，是没时间、没条件、没得选。

返校那天下午，箱子摊在床上。

妈妈往缝里塞核桃，说这个顶饿。你说装不下了，她还是塞进去了。

箱子拉链是硬拉上的。

三周后回来，那袋核桃还在柜子最里面，一动没动。

返校那天的下午

2.1 返校那天，你其实在决定三周的饭

装行李的时候，大部分人是按「能放多久」挑的：饼干、面包、火腿肠、泡面，越耐放越往里塞。

结果背了三周，真吃进去的还是食堂那几样，多出来的全是碳水。家里塞的那袋核桃，往往到第三周还躺在柜子里。

所以挑之前先问一句：这东西**食堂有没有**？

按这三条筛：食堂给不了、放得住三周、补的是最容易缺的那几样。

补什么	带什么	为什么食堂补不上
钙	常温纯牛奶（利乐包），或全脂奶粉	食堂几乎不供奶。膳食指南建议每天 300ml 以上液态奶
好脂肪、镁	原味混合坚果，25g 小包	食堂不做坚果。膳食宝塔建议每周约 70g，合每天 10g
维生素 C、纤维	苹果、橘子、梨	食堂水果少，或者干脆没有。指南建议每天 200–350g
铁	真空装牛肉干、卤蛋	女生月经失血，铁需求比男生高；食堂红肉给多少不稳定
错过饭点的蛋白	无糖豆浆粉、奶粉，小袋装	食堂只在饭点开门，错过就是错过
早饭那一口	即食燕麦片，小袋	食堂早饭以白粥馒头为主，两节课后就饿

不要带的：酸奶（要冷藏）、切好的水果、熟食、奶油蛋糕。这些东西在柜子里放两天就开始变，而你吃不出来。

存放三条：柜子最下层，避光，离暖气远一点；开封的先吃；坚果买小包——一整袋开了封，油脂会慢慢氧化，吃到后面那股哈喇味就是坏了。橘子别提前洗，吃之前再洗。

带多少，先算重量。三周按每天 300ml 奶算，差不多六升；装利乐包差不多二十四五盒，十二斤上下。加上坚果、水果、燕麦，返校那天你背不动，柜子也塞不下。

所以这张清单的主力是奶粉：一样的量，重量不到五分之一，一袋能冲一个月。利乐包只带第一周的七八盒，当早饭的现成货。水果也一样，一次带一周的量；家里中途来不了，就只带放得住的那几种。

这张清单真正的作用不是「带齐」，是让你在返校那天分清：哪些东西撑得到第三周，哪些撑不到。

> **关于「补脑」，先说句实话。**没有任何一种食物能让人变聪明，也没有哪样东西吃了就能学进去。但有四件事，和上课那几个小时的状态确实有关。

空腹上课。不吃早饭的那一上午，注意力和记忆力都比吃了的差。这条在系统综述里是最稳的一个结论。

脱水。身体掉 2% 的水，注意力和反应速度就会往下走。而很多人一上午想不起来喝，因为不渴——不渴不等于不缺。

缺铁。缺铁最先表现出来的不是脸色苍白，是「累、注意力不集中」。青春期女生因为月经失血，是重点人群。

血糖大起大落。白粥馒头消化快，两节课后就饿；饿急了拿零食顶，半小时后更困，然后下一顿又吃不下。

这四条都不靠补品：早饭别跳、水别断、每周吃几次红肉、别拿零食当饭。就这样。

2.2 一天到底吃多少

不用称，不用记热量。用手比就行：

蛋白质，一掌心。手掌大小、手掌厚的一块肉，或者两个鸡蛋、一杯奶、一块豆腐，都算一份。

主食，一拳。米饭、馒头、面条，一顿一拳。

蔬菜，两捧。两只手捧起来那么多，生的熟的都算。

这个标准不精确，但足够用。它解决的是同一个问题：你不需要知道「65 克蛋白质」是多少，你只需要看一眼自己的饭盒。

一个更简单的判断：如果一天下来，你连一掌心蛋白质都没吃到，那问题不在「吃多少」，在「吃什么」。

2.3 食堂怎么选

站在窗口前，按这个顺序看，三步：

1. **先找蛋白质**
   有没有肉、蛋、豆制品。有就先定它，别的往后放。

2. **再找绿的**
   一份青菜，哪怕只有一样。没有绿叶的，就找冬瓜、茄子、豆角。

3. **最后才是主食**

> 米饭馒头负责管饱，但它们不负责让你撑到第四节课。

两句补充。汤别当菜——大部分食堂的汤，盐和油比营养多。油炸的算肉，一周两三次没问题，天天吃就是另一笔账。

今天窗口就这几样，怎么组合

只有面或者粉：加一个蛋、一份青菜，汤别喝完。面能吃饱，但蛋白质和纤维都不够，两小时后又饿。

只有盖饭：让阿姨少浇一点汁，米饭吃三分之二。汁里的油和盐，比你看出来的多。

只有包子馒头：两个包子配一杯奶。全是碳水的话，第三节课一定饿，而且会困。

2.4 早饭，只有两种情况

食堂还开着

一碗粥或者豆浆，一个鸡蛋，一份主食。五分钟能吃完，也够撑到第四节课。

食堂已经关了

柜子里的常温奶，一小袋即食燕麦，一小把坚果。三分钟，不用排队，不用出宿舍楼。

> **早饭的意义不是「养生」。**是让你在第四节课的时候还听得进去。空着肚子上掉的那三节课，基本是白上的——这笔账，比一份早饭贵得多。

2.5 喝水：靠「想起来」是没用的

有个很常见的误会：以为不喝水是因为忘了。实际情况往往是——不渴，所以不想喝。

「记得多喝水」这种提醒，对前者无效，对后者也无效。有效的做法不是设目标（一天八杯），是设锚点：把喝水挂在某件一定会发生的事后面。

刷完牙，一杯。每节课下课回座位，喝一口。跑操回来，半杯。

水太淡喝不下去，加一片柠檬，或者一撮茶叶。不加糖。

够不够，看尿色：浅黄就行，深黄说明少了。

2.6 夜宵

晚自习结束到熄灯，中间那段时间是最饿的。这不是意志力的问题——晚饭到那时候隔了五六个小时，胃早就空了。

能吃的：牛奶、一小袋燕麦、一个水果、一小把坚果。

尽量不选的：泡面（汤喝干净的话，一顿的盐就超了）、辣的东西、冰的。

时间上有个绕不开的冲突：理想是睡前 3 小时不进食，可晚自习结束到熄灯就那么多时间，做不到。做不到就按顺序退——先减量（半杯奶、半个水果，别吃一整份），再减种类（不碰油的、辣的、甜的），最后才是时间。三条里做到一条，夜里反酸的概率就低一截。

2.7 零食的账

零食不是不能吃。要看的只有一件事：它多久让你再饿一次。

一包饼干，二十分钟。一小把坚果加一杯奶，两小时。同样是一口东西，差别在这儿。

所以判断标准很简单：如果一样东西吃完，你半小时内还想再吃，它就不是食物，是味道。

食堂给什么，你说了不算。但一顿里挑哪几样、吃多快、吃多少，是你说了算。

第 三 章

睡：熄灯之后

> 你不是不困。你是脑子还在跑，身体在等它停下来。

十点五十，熄灯。你躺下，闭眼。

脑子里开始放今天下午那道没做出来的题，然后是明天的听写，然后是月考排名，然后是三周后回家要带什么。

十一点半，你翻了个身。十二点十分，你开始想：明天肯定起不来。

熄灯之后的八十分钟

3.1 为什么越努力越睡不着

睡眠是少数几件「努力反而做不到」的事。它不是一个动作，是一个结果——你松开控制之后，它自己会发生。

一旦你开始监控「我睡着了没有」，大脑就进入了警戒状态。它得盯着一个指标，就不能下班。

所以「我要赶紧睡着」和「千万别紧张」是同一种错误：都在要求自己直接关掉一个关不掉的东西。

躺下十几分钟才睡着是正常的。真正的问题不在那十几分钟，在你在这十几分钟里做的事。

3.2 放空是怎么放的

有个细节值得说清楚：让人「不要想事情」通常不管用。因为「不要想」本身就是一个任务，大脑会一直检查「我做到了没有」。

有效的做法不是清空，是替换——给大脑一个足够无聊、又需要一点点注意力的活儿，让它没空自己找事。

1. **数呼吸**
   吸气数 1，呼气数 2，数到 10 从头来。走神了就从头数。走神不算失败，发现走神本身就是在练。

2. **从脚开始放松**
   脚趾、脚踝、小腿、膝盖……一个部位一个部位往上，每个地方停两三秒。走到哪儿算哪儿，没走完就睡着了是好事。

3. **想一个固定又无聊的画面**
   比如一条空走廊，灯一盏一盏亮着。每天想同一个，想久了它会变成开关。

三个的共同点：都占用了「想事情」的那部分注意力，但占用得很少。

3.3 午睡：二十分钟，或者不睡

午睡有个特别容易踩的坑：睡四十分钟。

二十分钟左右醒来，人是清楚的，起来就能用。超过半小时，身体开始往深睡走，这时候被铃声叫醒，会有二十分钟左右的昏沉——比不睡还难受。

所以要么二十分钟，要么睡满一个完整周期。宿舍里做不到后者，就老老实实定二十分钟。

还有姿势。趴桌上睡，压着胃（第一章说过反酸），压着手臂（醒来手麻），脖子还是折的。能靠椅背就靠椅背，垫件外套在桌上当枕头。

3.4 早上起不来，不是懒

把三件事摆在一起看：早读六点半到教室；有的人通勤一个半小时，五点就得出门；晚上十二点才睡着。

《健康中国行动（2019—2030年）》给高中生的建议是每天睡够 8 小时。按上面这个作息算，缺口在两小时以上。

缺口摆在这儿，靠「早点睡」补不回来——不是不想早，是熄灯时间和作业量都不由你定。

能补的只有两处：中午那二十分钟；以及回家那两天，别把作息彻底翻过来。

3.5 宿舍里的三个物理变量

影响睡眠的东西，一半在床上，一半在环境里。环境里能改的只有三样：

光。眼罩，几块钱，比任何助眠方法都直接。没有眼罩，用外套袖子搭在眼睛上。

声。耳塞，海绵的那种，捏细了塞进去，等它自己涨开。宿舍里总有人翻身、走动、说梦话。

温度。被子别太厚。太热会让人夜里反复醒，而「醒过」这件事第二天是记不住的，只记得「没睡好」。

三样加起来不到三十块。它们的共同点是：不要求你改变任何习惯，只是把干扰拿掉。

3.6 睡前那一小时

熄灯前那一小时，是全天最容易被浪费掉的一小时。没有手机，很多人就躺在床上等困。

这一小时做三件事，比多刷一套题划算：

1. **把明天要用的东西摆好**
   牙杯、毛巾、要穿的衣服，按用的顺序叠在一起。第二天早上能省下五分钟——第六章还会再讲一次。

2. **泡脚，或者洗个热水澡**
   体温先升后降，降的那一段会让人想睡。这是热水澡真正起作用的机制，不是「放松心情」。

3 **看几页闲书**

不是课本，不是错题本，是那种看完不会让你接着想事情的书。看困了就放下，不用读完一章。

反过来，这一小时里最好别做三件事：躺在床上想明天的安排（越想越清醒）；啃一道做不出来的难题（会带着情绪躺下）；和人聊让你上火的话题。

困意不是等来的，是攒出来的。白天见够光、动够，晚上把灯调暗，它自己会来。

3.7 下午那杯

提神的东西不是不能用，是要弄清楚它什么时候走。咖啡因在身体里减掉一半，大约要五小时——下午三点喝下去的一杯，到晚上八点还剩一半，到十一点还有三成。对一个本来就难入睡的人，这点量足够把「十几分钟」拖成一个小时。

麻烦在于它不总叫「咖啡」。奶茶、可乐、标着「提神」的功能饮料里都有。奶茶的茶底泡得浓，一杯下去不比咖啡少。

所以判断标准不是「我喝的是不是咖啡」，是「我几点喝」。中午之前，多半没事；下午三点之后，那一杯的账记在当天晚上。

还有一层：睡不够 → 早上靠它撑 → 晚上更睡不着 → 第二天更要靠它。这个圈一旦转起来，靠意志力是停不下来的，只能从「下午那杯」这一头剪断。

3.8 三周回一次家，作息怎么不乱

回家那两天最容易发生的事：熬到两三点，睡到中午。当时很爽。

代价不在那两天，在回学校之后的第三、四天——身体要重新调一遍，而那几天正好是状态最差的时候。

折中方案：允许自己晚一小时，别晚三小时。回家第一晚可以放开，第二晚往回拉。

越想「赶紧睡」越睡不着。这不是你不努力，是脑子本来就不听这个命令。

第 四 章

心：脑子停不下来

> 「别紧张」这三个字，是所有建议里最没用的一条。

考前十分钟，教室很安静，你听见自己的心跳。

你对自己说：别紧张。

然后更紧张了。

每个考场都发生过的事

4.1 为什么「别紧张」没用

紧张不是选择。手心出汗、心跳变快、想上厕所，这些在你「决定」之前就已经发生了——身体先动，脑子后到。

所以「别紧张」「放轻松」是无效指令：它们要求你直接关掉一个关不掉的东西。别人说没用，自己对自己说也没用。

能改的不是紧不紧张，是紧张之后你做什么。

4.2 盯着目标，反而更容易出错

注意力只有一份。放在「我要考好」上，就没法同时放在「这道题在问什么」上。

前一种盯的是结果，结果你控制不了；后一种盯的是过程，过程你能控制。

一个具体动作：读题的时候，用笔把题干里的关键词圈出来。把「这道题我会不会」换成「这道题在问什么」。

这不是心理暗示。它做的就是一件事——把注意力从不控的地方，挪到可控的地方。

4.3 考前十分钟

4-6 呼吸。吸气 4 秒，呼气 6 秒，做 10 轮。呼气比吸气长，心跳会跟着慢下来。

坐着就能做，不用闭眼，不用离开座位，旁边的人看不出来。

手抖的话：握拳 5 秒再松开，重复三次。

这三件事不会让你不紧张。它们的作用是让你在紧张的状态下，把题做完。这就够了。

4.4 想家、失联、三周不回家

封闭学校里最容易被忽略的消耗，不是学习强度，是没有出口。三周是一个很长的周期。

情绪的低点通常在第二周周末到第三周初。不是那时候出了什么事，是攒到了。

两件能做的。第一件：把「想回家」具体化。想的是家里的饭、自己的床，还是没人管你？说清楚之后，往往会发现需要的不是回家，是某一件很小的事——比如一顿有汤的饭。

第二件：给下次回家定一个确定的日期，记下来。不确定的等待最耗人。

这不是「调节心态」，是把一团模糊的难受，拆成一个能处理的东西。

4.5 什么时候该找人说话

「心情不好就该看医生」这种说法等于没说。界线要具体，下面几条，中一条就值得开口：

1. **连续两周以上提不起劲**
   几乎每天都这样，而且已经影响到吃饭或者睡觉。

2. **以前喜欢的事，现在完全没兴趣**
   不是「没时间做」，是「做了也没感觉」。

3. **看不进去书，但成绩没有明显变化**
   注意力涣散持续两周以上，靠意志硬撑也回不来。

4. **出现「活着没什么意思」这类念头**
   这一条不用等：直接找一个大人说，班主任、校医、家里任何人都行。

说的时候不用说得完整。「我最近不太对」这一句就够对方接下去。

学校有心理老师。那不是「有问题才去」的地方。

你不用一直很好。难受的时候找个人说一句就行，不用说得完整。

第 五 章

动：你每天都在跑

> 早晚各一次跑操。你的问题不是动得太少，是坐下来之后就不动了。

第三节课下课，你站起来去接水。

走了两步，小腿发紧，腰后面有点酸。

接完水回座位，坐下。下一节还有四十五分钟。

——一个课间

5.1 先算一笔账

跑操一天两次，一次两圈，一圈四百米，加起来是 1600 米。一周六天，接近一万米。

再加上每周一节的体育课。

所以「你该多运动」这句话对你是无效的——你不缺这个。你的运动量比大部分成年人都多，缺的东西在别处。

5.2 问题在剩下的 23 小时

真正影响你下午状态的，不是一天总共动了多少，是**一次连续坐多久**。

一节课四十五分钟，课间十分钟——很多人的课间也是坐着的，只是换了个姿势。上午四节连起来，就是三个多小时几乎没动。

身体对「长时间不动」的反应，和对「运动量不足」的反应，是两套完全不同的机制。你补了后者，前者还在。

同一个道理也适用于周末：平时五天几乎不动，周末打两小时球，补的是「总量」，补不了「间隔」。周一坐下，身体该僵还是僵。

「周末补运动」为什么补不回来

因为身体适应的是一天里活动怎么分布，不是一周的总账。连着坐五小时之后再猛动两小时，这两笔在身体里是分开记的。

更实际的问题是：周末那两小时之后，你多半会累到周一不想动，反而让接下来五天变得更静。

所以如果要加，加在每天，不加在周末。五分钟也算。

5.3 久坐具体伤了什么

消化。腹部一直压着，肠蠕动变慢。第一章里「三四天没排便」那一条，一半的原因是水，另一半是这个。

腰背。坐着的时候，腰椎承受的压力比站着更大，而且是持续压着，中间没有间歇。腰酸不是姿势一时不好，是压得太久。

注意力。连续坐过四十五分钟之后，后面那段时间的听课效率会掉一个台阶。你以为是自己走神，其实是身体在抗议。

这三条你都感受得到。只是很少有人把它们归到「坐太久」上。

5.4 课间三分钟

不用换衣服，不用出汗，不用去操场。三件事：

站起来。光是这一个动作，就已经打断了「连续坐」。

走到窗边，看最远的东西。六十秒。这一条同时还解决第六章的眼睛问题。

踮脚二十次，或者靠墙站一分钟。让小腿的肌肉收缩一下，血往上走，人就不那么昏。

教室在楼上的话，打水走楼梯，别等电梯。

5.5 体育课一周一节，怎么补

不指望你额外锻炼。只指望你把已经有的那点动作用对：跑操的最后半圈别走；体育课别整节坐着。

真想加一点：睡前五分钟，二十个深蹲加三十秒平板支撑。不占地方，不出汗，不用换衣服，宿舍里就能做。

跑不动就走两步，没关系。真正的问题是一整天都没站起来过。

第 六 章

眼与身体：坐 14 小时之后

> 教室里的灯是够亮的。不够的是你能控制的那部分。

早上六点，宿舍九个人排队洗漱。轮到你的时候，离集合还有四分钟。

你没洗头，把头发扎起来就往外跑。

晚上熄灯后摸黑换了内衣，扔进盆里，明天再说。

——九人间里的十五分钟

6.1 近视不只是「看不清」

度数涨得最快的那几年，正好是坐得最久、看近处最多的这几年。这不是巧合。

600 度以上算高度近视。它不只是镜片厚一点：视网膜脱落、青光眼、黄斑病变的风险都会跟着上去，而且这些不是「戴眼镜就能解决」的问题。

所以护眼的目标不是「不戴眼镜」——大概率做不到。是**别让它一直涨**。

6.2 20-20-20，和它管不到的地方

标准做法是：每 20 分钟，看 6 米外的东西 20 秒——这是美国眼科学会给的建议。

教室里做不到每 20 分钟一次。那就做能做的版本：每节课下课，抬头看窗外最远的东西——树、楼、天，六十秒。

关键是「远」和「离开近处」，不是「闭眼休息」。闭眼只让眼睛不工作，看远才让睫状肌松开。

但这里要分清两件事，不然容易白忙。**看远缓解的是视疲劳**——酸、干、胀，看完确实舒服，可它不改变度数。**和度数涨不涨有关的，是另外两样：每天在户外待多久，以及看近处的总时长。**

户外光照是目前证据最硬的一条，对还没近视的人效果最明显；已经近视了，它挡不住涨，但仍然是唯一被反复验证过的方向。这件事不花钱，也不用额外挤时间——课间别待在教室里，中午去操场走一圈，就够了一大半。

还有一件小事：已经近视的，每年验一次光。看不清黑板别硬撑——度数不够的时候人会眯眼、歪头、越凑越近，那才是度数往上走的路。

6.3 眼保健操不做了，替代是什么

眼保健操真正的作用不是「治近视」，是每天两次强制让眼睛离开书本、活动眼周。它有用，但它有用的部分，是那个「离开」。

所以替代方案的核心是同一件事。三个，都在座位上能做：

下课看远 60 秒。见上一条。

用力眨眼十次。眼睛干、涩、发胀的时候最有效。很多人眨眼只眨一半，睑板腺的油出不来，泪液蒸发得快。

手掌搓热，虚扣在眼睛上 30 秒。不揉、不压，就是遮光和一点温度。

6.4 九人间，早晨十五分钟

排队是固定的，能改的只有顺序。

头天晚上把东西摆好：牙杯、毛巾、今天要穿的衣服，按用的顺序叠在一起。这一步能省出五分钟，而五分钟在这个场景里就是全部。

洗漱只做必须的三件：牙、脸、头发。头发油就扎起来，不用天天洗。

洗头放到晚上。既然想洗每天都能洗，晚上时间宽得多。

6.5 经期：疼到什么程度算正常

疼是正常的，但「正常」有边界。

常见的：第一天小腹坠痛、腰酸、没力气，一两天缓解。这是前列腺素引起的子宫收缩，不是你体质差。

能做的：热水袋或者暖贴（学校有热水）；少碰冰的；疼得厉害的那半天，跑操可以请假——这不是娇气，是身体确实在收缩。

该去查的：

- 疼到必须请假，吃止痛药也不管用
- 一次比一次疼（可能是子宫内膜异位，这个病在青少年里被漏诊得很多）
- 周期完全乱：两三个月不来，或者一来十几天
- 量突然特别大

关于止痛药：布洛芬这一类，**在疼起来之前吃**比疼到受不了再吃有效。胃不好的饭后吃，别空腹。

红糖姜水能让人舒服一点——热的东西本来就能缓解痉挛。但它不解决原因，别把它当成方案。

6.6 洗头、内衣、脚

洗头。一周两三次够了，油性发质可以天天。湿着睡确实不好，但不是因为「受凉」——头发潮着，枕巾和被窝跟着潮，人会在半夜反复醒。吹干，或者至少擦到不滴水再躺。

内衣。每天换，手洗，别和外衣一起洗。能晒就晒，阴干差一截。

脚。洗完把脚趾缝擦干。鞋两双轮着穿——一双连穿一周，里面能长什么，你不会想知道。

身体是你自己的，用坏了没地方换。

第 七 章

生病了，去哪儿

> 「药不管用」不是原因，是算完账之后，说给自己听的理由。

发烧到 38 度，你从抽屉里翻出上个月剩的感冒药，吃了两片。

同桌说：别去，那儿的药不管用。

你问她去过吗。她说没有，都这么说。

你想了想，也是。

几乎每个班都发生过的对话

7.1 不去，是一笔算过的账

先把这件事说破：「药不管用」通常不是先去了解、再下的判断。它是决定已经做完之后，补上的一句解释。

真实的账是这样的。去一趟的成本是确定的：跟老师请假、下楼、排队、把哪儿难受说清楚、可能落掉一节课，有的学校还要通知家里。而收益是不确定的：你也不知道去了能不能好。

确定的成本，换一个不确定的收益。任何人算这笔账，答案都是不去。这跟勇敢不勇敢没关系，是账算得没错。

那「听说不管用」是怎么变成共识的？有个细节值得看：**说这话的人，多半没去过**。

而这条消息在传的时候，天生是偏的。去了、好了的人，不会特意回来说一句「其实有用」；去了、没立刻好的人，一定会说。你听到的样本，从源头就是斜的。

当然有一半是真的：医务室能给的多是对症的常用药，重的它处理不了，只能往外转。这点没冤枉它。但「吃了第二天没好」不等于药没用——感冒本来就要一周。药管的是难受，不管好得快。

所以真正的问题不在「该不该去」，在这笔账里有一项被漏掉了：**拖**。多数小毛病会自己好，但有一些不会。而拖过某个点，代价会从「一节课」跳到「一周」。

还有一项被低估了：医务室真正值钱的地方不是给药，是判断你到底要不要出去。这件事它比你有经验。

于是问题可以换个问法：不是「值不值得去」，是「这一次，是不是那种会自己好的」。

7.2 值得跑一趟的情况

外伤：扭伤、划伤、烫伤。

发烧：38.5 以上，或者低烧持续两天。

急性腹泻、呕吐。

过敏：起疹子、痒、局部肿。

任何疼到影响上课的疼痛。

这几类有共同点：要么当场就能处理，要么处理不了也得赶紧往外转。都属于「去了不亏」——而且都是「不会自己好」的那种。

7.3 去了怎么说

三句话，按这个顺序说：

1. **什么时候开始的**
   「前天晚上」「今天早自习」。

2. **什么感觉**
   「是胀，不是疼」「一阵一阵的」「按下去更疼」。形容得越具体，越省时间。

3. **有没有变重**
   「昨天还好，今天开始吐」。这一句决定了对方紧不紧张。

如果你记过——什么时候开始的、吃了什么、疼了多久——直接拿出来。它比「我难受」有用得多。

7.4 抽屉里该有什么

既然多数时候是自己扛，那手上有什么就很重要。一份最基本的清单：

通用名	用来对付	注意
对乙酰氨基酚	发烧、头痛	很多复方感冒药里已经有它，别叠加着吃
布洛芬	痛经、头痛、牙痛	别空腹吃；胃不好的饭后吃
蒙脱石散	急性腹泻	和其他药隔开两小时，它会吸附别人
口服补液盐	腹泻、呕吐后补水	别用运动饮料代替，糖和盐的比例不对
氯雷他定	过敏起的疹子、痒	不太犯困，但别和含抗过敏成分的感冒药叠着吃
碘伏棉签、创可贴	小伤口	伤口脏要先冲洗，再消毒
体温计	判断要不要报	电子的就够，别凭手感猜

剂量这里一个都不给。同一个药名，片剂和缓释胶囊的用法就不一样，年龄体重也影响用量——这种事只能看说明书或者问医生。这里能做的是告诉你「它大概是干什么的」，以及「什么时候别乱搭」。

另外：每年开学清一次抽屉，过期的扔掉。药过期不是「效果差点」，是有的会分解出不该有的东西。

7.5 红旗症状

比第一章那张更全，也更重。第一章那张管「该去医务室」，这张管「该往外转」。出现任何一条，不用再观察。

这九条，一条都不用过夜

- 大便发黑、像柏油，或者呕出血
- 肚子持续剧痛超过 6 小时，而且越来越重
- 发烧超过 39℃，或者发烧三天不退
- 明显脱水：口干、尿少、站起来发晕
- 呼吸困难、胸闷、心跳一直很快
- 意识模糊，叫不太应
- 剧烈头痛，伴呕吐或者脖子发硬
- 过敏时嘴唇、喉咙肿起来，喘不上气
- 伤口红肿热痛在扩散，或者有脓

这几条不代表一定很严重。但它们都过了「自己扛一扛」的界限，需要有人看一眼。

7.6 什么时候该请假

硬扛一节课，是意志问题。硬扛一天，是判断问题。

该请的情况：发烧、呕吐腹泻、疼到没法集中注意力、有传染性的（流感、诺如）。

最后一条值得多说一句：带病上课不是勤奋。它把一个班拖下水，也让你自己好得更慢——这一天的课没听进去，后面三天还得补。

能忍不算本事。忍到撑不住那天，落下的课更多。

高中生身体健康指北 · 写给高中生的身体使用说明

本册为健康科普，不构成诊疗建议或用药指导。所有药物请遵说明书或医嘱使用；持续不适应及时就医。

文中场景取自真实校园生活，已作匿名化处理，不指向任何具体个人或学校。

v0.10 · 2026-10-31