Eficiência de secagem

Armando P. Carvalho Filho e/ou Flávio A. Carvalho · Castro/PR · Rebanho 70105

Vacas agrupadas pelo mês da secagem · fev/26 a jul/26
Último controle: **16/10/2026**


Infectadas à secagem
36% 146 vacas
média mensal · variação 27–41%

Taxa de cura
72% 105 vacas
média mensal · variação 64–81%

Infectadas pós-parto
22% 54 vacas
das secas sadias · variação 10–31%

Novilhas infectadas
20% 48 de 244 novilhas
no 1º controle · variação 17–23%

Situação das vacas secas: da secagem ao 1º controle pós-parto (%)



Secagem	Vacas	Infect. %	Cura %	Infect. pós-parto %	Novilhas %
fev/26	79	41%	75%	23%	17%
mar/26	99	39%	64%	10%	20%
abr/26	95	27%	73%	20%	23%
mai/26	76	36%	81%	24%	17%
jun/26	58	38%	68%	31%	21%
jul/26*	16	6%	100%	33%	29%
Média¹	**81,4**	**36%**	**72%**	**22%**	**20%**

Situação	À secagem	1º controle pós-parto
Sadia	< 200 mil	< 200 mil
Curada	≥ 200 mil	< 200 mil
Nova infecção	< 200 mil	≥ 200 mil
Crônica	≥ 200 mil	≥ 200 mil

CCS em céls/mL; limite de 200 mil. À secagem: média da CCS nos controles dos 60 dias antes da data de secagem. Pós-parto: 1º controle após o parto. Só secagens com período seco de 20 a 120 dias (423 vacas). Taxa de cura = curadas ÷ infectadas à secagem; infectadas pós-parto = novas infecções ÷ secas sadias. Novilhas = 1ª lactação (idade ao parto até 30 meses), % com CCS ≥ 200 no 1º controle, agrupadas pelo mês do parto. Novilhas que pariram depois: ago/26 25% (n=40), set/26 23% (n=43), out/26 41% (n=17). *jul/26 parcial (planilha de secagem até 15/07; só vacas que já pariram e tiveram controle até 16/10/2026); ¹ médias e variações sem os meses parciais. Fora da análise: 745 secagens antes de fev/26 (sem controle nos 60 dias antes), 120 com período seco fora de 20–120 dias, 27 sem controle antes e 15 ainda sem controle pós-parto. Fontes: aba SECAGEM do registro da fazenda (MASTITE_2026.xlsx) e APCBRH – Relatório 2.2 (controles de 02/02 a 16/10/2026).