Qualidade do leite: dinâmica da CCS no rebanho

Armando P. Carvalho Filho e/ou Flávio A. Carvalho · Castro/PR · Rebanho 70105 (REB 47238 até jun/2026)

Controles de fev/2026 a out/2026
Último controle: **16/10/2026**


Sadias
63,5% 922 vacas
17/02: 65,2%

Novas infecções
9,0% 131 vacas
17/02: 8,6%

Crônicas
17,2% 250 vacas
17/02: 19,4%

Recuperadas
10,3% 149 vacas
17/02: 6,9%

Distribuição das vacas por situação (% das vacas na base)



Controle	Vacas	Sadia %	Nova %	Crôn. %	Recup. %
17/02/26	1.341	65,2	8,6	19,4	6,9
11/03/26	1.318	67,3	6,3	17,1	9,3
17/04/26	1.260	66,8	10,5	15,2	7,5
19/05/26	1.340	66,4	9,7	17,1	6,8
18/06/26	1.363	67,4	8,7	16,2	7,7
17/07/26	1.410	65,7	11,5	15,7	7,1
14/08/26	1.462	63,3	10,9	17,6	8,3
18/09/26	1.438	61,8	11,7	18,2	8,3
16/10/26	**1.452**	**63,5**	**9,0**	**17,2**	**10,3**

Situação	Controle anterior	Controle atual
Sadia	< 200 mil	< 200 mil
Nova infecção	< 200 mil	≥ 200 mil
Crônica	≥ 200 mil	≥ 200 mil
Recuperada	≥ 200 mil	< 200 mil

CCS em céls/mL; limite de 200 mil. Classificação comparando cada controle com o anterior da mesma vaca, na mesma lactação; entram só as vacas com CCS nos dois controles seguidos. Ficam fora da base as recém-paridas e as vacas sem registro anterior (em 16/10/2026: 59 pós-parto com CCS baixa, 16 pós-parto com CCS elevada e 64 sem histórico). O primeiro intervalo (02/02 → 17/02) tem 15 dias; os demais, 22 a 37 dias. Fonte: APCBRH – Relatório 2.2, 10 controles de 02/02 a 16/10/2026.