

[I] Tích phân hàm đơn giản

Definition 1. (Hàm đơn giản)

Cho một không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Một hàm φ được gọi là hàm đơn giản nếu thỏa các điều kiện sau:

(i) Miền xác định $\mathfrak{D}(\varphi) \in \mathfrak{A}$,

(ii) φ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên $\mathfrak{D}(\varphi)$,

(iii) φ chỉ nhận hữu hạn giá trị thực, tức là $\mathfrak{R}(\varphi)$ là một tập con hữu hạn của $\mathbb{R}$.

(Lưu ý rằng có thể $\mu(\mathfrak{D}(\varphi)) = \infty$, nhưng các giá trị ∞ và $-\infty$ không được phép là giá trị của một hàm đơn giản φ .)

Definition 2. (Biểu diễn chuẩn tắc)

Cho φ là một hàm đơn giản trên tập $D \in \mathcal{A}$ trong không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Gọi $\{a_i : i = 1, \dots, n\}$ là tập các giá trị khác nhau mà φ nhận trên D và đặt

$D_i = \{x \in D : \varphi(x) = a_i\}$ với $i = 1, \dots, n$.

Khi đó $\{D_i : i = 1, \dots, n\}$ là một họ rời nhau trong $\mathcal{A}$ và $\bigcup_{i=1}^n D_i = D$.

Biểu thức $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}(x)$ với $x \in D$ được gọi là biểu diễn chuẩn tắc của φ .

Lưu ý rằng nếu $D_i \in \mathfrak{A}$ và $a_i \in \mathbb{R}$ với $i = 1, \dots, n$, và nếu ta đặt $D = \bigcup_{i=1}^n D_i$ rồi định nghĩa $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ trên D , thì φ là một hàm đơn giản trên D .

Tuy nhiên, $\sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ có thể không phải là biểu diễn chuẩn tắc của φ , bởi vì $\{D_i : i = 1, \dots, n\}$ có thể không phải là một họ rời nhau và $\{a_i : i = 1, \dots, n\}$ có thể không phải là tập các số thực phân biệt.

Definition 3. (Tích phân Lebesgue cho hàm đơn giản)

Cho $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ là biểu diễn chuẩn tắc của một hàm đơn giản trên tập $D \in \mathcal{A}$ trong không gian độ đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Tích phân Lebesgue của φ trên D theo μ được định nghĩa bởi

$$\int_D \varphi(x) \mu(dx) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(D_i),$$

với điều kiện tổng này tồn tại trong $\overline{\mathbb{R}}$.

Lưu ý: Ta thường xét $\int_D \varphi(x) \mu(dx)$ là một số thực khi nói φ là Lebesgue khả tích trên D theo μ . Ký hiệu: $\int_D \varphi d\mu$.

Theorem 1. (Tính chất cơ bản trên miền D)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $\varphi \geq 0$ là một hàm đơn giản xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$ có biểu diễn chuẩn tắc $\varphi = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{D_i}$. Khi đó ta có các tính chất sau:

1. Tính đơn điệu

Nếu $E \subset D$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì:

$$\int_E \varphi d\mu \leq \int_D \varphi d\mu$$

2. Tính cộng tính hữu hạn

Cho $D = \bigcup_{j=1}^n E_j$ là hợp của các tập hợp $E_j \in \mathcal{A}$ rời nhau đôi một. Khi đó:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

Proof.

1. Khi xét trên tập $E \subset D$, ta thu hẹp hàm φ trên E :

$$\varphi|_E = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{D_i \cap E}$$

Hàm số này được định nghĩa trên tập nền $E = \bigcup_{i=1}^m (D_i \cap E)$ (trong đó các tập $D_i \cap E$ rời nhau đôi một).

Theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản trên tập E :

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E)$$

Vì $E \subset D$ nên $(D_i \cap E) \subset D_i$. Áp dụng tính đơn điệu của độ đo μ , ta có $\mu(D_i \cap E) \leq \mu(D_i)$. Dẫn tới:

$$\int_E \varphi d\mu \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i) = \int_D \varphi d\mu$$

2. Ta phân hoạch mỗi tập D_i theo các tập E_j :

$$D_i = D_i \cap D = D_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^n E_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (D_i \cap E_j)$$

Do các tập E_j rời nhau, nên các tập con $(D_i \cap E_j)$ cũng rời nhau đối với mọi $j \in \{1, \dots, n\}$. Áp dụng tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ :

$$\mu(D_i) = \sum_{j=1}^n \mu(D_i \cap E_j)$$

Thay vào định nghĩa tích phân ban đầu trên tập D :

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(\sum_{j=1}^n \mu(D_i \cap E_j) \right)$$

Vì đây là các tổng hữu hạn, ta có thể tự do đổi thứ tự lấy tổng:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) \right)$$

Nhận xét rằng phần tổng bên trong dấu ngoặc tròn chính là định nghĩa tích phân của hàm đơn giản φ trên tập con E_j :

$$\int_{E_j} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j)$$

Từ đó suy ra:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

■

Proposition 1. (Bổ đề 7.7 - Tính chất cơ bản của tích phân hàm đơn giản)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và các hàm đơn giản $\varphi, \varphi_1, \varphi_2$ xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Ta có các tính chất sau:

1. *Bằng nhau hầu khắp nơi (a.e.):* Nếu $\varphi_1 = \varphi_2$ a.e. trên D thì $\int_D \varphi_1 d\mu = \int_D \varphi_2 d\mu$.
2. *Tính đơn điệu:* Nếu $\varphi_1 \leq \varphi_2$ trên D thì $\int_D \varphi_1 d\mu \leq \int_D \varphi_2 d\mu$.
3. *Tính bị chặn:* Nếu $\varphi \in [M_1, M_2]$ trên D thì $M_1\mu(D) \leq \int_D \varphi d\mu \leq M_2\mu(D)$.
4. *Tính thuần nhất:* Nếu φ khả tích và c là hằng số thì $c\varphi$ cũng khả tích và $\int_D c\varphi d\mu = c \int_D \varphi d\mu$.
5. *Tính tuyến tính (Cộng tính):* Nếu φ_1, φ_2 khả tích trên D thì $\varphi_1 + \varphi_2$ khả tích trên D và:

$$\int_D (\varphi_1 + \varphi_2) d\mu = \int_D \varphi_1 d\mu + \int_D \varphi_2 d\mu$$

Proof.

1. *Bằng nhau hầu khắp nơi:*

Gọi $N \subset D$ là tập hợp có số đo không ($\mu(N) = 0$) sao cho $\varphi_1 = \varphi_2$ trên tập $D \setminus N$.

Áp dụng tính cộng tính theo tập hợp, ta phân tích tích phân trên D :

$$\int_D \varphi_1 d\mu = \int_{D \setminus N} \varphi_1 d\mu + \int_N \varphi_1 d\mu$$

Vì $\mu(N) = 0$ nên theo định nghĩa, tích phân của bất kỳ hàm đơn giản nào trên N cũng bằng 0. Trên miền $D \setminus N$, do $\varphi_1 = \varphi_2$ nên:

$$\int_{D \setminus N} \varphi_1 d\mu + 0 = \int_{D \setminus N} \varphi_2 d\mu + \int_N \varphi_2 d\mu = \int_D \varphi_2 d\mu$$

2. *Tính đơn điệu:*

Giả sử φ_1 và φ_2 có biểu diễn chuẩn tắc là $\varphi_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{D_i}$ và $\varphi_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j \chi_{E_j}$.

Xét họ các tập hợp giao nhau $D_i \cap E_j$. Trên mỗi tập $D_i \cap E_j$, hàm φ_1 có giá trị α_i và φ_2 có giá trị β_j .

Vì $\varphi_1 \leq \varphi_2$ trên D , ta suy ra $\alpha_i \leq \beta_j$ với mọi cặp (i, j) sao cho $D_i \cap E_j \neq \emptyset$.

Do đó:

$$\int_D \varphi_1 d\mu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(D_i \cap E_j) = \int_D \varphi_2 d\mu$$

3. *Tính bị chặn:*

Xét các hàm đơn giản hằng số $\psi_1 = M_1 \chi_D$ và $\psi_2 = M_2 \chi_D$. Theo định nghĩa, ta có $\int_D \psi_1 d\mu = M_1 \mu(D)$ và $\int_D \psi_2 d\mu = M_2 \mu(D)$.

Vì $M_1 \leq \varphi \leq M_2$ trên toàn bộ D , tức là $\psi_1 \leq \varphi \leq \psi_2$. Áp dụng tính đơn điệu (đã chứng minh ở ý

2), ta thu được:

$$\int_D \psi_1 d\mu \leq \int_D \varphi d\mu \leq \int_D \psi_2 d\mu \implies M_1\mu(D) \leq \int_D \varphi d\mu \leq M_2\mu(D)$$

4. Tính thuần nhất:

Giả sử $\varphi = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{D_i}$. Khi nhân với hằng số c , hàm $c\varphi$ sẽ có biểu diễn là $c\varphi = \sum_{i=1}^n (c\alpha_i) \chi_{D_i}$.

Theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản:

$$\int_D c\varphi d\mu = \sum_{i=1}^n (c\alpha_i) \mu(D_i) = c \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(D_i) = c \int_D \varphi d\mu$$

5. Tính tuyến tính (Cộng tính):

Sử dụng lại phân hoạch chung $D_i \cap E_j$ như ở ý 2. Các tập $D_i \cap E_j$ rời nhau đôi một và có hợp bằng D .

Trên mỗi tập $D_i \cap E_j$, hàm tổng $\varphi_1 + \varphi_2$ có giá trị không đổi là $\alpha_i + \beta_j$.

Áp dụng định nghĩa tích phân cho hàm $\varphi_1 + \varphi_2$:

$$\int_D (\varphi_1 + \varphi_2) d\mu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha_i + \beta_j) \mu(D_i \cap E_j)$$

Tách tổng này ra làm hai phần:

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(D_i \cap E_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^m \mu(D_i \cap E_j) \right) + \sum_{j=1}^m \beta_j \left(\sum_{i=1}^n \mu(D_i \cap E_j) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(D_i) + \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(E_j) = \int_D \varphi_1 d\mu + \int_D \varphi_2 d\mu \end{aligned}$$

■

[I] Tích phân hàm không âm

Definition 4. (Tích phân Lebesgue cho hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Giả sử f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ (tức là $f: D \rightarrow [0, \infty]$).

Tích phân Lebesgue của f trên D theo μ được định nghĩa bằng cận trên đúng (supremum):

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu \in [0, \infty]$$

trong đó supremum được lấy trên tập hợp tất cả các hàm đơn giản không âm φ xác định trên D thỏa mãn điều kiện: $0 \leq \varphi \leq f$.

Lưu ý thuật ngữ:

- Vì $f \geq 0$, supremum này luôn tồn tại và nhận giá trị trong đoạn $[0, \infty]$. Ta nói f là bán khả tích Lebesgue (semi-integrable) trên D .

- Ta nói f là khả tích Lebesgue (integrable) trên D khi và chỉ khi tích phân của nó là một số thực hữu hạn, tức là: $\int_D f d\mu < \infty$

Remark 1. Rem

Hàm thực không âm có các tính chất khác so với hàm đơn giản ở chỗ nó có thể nhận giá trị vô cùng ($+\infty$):

1. Ta quy ước $0 \cdot \infty = 0$, nên một hàm có thể nhận giá trị vô cùng ở một tập có độ đo không, thì nó vẫn mang giá trị không (Tính chất bằng không a.e và các hệ quả).
2. Các hàm đơn giản theo định nghĩa phải có giá trị nhỏ hơn vô cùng, ta mất đi khả năng xấp xỉ hàm f từ bên trên bằng hàm đơn giản.

Proposition 2. (Bổ đề 8.2 - Tính a.e của tích phân hàm đo được không âm)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Giả sử f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ (tức là $f : D \rightarrow [0, \infty]$). Khi đó:

- (a) Nếu $\int_D f d\mu < \infty$, thì $f < \infty$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .
- (b) Nếu $\int_D f d\mu = 0$, thì $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .
- (d) Nếu $f > 0$ a.e. trên D và $\int_D f d\mu = 0$, thì $\mu(D) = 0$.
- (f) Nếu $f_1 = f_2$ a.e. trên D , thì $\int_D f_1 d\mu = \int_D f_2 d\mu$.

Proof.

(a):

Giả sử phản chứng rằng mệnh đề $f < \infty$ không đúng hầu khắp nơi trên D .

Khi đó, tập hợp các điểm mà f nhận giá trị vô cùng có số đo dương.

Đặt $E = \{x \in D : f(x) = \infty\}$. Theo giả thiết phản chứng, $\mu(E) > 0$.

Với mọi số nguyên dương $n \in \mathbb{N}^*$, ta xây dựng một hàm đơn giản φ_n trên D như sau:

$$\varphi_n = n\chi_E + 0\chi_{D \setminus E} = n\chi_E$$

Vì trên tập E , $f(x) = \infty > n$ và trên tập $D \setminus E$, $f(x) \geq 0$, ta luôn có $\varphi_n \leq f$ trên toàn bộ D .

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân Lebesgue, ta có:

$$\int_D f d\mu \geq \int_D \varphi_n d\mu = n\mu(E)$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Cho $n \rightarrow \infty$, vì $\mu(E) > 0$ là một hằng số dương, ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\mu(E) = \infty \implies \int_D f d\mu = \infty$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết ban đầu là $\int_D f d\mu < \infty$.

Vậy giả sử phản chứng sai, tức là $\mu(\{f = \infty\}) = 0$, hay $f < \infty$ a.e. trên D .

(b):

Giả sử phản chứng rằng mệnh đề $f = 0$ không đúng hầu khắp nơi trên D . Do $f \geq 0$, điều này tương đương với việc tập hợp các điểm mà $f > 0$ có độ đo dương.

Đặt $E = \{x \in D : f(x) > 0\}$. Theo giả thiết phản chứng, $\mu(E) > 0$.

Ta có thể biểu diễn tập E dưới dạng hợp của một dãy các tập hợp tăng dần:

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in D : f(x) > \frac{1}{n} \right\}$$

Đặt $E_n = \{x \in D : f(x) > \frac{1}{n}\}$. Ta thấy $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset \dots$ và $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = E$.

Theo tính chất σ -dưới cộng tính (hoặc tính liên tục từ dưới) của độ đo, ta có:

$$\mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

Vì $\mu(E) > 0$, không thể xảy ra trường hợp $\mu(E_n) = 0$ với mọi n . Do đó, phải tồn tại ít nhất một chỉ số $N_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\mu(E_{N_0}) > 0$.

Xây dựng một hàm đơn giản φ trên D ứng với tập E_{N_0} :

$$\varphi = \frac{1}{N_0} \chi_{E_{N_0}} + 0 \chi_{D \setminus E_{N_0}} = \frac{1}{N_0} \chi_{E_{N_0}}$$

Theo định nghĩa của E_{N_0} , với mọi $x \in E_{N_0}$ ta có $f(x) > \frac{1}{N_0}$. Do đó, $\varphi \leq f$ trên toàn bộ D .

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân Lebesgue, ta thu được:

$$\int_D f d\mu \geq \int_D \varphi d\mu = \frac{1}{N_0} \mu(E_{N_0}) > 0$$

Tức là $\int_D f d\mu > 0$, điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết $\int_D f d\mu = 0$.

Vậy giả sử phản chứng sai, suy ra $\mu(\{f > 0\}) = 0$, hay $f = 0$ a.e. trên D .

(d):

Theo định nghĩa, điều này có nghĩa là tập hợp các điểm mà $f(x) \neq 0$ có số đo bằng 0. Vì $f \geq 0$, ta có:

$$\mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) = 0 \quad (1)$$

Mặt khác, giả thiết cũng cho $f > 0$ hầu khắp nơi trên D . Điều này có nghĩa là tập hợp các điểm mà mệnh đề này sai có độ đo bằng 0:

$$\mu(\{x \in D : f(x) \leq 0\}) = 0 \quad (2)$$

Chú ý rằng toàn bộ không gian nền D có thể được phân hoạch thành hai tập hợp rời nhau dựa trên giá trị của f :

$$D = \{x \in D : f(x) > 0\} \cup \{x \in D : f(x) \leq 0\}$$

Áp dụng tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ trên các tập rời nhau, kết hợp với (1) và (2), ta có:

$$\mu(D) = \mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) + \mu(\{x \in D : f(x) \leq 0\}) = 0 + 0 = 0$$

Vậy $\mu(D) = 0$.

(f):

Gọi N là tập hợp các điểm trên D mà f_1 và f_2 khác nhau:

$$N = \{x \in D : f_1(x) \neq f_2(x)\}$$

Vì $f_1 = f_2$ a.e. trên D , theo định nghĩa ta có $\mu(N) = 0$.

Ta phân hoạch tập D thành hai phần rời nhau: $D = (D \setminus N) \cup N$. Khi đó, tích phân trên D có thể được tách ra theo miền (tính cộng tính theo tập hợp):

$$\int_D f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_1 d\mu + \int_N f_1 d\mu$$

Nhận xét rằng đối với bất kỳ hàm đo được không âm g nào, tích phân của nó trên một tập có số đo không (null set) luôn bằng 0. (Vì bất kỳ hàm đơn giản $\varphi \leq g$ nào cũng sẽ có tích phân trên N bằng 0 do $\mu(N) = 0$). Do đó:

$$\int_N f_1 d\mu = 0 \quad \text{và} \quad \int_N f_2 d\mu = 0$$

Xét trên tập $D \setminus N$, theo định nghĩa của N , ta có $f_1(x) = f_2(x)$ tại mọi điểm $x \in D \setminus N$. Do đó, tích phân của chúng trên miền này hoàn toàn bằng nhau:

$$\int_{D \setminus N} f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu$$

Ráp các kết quả lại với nhau, ta có:

$$\int_D f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_1 d\mu + \int_N f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu + 0 = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu + \int_N f_2 d\mu = \int_D f_2 d\mu$$

Vậy $\int_D f_1 d\mu = \int_D f_2 d\mu$. ■

Proposition 3. (Tính chất cơ bản của tích phân hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và các hàm đo được không âm f, f_1, f_2 xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Ta có các tính chất sau:

1. *Tính đơn điệu theo hàm số:* Nếu $f_1 \leq f_2$ trên D thì:

$$\int_D f_1 d\mu \leq \int_D f_2 d\mu$$

2. *Tính đơn điệu theo tập hợp:* Nếu $E \subset D$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì:

$$\int_E f d\mu \leq \int_D f d\mu$$

3. *Tính cộng tính hữu hạn trên miền D :* Cho $D = \bigcup_{j=1}^n E_j$ là hợp của các tập hợp $E_j \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một. Khi đó:

$$\int_D f d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$$

4. *Tính bị chặn:* Nếu $f \in [M_1, M_2]$ trên D thì:

$$M_1 \mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M_2 \mu(D)$$

5. *Tính thuần nhất:* Nếu $c > 0$ là một hằng số thực, ta có:

$$\int_D c f d\mu = c \int_D f d\mu$$

(Quy ước: Nếu $c = 0$, thì $c f = 0$ trên D , kéo theo $\int_D c f d\mu = 0$ ngay cả khi $\int_D f d\mu = \infty$).

Proof.

Nhắc lại định nghĩa: Tích phân của hàm đo được không âm f là cận trên đúng của tích phân các hàm đơn giản φ bị chặn trên bởi f . Đặt $S(f, D) = \{\varphi \text{ đơn giản} : 0 \leq \varphi \leq f \text{ trên } D\}$. Khi đó $\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \in S(f, D)} \int_D \varphi d\mu$.

1. Tính đơn điệu theo hàm số:

Giả sử $0 \leq f_1 \leq f_2$ trên D . Lấy bất kỳ hàm đơn giản $\varphi \in S(f_1, D)$, ta có $0 \leq \varphi \leq f_1 \leq f_2$.

Do đó φ cũng thuộc $S(f_2, D)$, tức là $S(f_1, D) \subset S(f_2, D)$.

Lấy supremum hai vế, ta thu được:

$$\sup_{\varphi \in S(f_1, D)} \int_D \varphi d\mu \leq \sup_{\psi \in S(f_2, D)} \int_D \psi d\mu \implies \int_D f_1 d\mu \leq \int_D f_2 d\mu$$

2. Tính đơn điệu theo tập hợp:

Ta có thể viết tích phân trên tập con E bằng cách sử dụng hàm chỉ thị: $\int_E f d\mu = \int_D (f \cdot \chi_E) d\mu$.

Vì $\chi_E \leq 1$ trên D , ta có $f \cdot \chi_E \leq f$ trên D . Áp dụng tính đơn điệu theo hàm số (ý 1) cho hai hàm $f \cdot \chi_E$ và f , ta có:

$$\int_E f d\mu = \int_D (f \cdot \chi_E) d\mu \leq \int_D f d\mu$$

3. Tính cộng tính hữu hạn trên miền D :

Lấy bất kỳ $\varphi \in S(f, D)$. Theo tính cộng tính hữu hạn của tích phân hàm đơn giản (đã chứng minh), ta có:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

Vì $\varphi \leq f$ trên mỗi E_j , nên $\int_{E_j} \varphi d\mu \leq \int_{E_j} f d\mu$. Do đó $\int_D \varphi d\mu \leq \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$.

Lấy supremum theo φ , ta được vế thứ nhất: $\int_D f d\mu \leq \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$.

Ngược lại, trên mỗi tập E_j , chọn một hàm đơn giản tùy ý $\varphi_j \in S(f, E_j)$. Đặt $\varphi = \sum_{j=1}^n \varphi_j \chi_{E_j}$. Rõ ràng φ là hàm đơn giản và $0 \leq \varphi \leq f$ trên D . Khi đó:

$$\sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi_j d\mu = \int_D \varphi d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Lấy supremum độc lập đối với từng φ_j trên mỗi E_j , ta được vế thứ hai: $\sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu \leq \int_D f d\mu$.

Kết hợp hai chiều bất đẳng thức, ta có dấu bằng xảy ra.

4. Tính bị chặn:

Xét hai hàm hằng số $g_1(x) = M_1$ và $g_2(x) = M_2$ trên D . Đây là các hàm đơn giản với $\int_D g_1 d\mu = M_1 \mu(D)$ và $\int_D g_2 d\mu = M_2 \mu(D)$.

Vì $g_1 \leq f \leq g_2$ a.e. trên D , áp dụng tính đơn điệu theo hàm số (ý 1), ta có:

$$\int_D g_1 d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \int_D g_2 d\mu \implies M_1 \mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M_2 \mu(D)$$

5. Tính thuần nhất:

Với $c > 0$, bất đẳng thức $\psi \leq c f$ (với ψ đơn giản) tương đương với $\frac{1}{c} \psi \leq f$.

Đặt $\varphi = \frac{1}{c} \psi$, φ cũng là một hàm đơn giản và $0 \leq \varphi \leq f$.

Theo tính thuần nhất của tích phân hàm đơn giản: $\int_D \psi d\mu = c \int_D \varphi d\mu$.

Do đó:

$$\int_D c f d\mu = \sup_{\psi \leq cf} \int_D \psi d\mu = \sup_{\varphi \leq f} \left(c \int_D \varphi d\mu \right) = c \cdot \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu = c \int_D f d\mu$$

■

Observation 1. Obs

Trong tích chất cơ bản tích phân hàm không âm, ta không thấy sự xuất hiện của Tính cộng tính đối với hàm số:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

6. Dựa vào định nghĩa supremum:

Tích phân của hàm không âm được định nghĩa là:

$$\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu$$

- Chiều $\leq$ dễ: Nếu lấy hai hàm đơn giản bất kỳ $\varphi_1 \leq f_1$ và $\varphi_2 \leq f_2$, thì tổng của chúng là một hàm đơn giản thỏa mãn $\varphi_1 + \varphi_2 \leq f_1 + f_2$. Sử dụng tích chất sup:

$$\int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu \leq \int_D (f_1 + f_2) d\mu.$$
- Chiều $\geq$ khó: Để chứng minh chiều ngược lại, ta phải lấy một hàm đơn giản φ bất kỳ sao cho $\varphi \leq f_1 + f_2$. Khó khăn nằm ở chỗ: Ta không có cách đơn giản tách $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ sao cho $\varphi_1 \leq f_1$ và $\varphi_2 \leq f_2$ (với điều kiện φ_1, φ_2 đều phải là hàm đơn giản).

2. Tại sao ta cần MCT (Monotone Convergence Theorem):

- Thay vì sử dụng supremum đơn thuần, ta sẽ chứng minh rằng luôn có thể xấp xỉ f_1 và f_2 bằng hai dãy hàm đơn giản tăng dần: $\varphi_n \nearrow f_1$ và $\psi_n \nearrow f_2$.
- Khi đó, dãy tổng $(\varphi_n + \psi_n)$ cũng là dãy hàm đơn giản tăng dần và hội tụ về $f_1 + f_2$.
- Vì tính cộng tính đã được chứng minh là đúng cho hàm đơn giản, ta có phương trình:

$$\int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu = \int_D \varphi_n d\mu + \int_D \psi_n d\mu$$

- Nhờ MCT cho phép ta đẩy giới hạn (lim) vào bên trong dấu tích phân, khi lấy $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế, ta thu được:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$