

## 1. Hàm không âm

### Theorem 1. (Định lý Hội tụ đơn điệu: Monotone Convergence Theorem - MCT)

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là một không gian độ đo và  $D \in \mathfrak{A}$ . Giả sử  $(f_n)_{n=1}^{\infty}$  là một dãy các hàm đo được không âm trên  $D$  thỏa mãn:

1. Dãy không giảm:  $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq \dots$  hầu khắp nơi trên  $D$ .
2. Hội tụ điểm:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  hầu khắp nơi trên  $D$ .

Khi đó, hàm giới hạn  $f$  cũng là một hàm đo được không âm trên  $D$  và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_D f d\mu$$

### Proof.

Để đơn giản hóa trình bày, ta có thể giả sử các tính chất không giảm và hội tụ đúng tại mọi điểm  $x \in D$  (nếu chỉ đúng hầu khắp nơi, ta bỏ đi một tập có độ đo 0 mà không làm thay đổi giá trị tích phân).

Quá trình chứng minh được chia làm 2 chiều bất đẳng thức:

**Chiều 1: Chứng minh  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$**

Vì dãy  $(f_n)$  không giảm và tiến tới  $f$ , ta có  $f_n \leq f$  với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta thu được:

$$\int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (\forall n)$$

Dãy số thực  $(\int_D f_n d\mu)$  là một dãy không giảm và bị chặn trên bởi  $\int_D f d\mu$ , do đó nó có giới hạn và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \quad (1)$$

**Chiều 2: Chứng minh  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D f d\mu$**

Theo định nghĩa tích phân của hàm không âm,  $\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \in S} \int_D \varphi d\mu$ , với  $S = \{\varphi \text{ đơn giản} : 0 \leq \varphi \leq f\}$ .

Cố định một hàm đơn giản  $\varphi \in S$  và chọn một hằng số bất kỳ  $\alpha \in (0, 1)$ . Ta cần chứng minh  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$ .

Với mỗi  $n \in \mathbb{N}^*$ , định nghĩa tập hợp:

$$E_n = \{x \in D : f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)\}$$

Nhận xét các tính chất của dãy tập hợp  $(E_n)$ :

- Tính tăng: Vì  $f_{n+1} \geq f_n$ , nếu  $x \in E_n$  thì  $f_{n+1}(x) \geq f_n(x) \geq \alpha \varphi(x)$ , suy ra  $x \in E_{n+1}$ . Vậy  $E_1 \subset E_2 \subset \dots \subset E_n \subset \dots$
- Phủ toàn bộ  $D$  ( $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = D$ ): Lấy  $x \in D$  bất kỳ.  
+ Nếu  $f(x) = 0$ , do  $0 \leq \varphi \leq f$  nên  $\varphi(x) = 0$ . Khi đó  $\alpha \varphi(x) = 0 \leq f_n(x)$  với mọi  $n$ , tức là  $x \in E_n$  với mọi  $n$ .

+ Nếu  $f(x) > 0$ , vì  $\alpha \in (0, 1)$  nên  $\alpha\varphi(x) < \varphi(x) \leq f(x)$ . Do  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ , theo định nghĩa giới hạn, tồn tại một chỉ số  $n_0$  đủ lớn sao cho  $f_{n_0}(x) \geq \alpha\varphi(x)$ . Suy ra  $x \in E_{n_0}$ .

Vậy dãy tập  $(E_n)$  tăng dần và tiến tới  $D$  ( $E_n \uparrow D$ ).

Xét tích phân của  $f_n$  trên  $D$ :

$$\int_D f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq \int_{E_n} \alpha\varphi d\mu = \alpha \int_{E_n} \varphi d\mu$$

Hàm tập hợp  $\nu(A) = \int_A \varphi d\mu$  (với  $\varphi$  là hàm đơn giản) là một độ đo, do đó nó thỏa mãn tính liên tục từ dưới đối với dãy tập tăng  $E_n \uparrow D$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \int_D \varphi d\mu$$

Lấy giới hạn  $n \rightarrow \infty$  cho bất đẳng thức phía trên:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} \varphi d\mu = \alpha \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi  $\alpha \in (0, 1)$ . Cho  $\alpha \rightarrow 1^-$ , ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \int_D \varphi d\mu$$

Bất đẳng thức này lại đúng với mọi hàm đơn giản  $\varphi \leq f$ . Lấy cận trên đúng (supremum) theo  $\varphi \in S$  cho về phải, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \geq \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu = \int_D f d\mu \quad (2)$$

**Kết luận:**

Từ (1) và (2), ta kết luận được  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$ . ■

### Theorem 2. (Bổ đề 8.6: Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản)

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là một không gian độ đo và  $f$  là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên  $X$  (tức là  $f : X \rightarrow [0, \infty]$ ).

Khi đó, luôn tồn tại một dãy các hàm đơn giản không âm  $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$  trên  $X$  sao cho:

1.  $\varphi_n \uparrow f$  trên  $X$  (tức là  $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq f$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$  tại mọi  $x \in X$ ).
2.  $\varphi_n \rightarrow f$  hội tụ đều trên mọi tập con  $E \subset X$  mà tại đó  $f$  bị chặn.
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$  với mọi tập đo được  $D \in \mathfrak{A}$ .

**Proof.**

**Ý tưởng xây dựng (Construction):**

Cố định một số nguyên  $n \geq 1$ . Ta cắt trục tung (tập giá trị của  $f$ ) thành hai phần: phần bị chặn  $[0, n]$  và phần không bị chặn  $[n, \infty]$ .

- Chia đoạn  $[0, n]$  thành  $n \cdot 2^n$  khoảng nhỏ bằng nhau, mỗi khoảng có độ dài  $\frac{1}{2^n}$ .
- Đặt  $I_{n,k} = [\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})$  với  $k = 1, 2, \dots, n2^n$ .

Tương ứng với các khoảng trên trục tung, ta lấy nghịch ảnh để tạo ra các tập hợp (các bậc thang) trên miền  $X$ :

- $E_{n,k} = f^{-1}(I_{n,k}) = \{x \in X : \frac{k-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{k}{2^n}\}$
- $F_n = f^{-1}([n, \infty)) = \{x \in X : f(x) \geq n\}$

Ta định nghĩa hàm đơn giản  $\varphi_n$  bằng cách lấy giá trị cận dưới của mỗi khoảng:

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \chi_{E_{n,k}}(x) + n \chi_{F_n}(x)$$

#### Chứng minh Tính đơn điệu và hội tụ điểm:

- Đánh giá  $\varphi_n \leq f$ :  
Điều này hiển nhiên từ cách dựng. Nếu  $x \in E_{n,k}$  thì  $\varphi_n(x) = \frac{k-1}{2^n} \leq f(x)$ . Nếu  $x \in F_n$  thì  $\varphi_n(x) = n \leq f(x)$ .
- Đánh giá  $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ :  
Khi chuyển từ bước  $n$  sang  $n+1$ , mỗi khoảng  $I_{n,k}$  được chia làm hai nửa bằng nhau, và mức trần được nâng từ  $n$  lên  $n+1$ . Việc "chia mịn" này khiến cho giá trị chốt dưới của các khoảng chứa  $f(x)$  chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng lên, do đó  $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$  với mọi  $x$ .
- Đánh giá  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ :  
+ Trường hợp  $f(x) = \infty$ : Khi đó  $x \in F_n$  với mọi  $n$ , suy ra  $\varphi_n(x) = n$ . Lấy giới hạn ta có  $\lim \varphi_n(x) = \infty = f(x)$ .  
+ Trường hợp  $f(x) < \infty$ : Khi  $n$  đủ lớn sao cho  $n > f(x)$ , điểm  $x$  sẽ lọt vào một trong các tập  $E_{n,k}$ . Khi đó  $f(x)$  và  $\varphi_n(x)$  nằm trong cùng một khoảng có độ dài  $\frac{1}{2^n}$ . Do đó:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n}$$

Cho  $n \rightarrow \infty$ , khoảng cách này tiến về 0, suy ra  $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ .

#### Chứng minh Hội tụ đều trên tập bị chặn:

Giả sử  $f$  bị chặn trên tập  $E$ , tức là tồn tại số thực  $M > 0$  sao cho  $f(x) < M$  với mọi  $x \in E$ .

Chọn một số nguyên  $N > M$ . Với mọi  $n \geq N$  và mọi  $x \in E$ , ta luôn có  $f(x) < M < n$ .

Do đó, đồ thị của  $f$  trên tập  $E$  hoàn toàn nằm trong phần đã được "chia mịn" (không chạm tới mức trần  $n$ ). Theo lập luận ở trên, ta có:

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < \frac{1}{2^n} \quad (\forall x \in E, \forall n \geq N)$$

Vì đại lượng  $\frac{1}{2^n}$  hoàn toàn không phụ thuộc vào  $x$ , sự hội tụ này là hội tụ đều trên  $E$ .

#### Chứng minh tính Bảo toàn tích phân qua giới hạn:

Vì dãy  $(\varphi_n)$  là một dãy các hàm đo được không âm, tăng dần và hội tụ điểm về  $f$  ( $\varphi_n \uparrow f$ ).

Áp dụng trực tiếp Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT), ta suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

**Lemma 1. (Bổ đề: Tính cộng tính hữu hạn của hàm đo được không âm)**

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là không gian độ đo. Nếu  $f_1, f_2$  là các hàm đo được không âm trên  $D \in \mathfrak{A}$ , thì  $f_1 + f_2$  cũng là hàm đo được không âm và:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

**Proof.**

Theo Định lý xấp xỉ bằng hàm đơn giản (Lemma 8.6), tồn tại hai dãy hàm đơn giản không âm  $(\varphi_n)$  và  $(\psi_n)$  sao cho:

$$\varphi_n \uparrow f_1 \quad \text{và} \quad \psi_n \uparrow f_2 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Xét dãy hàm tổng  $(\varphi_n + \psi_n)$ . Rõ ràng đây cũng là một dãy các hàm đơn giản không âm, và theo tính chất giới hạn, ta có:

$$(\varphi_n + \psi_n) \uparrow (f_1 + f_2) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Vì tính cộng tính luôn đúng cho các hàm đơn giản (đã chứng minh ở bài trước), ta có phương trình đại số:

$$\int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu = \int_D \varphi_n d\mu + \int_D \psi_n d\mu$$

Lấy giới hạn  $n \rightarrow \infty$  cho cả hai vế. Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) cho cả ba dãy hàm tăng  $(\varphi_n + \psi_n)$ ,  $(\varphi_n)$  và  $(\psi_n)$ , ta được phép lấy giới hạn qua dấu tích phân:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \psi_n d\mu \\ \implies \int_D (f_1 + f_2) d\mu &= \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu \end{aligned}$$

(Lưu ý: Bằng quy nạp toán học, tính chất này đúng cho một tổng hữu hạn bất kỳ  $\sum_{k=1}^N f_k$ ).

■

**Theorem 3. (Biểu diễn tích phân qua hàm đơn giản)**

Cho  $f \geq 0$  là một hàm đo được trên  $D$ . Nhắc lại định nghĩa tích phân Lebesgue cho hàm đo được không âm:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu$$

trong đó  $s \in S(D)$  (lớp các hàm đơn giản đo được). Khi đó, ta có đẳng thức:

$$\int_D f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

(Xem thêm Định lý 8.24: Biểu diễn Layer Cake)

**Proof.**

Quá trình chứng minh được thực hiện qua 3 bước dựa trên định nghĩa cận trên đúng (sup) của tích phân Lebesgue, đi từ lớp hàm đơn giản lên hàm đo được tổng quát.

**Bước 1: Chứng minh đẳng thức đúng cho hàm đơn giản  $s \in S(D)$**

Giả sử hàm đơn giản không âm  $s(x)$  được biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$$

với thang giá trị được sắp thứ tự  $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$  và các tập tạo ảnh  $A_i = s^{-1}(\{c_i\})$  tương ứng là họ các tập hợp đo được, rời nhau đôi một và lập thành một phân hoạch của không gian  $D$ .

Xét hàm mức đuôi tương ứng  $h_s(t) = \mu(\{x \in D : s(x) \geq t\})$ . Với mỗi  $t \in (c_{i-1}, c_i]$ , điều kiện  $s(x) \geq t$  bắt buộc điểm  $x$  phải nhận các giá trị từ mức  $c_i$  trở lên, nghĩa là  $x \in \bigcup_{j=i}^n A_j$ . Do tính cộng tính hữu hạn của độ đo  $\mu$ , ta thu được:

$$h_s(t) = \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \quad \text{với mọi } t \in (c_{i-1}, c_i]$$

Mặt khác, với mọi mức  $t > c_n$ , tập mức  $\{s \geq t\}$  trở thành tập rỗng nên  $h_s(t) = 0$ .

Tích phân Lebesgue của hàm bậc thang  $h_s(t)$  trên  $[0, \infty)$  được tính bằng cách tách miền tích phân theo các khoảng phân hoạch giá trị:

$$\int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} \left( \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \right) dt = \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(A_j)$$

Thực hiện hoán đổi thứ tự lấy tổng để nhóm các hệ số theo từng độ đo  $\mu(A_j)$ :

$$\sum_{j=1}^n \mu(A_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(A_j) = \int_D s d\mu$$

Đẳng thức trên xác nhận mệnh đề đúng với mọi hàm đơn giản không âm.

**Bước 2: Tìm chặn trên ( $\leq$ ) dựa vào định nghĩa sup**

Xét một hàm đơn giản bất kỳ thỏa mãn điều kiện kẹp  $0 \leq s \leq f$ . Khi đó, với mỗi mức  $t \geq 0$ , ta có quan hệ bao hàm tập hợp tương ứng trên trục hoành:

$$\{s \geq t\} \subset \{f \geq t\} \implies \mu(\{s \geq t\}) \leq \mu(\{f \geq t\})$$

Lấy tích phân hai vế theo biến  $t$  trên miền  $[0, \infty)$  đối với độ đo Lebesgue và đồng thời áp dụng kết quả đã thiết lập ở Bước 1 cho hàm đơn giản  $s$ , ta thu được đánh giá:

$$\int_D s d\mu = \int_0^\infty \mu(\{s \geq t\}) dt \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi hàm đơn giản  $s$  nằm dưới  $f$ . Do đó, khi lấy cận trên đúng (sup) cho vế trái trên lớp hàm  $0 \leq s \leq f$  theo đúng định nghĩa tích phân, ta thu được vế trái của hệ thức kẹp:

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_D s d\mu \leq \int_0^\infty \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (1)$$

**Bước 3: Dùng Định lý xấp xỉ và MCT để thiết lập dấu bằng**

Dựa vào Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm  $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$  hội tụ đơn điệu tăng về hàm giới hạn:  $\varphi_n \uparrow f$ . Tại mỗi mức  $t \geq 0$  cố định, ta xây dựng dãy các tập mức tương ứng  $E_n = \{\varphi_n \geq t\}$ . Tính chất đơn điệu tăng của dãy hàm kéo theo  $E_n$  là một dãy tập tăng dần theo quan hệ bao hàm:  $E_n \subset E_{n+1}$ .

Hơn nữa, nhờ tính chất hội tụ điểm  $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$ , ta dễ dàng kiểm tra được  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \{f \geq t\}$ . Sử dụng tính chất liên tục từ dưới của độ đo  $\mu$ , ta có sự hội tụ của dãy số thực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{\varphi_n \geq t\}) = \mu(\{f \geq t\}) \quad (\text{dãy tăng đơn điệu})$$

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) cho tích phân của dãy hàm mức trên khoảng  $[0, \infty)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \mu(\{\varphi_n \geq t\}) dt = \int_0^{\infty} \mu(\{f \geq t\}) dt$$

Mặt khác, lập luận MCT tương tự trên không gian  $D$  cho ta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Do mối quan hệ đẳng thức giữa tích phân và hàm mức đã được thiết lập ở Bước 1 cho từng hàm đơn giản  $\varphi_n$ , hai giá trị giới hạn trên bắt buộc phải trùng nhau. Suy ra:

$$\int_D f d\mu = \int_0^{\infty} \mu(\{f \geq t\}) dt \quad (2)$$

Kết hợp đánh giá (1) và (2), ta hoàn tất chứng minh. ■

#### Theorem 4. (Prob 8.13: Tiêu chuẩn khả tích cho hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ . Giả sử  $f$  là một hàm đo được không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên một tập hợp  $D \in \mathfrak{A}$  với  $\mu(D) < \infty$ . Đặt  $D_n = \{x \in D : f(x) \geq n\}$  với mọi  $n \in \mathbb{Z}_+$ . Chứng minh rằng  $f$  khả tích ( $\int_D f d\mu < \infty$ ) khi và chỉ khi  $\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} \mu(D_n) < \infty$ .

#### Proof.

Quá trình chứng minh được chia làm các bước dựng hàm phụ và đánh giá tích phân dựa trên các kết quả hệ quả sẵn có:

##### Bước 1: Chuyển chuỗi độ đo về tích phân chuỗi hàm chỉ thị

Gọi  $\chi_{D_n}$  là hàm chỉ thị của tập đo được  $D_n$ . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của tập  $D_n$  chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên  $D$ :

$$\mu(D_n) = \int_D \chi_{D_n} d\mu$$

Vì  $(\chi_{D_n})_{n=1}^{\infty}$  là một dãy các hàm đo được không âm trên  $D$ , áp dụng Hệ quả 1 (Tính  $\sigma$ -cộng tính của dãy hàm), ta được phép hoán đổi vị trí toán tử tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_D \chi_{D_n} d\mu = \int_D \left( \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{D_n} \right) d\mu$$

##### Bước 2: Xác định và đánh giá hàm tổng phụ $g(x)$

Đặt  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{D_n}(x)$ . Hàm số này đếm số lượng các số nguyên dương  $n$  sao cho  $f(x) \geq n$ . Tương tự ý tưởng phân tách trực tung của Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, ta xét giá trị của  $g(x)$  tại mọi điểm  $x \in D$ :

- Trường hợp  $f(x) = \infty$ : Khi đó  $x \in D_n$  với mọi  $n \geq 1$ , suy ra  $\chi_{D_n}(x) = 1$  với mọi  $n$ , dẫn đến  $g(x) = \infty$ .

- Trường hợp  $f(x) < \infty$ : Tồn tại một số nguyên không âm  $k$  sao cho  $k \leq f(x) < k+1$ . Khi đó,  $f(x) \geq n$  với mọi số nguyên dương  $1 \leq n \leq k$  và  $f(x) < n$  với mọi  $n \geq k+1$ . Do đó, tổng các hàm chỉ thị bằng đúng phần nguyên của hàm số, tức là  $g(x) = k = \lfloor f(x) \rfloor$ .

Từ các lập luận trên, tại mọi điểm  $x \in D$ , ta luôn có bất đẳng thức kẹp:

$$g(x) \leq f(x) \leq g(x) + 1$$

### Bước 3: Lấy tích phân và biện luận điều kiện khả tích

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân (Bổ đề 1), lấy tích phân trên miền  $D$  cho toàn bộ bất đẳng thức kẹp ở Bước 2:

$$\int_D g \, d\mu \leq \int_D f \, d\mu \leq \int_D g \, d\mu + \int_D 1 \, d\mu$$

Thay các kết quả tính toán  $\int_D g \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n)$  và  $\int_D 1 \, d\mu = \mu(D)$  vào hệ thức, ta có mối liên hệ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) \leq \int_D f \, d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) + \mu(D)$$

Do giả thiết miền tích phân có độ đo hữu hạn  $\mu(D) < \infty$ , ta đánh giá hai chiều bất đẳng thức:

- ( $\implies$ ): Nếu  $\int_D f \, d\mu < \infty$ , từ vế trái của bất đẳng thức kẹp ta suy ra  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) \leq \int_D f \, d\mu < \infty$ . Do đó chuỗi số hội tụ.
- ( $\impliedby$ ): Nếu  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) < \infty$ , từ vế phải của bất đẳng thức kẹp và điều kiện  $\mu(D) < \infty$ , ta suy ra tích phân  $\int_D f \, d\mu$  bị chặn trên bởi tổng của hai đại lượng hữu hạn. Do đó hàm số  $f$  khả tích trên miền  $D$ .

■

### Theorem 5. (Hệ quả 3: Bổ đề Fatou)

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là một không gian độ đo và  $D \in \mathfrak{A}$ . Giả sử  $(f_n)_{n=1}^{\infty}$  là một dãy các hàm đo được không âm trên  $D$ . Khi đó:

$$\int_D \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

### Proof.

#### Bước 1: Xây dựng dãy phụ không giảm

Với mỗi  $n \in \mathbb{N}^*$ , ta định nghĩa một hàm mới  $g_n$  như sau:

$$g_n(x) = \inf_{k \geq n} f_k(x) \quad (\forall x \in D)$$

Vì các  $f_k \geq 0$  và đo được, nên  $g_n$  cũng là một hàm đo được không âm trên  $D$ .

Xét tính chất của dãy  $(g_n)$ :

- Tính tăng: Khi  $n$  tăng, tập các chỉ số  $k \geq n$  nhỏ dần đi, do đó cận dưới đúng (infimum) sẽ phải giữ nguyên hoặc lớn hơn. Tức là  $g_n \leq g_{n+1}$  với mọi  $n$ .
- Hội tụ về  $\liminf$ : Giới hạn của dãy  $(g_n)$  chính là giới hạn dưới của dãy  $(f_n)$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \sup_{n \geq 1} \left( \inf_{k \geq n} f_k(x) \right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Vậy ta có dãy  $g_n$  tăng dần và tiến tới  $\liminf f_n$ , ký hiệu là  $g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

### Bước 2: Thiết lập bất đẳng thức tích phân

Theo định nghĩa của  $g_n$ , vì  $g_n$  là infimum của các  $f_k$  ( $k \geq n$ ), ta hiển nhiên có:

$$g_n \leq f_n \quad (\forall n \geq 1)$$

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta suy ra:

$$\int_D g_n d\mu \leq \int_D f_n d\mu \quad (\forall n \geq 1)$$

Lấy giới hạn dưới (liminf) khi  $n \rightarrow \infty$  cho cả hai vế của bất đẳng thức, chiều của bất đẳng thức vẫn được giữ nguyên:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

### Bước 3: Áp dụng Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT)

Vì  $(g_n)$  là một dãy hàm đo được không âm tăng dần ( $g_n \uparrow \liminf f_n$ ), ta đủ điều kiện để áp dụng MCT:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left( \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right) d\mu = \int_D \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu$$

Chú ý rằng vì giới hạn  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu$  tồn tại, nên giá trị lim cũng chính là lim inf. Tức là:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \quad (2)$$

### Kết luận:

Thế (2) vào vế trái của (1), ta thu được điều phải chứng minh:

$$\int_D \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

■

### Theorem 6. (Sự tương đương: Định lý Hội tụ đơn điệu là hệ quả của Bổ đề Fatou)

Cho  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  là không gian độ đo và  $(f_n)_{n=1}^\infty$  là một dãy các hàm đo được không âm sao cho  $f_n \uparrow f$  hầu khắp nơi.

Nếu ta thừa nhận Bổ đề Fatou, ta có thể suy ra trực tiếp Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

### Proof.

Quá trình chứng minh chỉ gồm 2 chiều bất đẳng thức:

#### Chiều ( $\leq$ ): Sử dụng tính đơn điệu của tích phân

Vì dãy hàm tăng  $f_n \uparrow f$ , ta có  $f_n \leq f$  hầu khắp nơi với mọi  $n \geq 1$ .

Áp dụng tính chất đơn điệu của tích phân đối với hàm không âm, ta có:



$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Dãy số thực  $(\int_X f_n d\mu)$  là một dãy không giảm. Do đó, giới hạn của nó tồn tại (có thể là vô hạn) và khi lấy giới hạn  $n \rightarrow \infty$ , bất đẳng thức vẫn được bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu \quad (1)$$

**Chiều ( $\geq$ ): Sử dụng Bổ đề Fatou**

Vì  $(f_n)$  là một dãy hàm đo được không âm, ta có đủ điều kiện để áp dụng trực tiếp Bổ đề Fatou:

$$\int_X \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Ta đánh giá hai vế của bất đẳng thức này:

- Ở vế trái: Do dãy  $(f_n)$  hội tụ điểm về  $f$ , giới hạn dưới (liminf) cũng chính là giới hạn thông thường, tức là  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ .
- Ở vế phải: Do dãy số thực  $(\int_X f_n d\mu)$  là dãy tăng nên giới hạn của nó tồn tại, suy ra  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ .

Thay hai kết quả này vào bất đẳng thức Fatou ở trên, ta thu được:

$$\int_X f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \quad (2)$$

**Kết luận:**

Từ (1) và (2), bất đẳng thức xảy ra ở cả hai chiều, nên ta bắt buộc phải có dấu bằng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Định lý Hội tụ đơn điệu (MCT) đã được chứng minh hoàn tất từ Bổ đề Fatou. ■

**Theorem 7. (Prob 9.24)**

Cho dãy hàm đo được không âm  $f_n$  trên  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  sao cho

$$f_n \rightarrow f \text{ a.e.} \quad \text{và} \quad \int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu.$$

Chứng minh rằng với mọi  $E \in \mathcal{A}$  ta có

$$\int_E f_n d\mu \rightarrow \int_E f d\mu.$$

**Proof.**

**Bước 1: Áp dụng Bổ đề Fatou cho các tập con**

Vì  $f_n \geq 0$  và  $f_n \rightarrow f$  a.e. trên toàn không gian  $X$ , thì sự hội tụ này cũng đúng hầu khắp nơi trên mọi tập con của  $X$ .

Áp dụng Bổ đề Fatou trên tập  $E$ :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_E f d\mu \quad (1)$$

Áp dụng Bổ đề Fatou trên phần bù  $X \setminus E$ :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \setminus E} f_n d\mu \geq \int_{X \setminus E} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_{X \setminus E} f d\mu \quad (2)$$

### Bước 2: Đánh giá cận trên (limsup) qua phép bù

Theo tính chất cộng tính của tích phân trên các miền rời nhau, ta luôn có:

$$\int_E f_n d\mu = \int_X f_n d\mu - \int_{X \setminus E} f_n d\mu$$

Lấy lim sup hai vế. Lưu ý rằng khi đưa dấu trừ ra ngoài một giới hạn, lim inf sẽ biến thành lim sup và ngược lại. Đồng thời do giả thiết  $\lim \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$  đã tồn tại một cách hữu hạn, ta có quyền tách giới hạn:

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \left( \int_X f_n d\mu - \int_{X \setminus E} f_n d\mu \right) \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu - \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \setminus E} f_n d\mu \end{aligned}$$

Thay giả thiết của đề bài vào số hạng đầu, và áp dụng bất đẳng thức (2) vào số hạng sau:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_X f d\mu - \int_{X \setminus E} f d\mu$$

Dùng lại tính cộng tính của tích phân cho hàm  $f$ :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu \quad (3)$$

### Kết luận

Kết hợp bất đẳng thức (1) và (3), ta thiết lập được chuỗi kẹp:

$$\int_E f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu$$

Vì cận dưới và cận trên bằng nhau, giới hạn bắt buộc phải tồn tại và hội tụ đúng về giá trị đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$$

■

### Theorem 8. (Định lý 8.14 - Prob 9.25: Hội tụ với dãy bị chặn trên bởi giới hạn)

Cho không gian độ đo  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  và  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy các hàm đo được, không âm trên tập  $D \in \mathcal{A}$ . Giả sử  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$  tồn tại hầu khắp nơi (a.e.) trên  $D$  và  $f_n \leq f$  hầu khắp nơi trên  $D$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Khi đó, ta có:

$$\int_D f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

**Proof.**

Vì các giả thiết đều đúng hầu khắp nơi (a.e.), tồn tại một tập null  $N \subset D$  ( $\mu(N) = 0$ ) sao cho trên miền  $D \setminus N$ , ta có sự hội tụ điểm  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$  và bất đẳng thức  $f_n \leq f$  đúng. Do  $\mu(N) = 0$ , các tích phân trên  $D$  tương đương với tích phân trên  $D \setminus N$ .

Áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy hàm không âm  $f_n$ , ta có đánh giá chặn dưới:

$$\int_D f d\mu = \int_D \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Mặt khác, do  $f_n \leq f$ , áp dụng tính đơn điệu của tích phân và lấy giới hạn trên (limsup) hai vế, ta thu được đánh giá chặn trên:

$$\int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Nói hai bất đẳng thức trên cùng và sử dụng  $\liminf \leq \limsup$ , ta được:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Do hai đầu bất đẳng thức bằng nhau, giới hạn thực sự tồn tại và ta có điều phải chứng minh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

■

**Theorem 9. (Phản ví dụ cho Định lý Hội tụ đơn điệu giảm)**

Phản ví dụ này nhấn mạnh rằng: Đối với dãy hàm giảm ( $f_n \downarrow f$ ), điều kiện tồn tại ít nhất một hàm số thành phần khả tích (tức là  $\exists k, \int_D f_k d\mu < \infty$ ) là bắt buộc.

Xét không gian đo Lebesgue  $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$  với miền  $D = [0, \infty)$ .

Định nghĩa dãy hàm đặc trưng (hiện tượng khối lượng trượt):

$$f_n(x) = \chi_{[n, \infty)}(x)$$

Dãy  $f_n$  là dãy giảm ( $f_{n+1} \leq f_n$ ) và hội tụ điểm về hàm  $f(x) = 0$  trên  $D$ . Tuy nhiên, do không có bất kỳ hàm  $f_k$  nào trong dãy có tích phân hữu hạn,  $f_n$  không bảo toàn giới hạn khi đi qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L \neq \int_D f d\mu_L$$

**Proof.**

Ta chứng minh tính giảm đơn điệu và hội tụ điểm về 0 ( $f_n \downarrow 0$ ):

- Tính giảm đơn điệu: Vì các nửa khoảng lồng nhau  $[n+1, \infty) \subset [n, \infty)$ , nên theo tính chất của hàm chỉ thị, ta luôn có  $\chi_{[n+1, \infty)}(x) \leq \chi_{[n, \infty)}(x)$ . Do đó,  $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$  và mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Dãy hàm giảm đơn điệu.
- Hội tụ điểm về 0: Lấy một điểm  $x_0 \in \mathbb{R}$  bất kỳ. Theo nguyên lý Archimedes, luôn tồn tại số nguyên  $n_0$  đủ lớn sao cho  $n_0 > x_0$ . Khi đó, với mọi  $n \geq n_0$ , ta có  $x_0 \notin [n, \infty) \implies f_n(x_0) = 0$ . Do đó, tại mọi điểm, hàm số có giá trị đuôi triệt tiêu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$$

Ta tính toán và so sánh các giá trị tích phân:

- Tích phân của hàm giới hạn:

$$\int_D f d\mu_L = \int_D 0 d\mu_L = 0$$

- Tích phân của các hàm trong dãy: Vì miền xác định của hàm chỉ thị có độ đo Lebesgue vô hạn, nên tích phân của mọi hàm trong dãy đều bằng vô cùng:

$$\int_D f_n d\mu_L = \mu_L([n, \infty)) = \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Do đó giới hạn của dãy tích phân là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Đối chiếu hai kết quả, ta thu được mâu thuẫn:

$$\infty \neq 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu_L \neq \int_D f d\mu_L$$

Điều chứng tỏ định lý hội tụ đơn điệu là sai nếu thiếu đi điều kiện  $\int_D f_k d\mu_L < \infty$ .

■

## 2. Hàm bị chặn

### Observation 1. Nhận xét: Từ phản ví dụ đến Định lý Hội tụ bị chặn

Từ phản ví dụ hàm đặc trưng  $f_n = \chi_{[n, \infty)}$ , ta nhận thấy tính chất qua giới hạn của tích phân đối với dãy giảm sẽ không được bảo toàn nếu diện tích dưới đồ thị phân kỳ ra vô cùng theo phương ngang. Sự phân kỳ này bắt nguồn từ hai yếu tố:

1. Không gian đo có độ đo vô hạn ( $\mu(D) = \infty$ ).
2. Dãy hàm không bị chặn trên bởi một hàm khả tích.

Khi ta giới hạn không gian đo thành tập có độ đo hữu hạn ( $\mu(D) < \infty$ ) và bổ sung giả thiết dãy hàm bị chặn đều bởi một hằng số  $M$ , tính phân kỳ này bị loại bỏ. Dưới các điều kiện đó, sự hội tụ điểm hầu khắp nơi của dãy hàm bắt buộc kéo theo sự hội tụ của tích phân tương ứng. Đây chính là nội dung của Định lý Hội tụ bị chặn (Bounded Convergence Theorem - BCT).

### Theorem 10. Định lý Hội tụ bị chặn (Bounded Convergence Theorem - BCT)

Cho  $(X, \mathfrak{A}, \mu)$  là một không gian đo và  $D \in \mathfrak{A}$  là một tập có độ đo hữu hạn (tức là  $\mu(D) < \infty$ ).

Giả sử  $(f_n)_{n=1}^{\infty}$  là một dãy các hàm đo được trên  $D$  thỏa mãn hai điều kiện:

1. Hội tụ điểm:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  hầu khắp nơi trên  $D$ .
2. Bị chặn đều: Tồn tại một hằng số  $M > 0$  sao cho  $|f_n(x)| \leq M$  hầu khắp nơi trên  $D$ , với mọi  $n \geq 1$ .

Khi đó, các hàm  $f_n$  và  $f$  đều khả tích trên  $D$ , và giới hạn có thể hoán đổi với dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_D f d\mu$$

**Proof.**

Nhờ giả thiết hội tụ điểm  $f_n \rightarrow f$  và tính bị chặn  $|f_n| \leq M$ , ta suy ra hàm giới hạn cũng thỏa mãn  $|f| \leq M$  hầu khắp nơi trên  $D$ .

Do tập  $D$  có độ đo hữu hạn ( $\mu(D) < \infty$ ), hàm hằng  $M$  là một hàm khả tích trên  $D$ :

$$\int_D M d\mu = M \cdot \mu(D) < \infty$$

Áp dụng Bổ đề Fatou cho các dãy hàm không âm được xây dựng từ  $f_n$  và  $M$ :

**Bước 1: Áp dụng Bổ đề Fatou**

Xét dãy hàm không âm  $g_n = f_n + M \geq 0$ . Áp dụng Bổ đề Fatou:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (f_n + M) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (f_n + M) d\mu \\ \Rightarrow \int_D (f + M) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( \int_D f_n d\mu + \int_D M d\mu \right) \end{aligned}$$

Vì  $\int_D M d\mu$  là một giá trị thực hữu hạn, ta giản ước nó ở cả hai vế:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

**Bước 2: Áp dụng Bổ đề Fatou ngược**

Xét dãy hàm không âm  $h_n = M - f_n \geq 0$ . Áp dụng Bổ đề Fatou:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (M - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (M - f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_D (M - f) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( \int_D M d\mu - \int_D f_n d\mu \right) \end{aligned}$$

Sử dụng tính chất của giới hạn dưới:  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n)$ , vế phải được biến đổi thành:

$$\int_D M d\mu - \int_D f d\mu \leq \int_D M d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Tiếp tục giản ước giá trị hữu hạn  $\int_D M d\mu$  ở hai vế và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_D f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (2)$$

**Bước 3: Kết hợp các bất đẳng thức**

Từ (1) và (2), ta thiết lập được chuỗi bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Theo tính chất cơ bản của giới hạn, ta luôn có  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$ .

Do đó, đẳng thức bắt buộc phải xảy ra trên toàn bộ chuỗi. Điều này chứng tỏ giới hạn của dãy tích phân tồn tại và bằng chính  $\int_D f d\mu$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

**Theorem 11. Định lý Hội tụ Bị chặn Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT)**

Cho  $(f_n)_{n=1}^{\infty}$  là một dãy hàm số đo được trong không gian đo  $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$ .

Giả sử dãy  $(f_n)$  thỏa mãn hai điều kiện:

1. Hội tụ điểm:  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  hầu khắp nơi trên  $\Omega$ .
2. Bị chặn bởi hàm khả tích (Dominated): Tồn tại một hàm khả tích  $g$  (tức là  $\int_{\Omega} |g| d\mu < \infty$ ) sao cho:

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{hầu khắp nơi, với mọi } n \geq 1$$

Khi đó, hàm giới hạn  $f$  cũng khả tích, và ta được phép đưa giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu$$

Hệ quả tương đương:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0$

**Proof.**

Vì  $|f_n| \leq g$  và  $f_n \rightarrow f$  hầu khắp nơi, ta suy ra  $|f| \leq g$  hầu khắp nơi, do đó  $f$  cũng là hàm khả tích.

Từ giả thiết  $|f_n| \leq g$ , ta có bất đẳng thức kép:  $-g \leq f_n \leq g$ .

Điều này sinh ra hai dãy hàm không âm để ta áp dụng Bổ đề Fatou:

**Bước 1: Xét dãy không âm  $(g + f_n \geq 0)$**

Áp dụng Bổ đề Fatou (thuận):

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (g + f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_{\Omega} (g + f) d\mu &\leq \int_{\Omega} g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \end{aligned}$$

Vì  $\int_{\Omega} g d\mu < \infty$ , ta giản ước nó ở hai vế:

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \quad (1)$$

**Bước 2: Xét dãy không âm  $(g - f_n \geq 0)$**

Lại áp dụng Bổ đề Fatou:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (g - f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_{\Omega} (g - f) d\mu &\leq \int_{\Omega} g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \end{aligned}$$

Tiếp tục giản ước  $\int_{\Omega} g d\mu$  hữu hạn ở hai vế và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_{\Omega} f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \quad (2)$$

**Bước 3: Nguyên lý kẹp**

Từ (1) và (2), ta có chuỗi bất đẳng thức:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \leq \int_{\Omega} f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

Vì  $\liminf \leq \limsup$ , đẳng thức bất buộc xảy ra. Giới hạn tồn tại và bằng chính  $\int_{\Omega} f d\mu$ .

**Bước 4: Chứng minh  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0$**

Để chứng minh hệ quả này, ta nhận thấy sai khác giữa hai hàm bị kẹp bởi:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x)| \leq g(x) + g(x) = 2g(x)$$

Do đó, dãy hàm không âm  $2g - |f_n - f| \geq 0$ . Áp dụng Bô đê Fatou cho dãy này:

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} (2g - |f_n - f|) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (2g - |f_n - f|) d\mu$$

Vì  $|f_n - f| \rightarrow 0$  hầu khắp nơi, vế trái trở thành  $\int_{\Omega} 2g d\mu$ . Ta tách vế phải theo tính tuyến tính:

$$\int_{\Omega} 2g d\mu \leq \int_{\Omega} 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu$$

Do  $\int_{\Omega} g d\mu < \infty$ , ta triệt tiêu đại lượng hữu hạn này ở hai vế, dẫn đến:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \leq 0$$

Vì tích phân của hàm không âm luôn không âm, ta có  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu \geq 0$ . Theo nguyên lý kẹp, giới hạn tồn tại và bất buộc phải bằng 0.

Vậy hệ quả đã được chứng minh. ■

### Theorem 12. (Hội tụ đều trên không gian đo hữu hạn)

Cho  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  là một không gian độ đo với giả thiết độ đo toàn không gian hữu hạn, tức là  $\mu(X) < \infty$ . Giả sử dãy hàm số  $(f_n)_{n=1}^{\infty} \subset L^1(\mu)$  và  $f_n$  hội tụ đều đến hàm giới hạn  $f$  trên  $X$ . Khi đó:

- Hàm giới hạn  $f$  cũng thuộc lớp khả tích  $L^1(\mu)$ .
- Ta được phép chuyển giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

### Proof.

#### Bước 1: Thiết lập hàm trội khả tích

Do dãy  $f_n \rightarrow f$  hội tụ đều trên  $X$ , dãy này thỏa mãn là dãy Cauchy. Tức là tồn tại một chỉ số nguyên dương  $N$  sao cho với mọi  $n \geq N$ , ta có:

$$|f_n(x) - f_N(x)| \leq 1 \quad (\forall x \in X)$$

Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta đánh giá được độ lớn của mọi hàm  $f_n$  (từ chỉ số  $N$  trở đi):

$$|f_n(x)| \leq |f_N(x)| + 1 \quad (\forall x \in X, \forall n \geq N)$$

Ta chọn hàm chặn trên  $g(x) = |f_N(x)| + 1$ .

Khảo sát tính khả tích của  $g(x)$  trên không gian đo  $X$ :

- Vì  $f_N \in L^1(\mu)$  theo giả thiết ban đầu, nên  $\int_X |f_N| d\mu < \infty$ .

- Vì không gian đo hữu hạn  $\mu(X) < \infty$ , tích phân của hàm hằng số 1 cũng hữu hạn:  
 $\int_X 1 d\mu = \mu(X) < \infty$ .

Tổng của hai hàm khả tích là một hàm khả tích, suy ra  $g \in L^1(\mu)$ .

### Bước 2: Áp dụng Định lý Hội tụ Bị chặn Lebesgue (DCT)

Xét dãy hàm đuôi  $(f_n)_{n=N}^\infty$ , ta thấy nó thỏa mãn hai điều kiện của Định lý Hội tụ Bị chặn Lebesgue:

1. Hội tụ điểm:  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  với mọi  $x \in X$  (hội tụ đều hiển nhiên suy ra hội tụ điểm).
2. Bị chặn bởi hàm khả tích:  $|f_n(x)| \leq g(x)$  với mọi  $n \geq N$ , trong đó  $g \in L^1(\mu)$ .

Theo hệ quả trực tiếp của Định lý DCT, ta kết luận:

- Hàm giới hạn  $f \in L^1(\mu)$ .
- Công thức giới hạn qua tích phân được bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Định được chứng minh hoàn tất. ■

### Theorem 13. (Prob 9.22: Mở rộng của Định lý Hội tụ Bị chặn Lebesgue (Generalized DCT))

Giả sử ta thay thế điều kiện bị chặn tuyệt đối bởi một hàm hằng số  $g$  bằng một dãy các hàm khả tích  $g_n$ .  
 Phát biểu tổng quát như sau:

Cho dãy hàm đo được  $(f_n)_{n=1}^\infty$  và hàm  $f$  đo được trên  $D$ . Cho dãy hàm không âm, khả tích  $(g_n)_{n=1}^\infty$  và hàm không âm, khả tích  $g$  trên  $D$  thỏa mãn:

1.  $f_n \rightarrow f$  và  $g_n \rightarrow g$  hầu khắp nơi (a.e.) trên  $D$ .
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$ .
3.  $|f_n| \leq g_n$  trên  $D$  với mọi  $n \geq 1$ .

Khi đó, hàm giới hạn  $f$  cũng khả tích trên  $D$  và ta có quyền đưa giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

#### Proof.

Vì  $|f_n| \leq g_n$ , lấy giới hạn hai vế ta có  $|f| \leq g$  hầu khắp nơi trên  $D$ . Do  $g$  khả tích, ta suy ra ngay  $f$  cũng khả tích.

Từ điều kiện 3, ta có bất đẳng thức kẹp:  $-g_n \leq f_n \leq g_n$ . Ta thiết lập hai dãy hàm không âm và áp dụng Bổ đề Fatou:

#### Bước 1: Xét dãy hàm không âm $(g_n + f_n \geq 0)$

Áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy này trên miền  $D$ :

$$\int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (g_n + f_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g_n + f_n) d\mu$$

Nhờ tính chất hội tụ điểm hầu khắp nơi, vế trái hội tụ về  $\int_D (g + f) d\mu$ . Vế phải tách thành tổng các  $\liminf$ :



$$\int_D g d\mu + \int_D f d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Sử dụng giả thiết  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu = \int_D g d\mu < \infty$ , ta triệt tiêu đại lượng hữu hạn này ở hai vế, thu được ràng buộc dưới:

$$\int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (1)$$

**Bước 2: Xét dãy hàm không âm** ( $g_n - f_n \geq 0$ )

Tiếp tục áp dụng Bổ đề Fatou cho dãy hiệu:

$$\begin{aligned} \int_D \liminf_{n \rightarrow \infty} (g_n - f_n) d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (g_n - f_n) d\mu \\ \Rightarrow \int_D g d\mu - \int_D f d\mu &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D (-f_n) d\mu \end{aligned}$$

Chú ý rằng  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Thay vào và tiếp tục giản ước  $\int_D g d\mu < \infty$  ở hai vế:

$$-\int_D f d\mu \leq -\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \Rightarrow \int_D f d\mu \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \quad (2)$$

**Bước 3: Nguyên lý kẹp**

Kết hợp hai đánh giá (1) và (2), ta có chuỗi bao hàm:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu$$

Vì bất đẳng thức  $\liminf \leq \limsup$  luôn đúng, toàn bộ chuỗi trên ép buộc các dấu bằng phải xảy ra. Do đó, giới hạn tồn tại và thỏa mãn đẳng thức:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n d\mu = \int_D f d\mu$$

Định lý mở rộng được chứng minh hoàn tất. ■

### Problem 1. (Phản ví dụ DCT)

Biện luận giới hạn tích phân sau theo tham số  $a \in \mathbb{R}$ :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty \frac{n}{1 + n^2 x^2} dx$$

Ta có kết quả tích phân phụ thuộc vào tham số  $a < 0$ ,  $a = 0$  hay  $a > 0$ . Điều này có mâu thuẫn với Định lý Hội tụ Trội (DCT) hay không?

*Proof.*

Ta chứng minh được dãy hàm hội tụ điểm về hàm giới hạn  $f(x) = 0$  hầu khắp nơi trên  $\mathbb{R}$ . Khi cho  $n \rightarrow \infty$ , giá trị  $f_n(0)$  tiến ra vô cùng, nên ta loại bỏ tập  $\{0\}$  có độ đo Lebesgue bằng 0.

Để tính toán trực tiếp giới hạn tích phân Riemann suy rộng, ta sử dụng nguyên hàm của hàm lượng giác ngược:

$$\int_a^\infty \frac{n}{1 + n^2 x^2} dx = [\arctan(nx)]_a^\infty = \frac{\pi}{2} - \arctan(na)$$

Khi cho  $n \rightarrow \infty$ , giá trị của giới hạn phụ thuộc hoàn toàn vào dấu của tham số  $a$ :

- Nếu  $a > 0$ ,  $na \rightarrow +\infty$  suy ra  $\arctan(na) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , do đó giới hạn  $L = 0$ .
- Nếu  $a = 0$ , ta có  $\arctan(0) = 0$  nên giới hạn  $L = \frac{\pi}{2}$ .
- Nếu  $a < 0$ ,  $na \rightarrow -\infty$  dẫn đến  $\arctan(na) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ , do đó giới hạn  $L = \pi$ .

Ta khảo sát cực trị của  $f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2}$  theo biến liên tục  $n$ . Đạo hàm theo  $n$  triệt tiêu tại  $n = \frac{1}{|x|}$  nên giá trị lớn nhất tại mỗi điểm là  $g(x) = \frac{1}{2|x|}$ . Đây chính là hàm trội nhỏ nhất ta có làm chặn trên.

Khi  $a \leq 0$ , miền tích phân  $[a, \infty)$  bắt buộc phải chứa điểm  $x = 0$ . Hàm trội  $g(x) = \frac{1}{2|x|}$  có tích phân tiến về vô cùng tại lân cận điểm 0.

Đồng nghĩa với việc không tồn tại bất kỳ một hàm trội khả tích Lebesgue nào trên miền này. Vì giả thiết DCT bị vi phạm, ta không được phép hoán đổi dấu giới hạn và tích phân, trường hợp còn lại  $a > 0$  nhất quán với định lý DCT. ■

### Problem 2. (Phản ví dụ MCT)

Cho dãy hàm số  $f_n(x) = nx^n$  xác định trên đoạn  $[0, 1]$ .

(a) Chứng tỏ rằng:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ .

(b) Giải thích vì sao Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) không áp dụng được trong trường hợp này.

**Answer.**

**Chứng minh ý (a)**

**Tìm giới hạn của tích phân:**

Ta tính tích phân của  $f_n(x)$  trên đoạn  $[0, 1]$  với  $n$  cố định trước:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nx^n dx = n \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{n}{n+1}$$

Sau đó, lấy giới hạn khi  $n \rightarrow \infty$ :

$$\text{Vế trái} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

**Tìm giới hạn điểm:**

Ta cố định  $x \in [0, 1]$  và khảo sát giới hạn điểm của  $f_n(x)$  khi  $n \rightarrow \infty$ :

Nếu  $x = 1$ :  $f_n(1) = n \cdot 1^n = n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = +\infty$ .

Nếu  $x \in [0, 1)$ : Viết lại  $nx^n = \frac{n}{x^{-n}}$ . Dùng L'Hopital, ta được  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x^{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{-nx^{-n-1}} = 0$ .

Vậy  $f_n(x) \rightarrow f(x) = 0$  a.e trên  $[0, 1]$  (trừ điểm  $x = 1$ ).

$$\text{Vế phải} = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0$$

Rõ ràng  $1 \neq 0$ , đẳng thức không xảy ra.

**Chứng minh ý (b)**

Với  $f_n(x) = n \cdot x^n$ , ta khảo sát cực trị của  $f_n(x)$  theo biến liên tục  $n$ . Đặt  $t = n$ , ta có:

$$f'(t) = 1 \cdot x^t + t \cdot x^t \ln x = x^t(1 + t \ln x)$$

Cho  $f'(t) = 0$ , ta được:  $1 + t \ln x = 0$  hay  $t = -\frac{1}{\ln x}$

Với mỗi  $x$  cố định nằm trong khoảng  $(0, 1)$ , sao cho  $t < -\frac{1}{\ln x}$ , ta có  $f'(t) > 0$ , hàm số  $f(t)$  tăng theo  $t$ .

Ngược lại, khi  $t$  tăng lên vượt qua ngưỡng  $-\frac{1}{\ln x}$ , ta có  $f'(t) < 0$  (vì  $\ln x < 0$ ), hàm số  $f(t)$  giảm theo  $t$ .

Do đây hàm  $f_n(x) = nx^n$  hoàn toàn không đơn điệu tăng trên  $[0, 1]$ , giả thiết Định lý Hội tụ Đơn điệu bị vi phạm dẫn tới đẳng thức ý (a) không xảy ra.

### Problem 3. (Áp dụng MCT)

Chứng minh rằng hàm số  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$  khả tích Lebesgue trên khoảng  $(0, \infty)$  và tính giá trị chính xác của tích phân:

$$I = \int_{(0, \infty)} \frac{x}{e^x - 1} d\mu_L$$

### Answer.

Nhận thấy với mọi  $x \in (0, \infty)$ , ta có  $x > 0$  và  $e^x > 1 \implies e^x - 1 > 0$ . Do đó, hàm số  $f(x)$  luôn liên tục và không âm trên miền xác định.

Chia cả tử và mẫu cho số hạng  $e^x$ :

$$f(x) = \frac{x \cdot e^{-x}}{(e^x - 1) \cdot e^{-x}} = \frac{x e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

Xét  $y = e^{-x}$ . Vì  $x > 0 \implies 0 < e^{-x} < 1$ , nhận thấy mẫu số thỏa mãn chuỗi cấp số nhân lùi vô hạn. Ta khai triển:

$$\frac{1}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx}$$

Nhân  $x e^{-x}$  ở tử số vào bên trong tổng:

$$f(x) = x e^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = \sum_{n=0}^{\infty} x e^{-(n+1)x} = \sum_{n=1}^{\infty} x e^{-nx}$$

Vì mọi số hạng trong tổng đều không âm trên  $(0, \infty)$ , áp dụng MCT, ta hoán đổi dấu tích phân và tổng chuỗi vô hạn (không cần kiểm tra sự khả tích trước):

$$I = \int_0^{\infty} \left( \sum_{n=1}^{\infty} x e^{-nx} \right) dx \stackrel{\text{MCT}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} x e^{-nx} dx$$

Ta tính  $K = \int_0^{\infty} x e^{-nx} dx$  bằng tích phân từng phần. Đặt  $u = x \implies du = dx$  và  $dv = e^{-nx} dx \implies v = -\frac{1}{n} e^{-nx}$ :

$$K = \left[ -\frac{x}{n} e^{-nx} \right]_0^{\infty} + \frac{1}{n} \int_0^{\infty} e^{-nx} dx$$

Giới hạn  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{n e^{nx}} = 0$  do hàm mũ tăng nhanh hơn hàm đa thức, và giá trị tại cận 0 bằng 0. Ta có:

$$K = 0 + \frac{1}{n} \left[ -\frac{1}{n} e^{-nx} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{n^2}$$

Thay giá trị của tích phân vào tổng ban đầu, ta được:

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Ta được chuỗi p-series với  $p = 2$ , tổng vô hạn này hội tụ:

$$I = \frac{\pi^2}{6} < \infty$$

Vì tích phân của hàm không âm ra giá trị hữu hạn, ta kết luận: Hàm số  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$  khả tích Lebesgue trên  $(0, \infty)$  (tức là  $f \in L^1$ ), và ước lượng chính xác của tích phân bằng  $\frac{\pi^2}{6}$ .

ξ