| ✓ Правильні 2/2 Бали |
|---|
| Вкажіть правильну послідовність дій при домедичній допомозі у разі раптової зупинки кровообігу: * |
| 1 Переконатися у відсутності небезпеки 🗸 |
| 2 Визначити наявність свідомості 🗸 |
| 3 Відновити прохідність дихальних шляхів 🗸 |
| 4 Визначити наявність дихання 🗸 |
| |
| ✓ Правильні 1/1 Бали |
| 2. Головними ознаками масивної зовнішньої кровотечі є: * 🗔 |
| 1) порушення цілісності пальців; |
| 2) пульсуючий характер кровотечі; |
| 3) оніміння кінцівок; |
| 4) відсутність дихання. |
| ✓ Правильні 1/1 Бали |
| 3. Вкажіть коли і як накладається кровоспинний турнікет * □□ |
| 1) якщо інші способи зупинки кровотечі є неефективними |
| 2) вище від рани |
| 3) у разі кровотечі з рани без можливості її чіткої візуалізації |
| 4) усі перелічені варіанти |
| |
| ✓ Правильні 1/1 Бали |
| 4. Вкажіть чи потрібно видаляти воду з легень у потерпілого внаслідок утоплення, якщо в нього відсутнє дихання: * 🔲 |
| 1) так |
| ② 2) Hi ✓ |

| ✓ Правильні 1/1 Бали |
|---|
| 5. Вкажіть як здійснюється непрямий масаж серця у немовлят: * |
| 1) натисканням двома руками на середину грудей |
| 2) натисканням однією рукою на середину грудей |
| 3) натисканням двома пальцями на середину грудей |
| 4) натисканням одним пальцем на середину грудей |
| |
| ✓ Правильні 1/1 Бали |
| 6. Вкажіть чи безпечно торкатися постраждалого у разі ураження блискавкою: * 🖫 |
| Taκ ✓ |
| ○ Hi |
| |
| ✓ Правильні 1/1 Бали |
| 7. Вкажіть правильну послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалому з підозрою на шок: * 🔲 |
| 1 Переконатися у відсутності небезпеки 🗸 |
| 2 Заспокоїти постраждалого та пояснити свої дії 🧹 |
| 3 Здійснити виклик екстреної медичної допомоги 🗸 |
| 4 Надати постраждалому протишокове положення 🗸 |
| 5 Вкрити термоковдрою 🗸 |
| 6 Наглядати за постраждалим до приїзду екстреної медичної допомоги |
| |