

Питання 9

Завершено

Балів 2,0 з 2,0

Відмітити питання

- Систему диференціальних рівнянь $\dot{x} = f(t, x)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$, називаємо *динамічною системою*, якщо
 - ☐ її права частина f не залежить від шуканих функцій x_1, \dots, x_n ;
 - ☐ її права частина f динамічно змінюється з часом;
 - ☒ її права частина f не залежить явно від часу t ;
 - ☐ її права частина f є сталою вздовж розв'язків.
- Особливою точкою* динамічної системи $\dot{x} = f(x)$ називаємо таку точку x_0 , в якій
 - ☒ векторне поле f обертається в нуль;
 - ☐ векторне поле f відмінне від нуля;
 - ☐ перетинаються траєкторії;
 - ☐ векторне поле f є сталим.

Питання 10

Завершено

Балів 0,0 з 2,0

Відмітити питання

Гамільтоновою системою з гамільтоніаном $H = H(x, y)$ називаємо динамічну систему вигляду

Виберіть одну відповідь:

- ☒ $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y}, \quad \dot{y} = \frac{\partial H}{\partial y} + \frac{\partial H}{\partial x}$
- ☐ $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y}, \quad \dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x}$
- ☒ $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y}, \quad \dot{y} = \frac{\partial H}{\partial x}$
- ☐ $\dot{x} = -\frac{\partial H}{\partial y}, \quad \dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x}$

Питання 11

Завершено

Балів 4,5 з 5,0

🚩 Відмітити питання

Завдання А

Завдання вимагає повного письмового розв'язку

Знайдіть розв'язок задачі Коші $y' = (9x + y)^2$, $y(0) = 0$.

1. Диференціальне рівняння в цьому завданні – це

- ☐ рівняння із відокремленими змінними;
- ☒ однорідне рівняння;
- ☐ рівнянням Бернуллі;
- ☐ рівняння, жодного з перелічених вище типів.

2. Рівняння можна звести до рівняння із відокремленими змінними, застосувавши заміну

- ☐ $v = y/x$;
- ☒ $v = 9x + y$;
- ☐ $v = 9x - y$;
- ☐ $y' = v^2$.

3. Загальний розв'язок диференціального рівняння має вигляд

- ☐ $y = 3\operatorname{tg} 3x + C$;
- ☐ $y = C \cos 3x + 3x$;
- ☒ $y = 3\operatorname{tg} (3x + C) - 9x$;
- ☐ $y = \ln(3x + C) - 3x$.

4. Розв'язком задачі Коші є функція

- ☒ $3\operatorname{tg} 3x - 9x$;
- ☐ $3\operatorname{tg} 3x$;
- ☐ $\ln(3x + 2) - 3x$;
- ☐ $9x$.

Питання 12

Завершено

Балів 4,0 з 5,0

Відмітити питання

Завдання В

Завдання вимагає повного письмового розв'язку

Розв'язати задачу Коші $(xy' - 3) \ln x = 2y$, $y(e) = 2$.

1. Якщо лінійне неоднорідне рівняння в цьому завданні записати у стандартному вигляді $y' + a(x)y = b(x)$, то права частина матиме вигляд:
☐ $b(x) = \ln x$; ☒ $b(x) = \frac{3}{x}$; ☐ $b(x) = x \ln x$; ☐ $b(x) = \frac{x}{3}$.
2. Загальний розв'язок відповідного лінійного однорідного рівняння є таким:
☒ $y_0 = C \ln^2 x$;
☐ $y_0 = C \ln x$;
☐ $y_0 = \ln x + C$;
☐ $y_0 = C \ln |\ln x|$.
3. Загальний розв'язок неоднорідного рівняння має вигляд:
☐ $y = C \ln x + 3 \ln^2 x$;
☒ $y = C \ln^2 x - 3 \ln x$;
☐ $y = \ln x + C + 2 \ln |\ln x|$;
☐ $y = C \ln |\ln x| - 2x$.
4. Розв'язком задачі Коші є функція:
☒ $5 \ln^2 x$; ☐ $\ln x + 3 \ln |\ln x|$; ☐ $\ln x (5 \ln x - 3)$; ☐ $\ln |\ln x| - 2x$.

Завдання С

Завдання вимагає повного письмового розв'язку

Розв'яжіть неявне рівняння $y - y'^2 = (x - 2)y'$.

1. Рівняння в цьому завданні є і його загальний вигляд

- ☐ $y = a(y)y' + b(y)$;
- ☐ $y' + a(x)y = b(x)$;
- ☒ $y = xy' + b(y')$;
- ☐ $y = a(x)y' + b(y')$.

2. Рівняння має однопараметричну сім'ю розв'язків

- ☐ $y = Cx + C^2 - C$;
- ☒ $y = Cx + C^2 - 2C$;
- ☐ $y = C$;
- ☐ $y = C^2x + C^2 + 2C$.

3. Це рівняння також має особливий розв'язок

- ☐ $y = -x^2 + 4x - 4$;
- ☐ $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$;
- ☐ $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x - 1$;
- ☒ $y = -\frac{1}{4}x^2 + x - 1$.

4. *Особливим* називаємо такий розв'язком неявного рівняння, який в точці свого графіка іншого розв'язку рівняння, причому в околі цієї точки графіки .

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до
5,0

Відмітити
питання

Завдання D

Завдання вимагає повного письмового розв'язку

Знайдіть розв'язок задачі Коші $y'' - 5y' + 6y = 4xe^x$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 5$.

1. Лінійне однорідне рівняння має фундаментальну систему розв'язків

- ☐ e^{-2x}, e^{-3x}
☐ e^{2x}, e^{3x}
☐ e^{-2x}, xe^{3x}
☐ $e^{2x}, 0$

2. Частковий розв'язок неоднорідного рівняння шукаємо у вигляді

- ☐ $y_* = ae^x$
☐ $y_* = (ax + b)e^x$
☐ $y_* = ax + b$
☐ $y_* = axe^x$

і він є таким

- ☐ $y_* = 12e^x$
☐ $y_* = 3xe^x$
☐ $y_* = 3x + 4$
☐ $y_* = (2x + 3)e^x$

3. Загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння є часткового розв'язку лінійного рівняння та розв'язку лінійного рівняння, тому

- ☐ $y = (2x + 3)e^x + C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$
☒ $y = C_1(2x + 3)e^x + C_2e^{2x} + C_3e^{3x}$
☐ $y = 12e^x + C_1e^{2x} + C_2xe^{3x}$
☐ $y = 3x + 4 + C_1e^{-2x} + C_2e^{-3x}$


4. Розв'язком задачі Коші є функція

- ☐ $3e^{2x} + 4e^{3x}$;
 ☐ $3e^{2x} + 2xe^x$;
 ☐ $(2x + 3)e^x$;
 ☐ $3x + 4 + e^{-3x}$

Питання 15

Завершено

Балів 0,0 з 5,0

 Відмітити питання

Завдання Е

Завдання вимагає повного письмового розв'язку

Розв'яжіть систему диференціальних рівнянь

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 4x_1 + x_2 - 2, \\ \dot{x}_2 = -10x_1 - 2x_2 + 6. \end{cases}$$

1. Нехай $\dot{x} = Ax + b$ – векторний запис системи. Власні значення матриці A є , а саме, $\lambda_1 =$ та $\lambda_2 =$.

2. Серед перелічених векторів-функцій

$$u(t) = e^t \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t - 3 \sin t \end{pmatrix}, \quad v(t) = e^t \begin{pmatrix} -\cos t \\ 2 \cos t + 3 \sin t \end{pmatrix}, \quad w(t) = e^t \begin{pmatrix} -\cos t \\ \sin t + 3 \cos t \end{pmatrix}, \quad y(t) = e^t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

пара векторів та утворюють фундаментальну систему розв'язків.

3. Частковий розв'язок неоднорідної системи з вектором правих частин $b = (\text{input}, \text{input})$ треба шукати у вигляді

☐ $x_* = (a_1 t + b_1, a_2 t + b_2);$
☐ $x_* = (a_1, a_2);$
☐ $x_* = e^t(a_1 \sin t, a_2 \cos t);$
☐ $x_* = e^t(a_1 \sin t + b_1 \cos t, a_2 \sin t + b_2 \cos t).$

4. Загальний розв'язок неоднорідної системи має вигляд

☐ $x_1 = e^t(c_2 - c_1) \cos t + t - 4, \quad x_2 = e^t(2c_1 \cos t + (3c_1 + c_1) \sin t) - t;$
☐ $x_1 = e^t((c_1 + 3) \sin t + c_2 \cos t), \quad x_2 = e^t((c_1 + 2) \cos t + (c_2 - 3c_1) \sin t);$
☐ $x_1 = e^t(c_1 \sin t - c_2 \cos t) + 1, \quad x_2 = e^t((c_1 + 3c_2) \cos t + (c_2 - 3c_1) \sin t) - 2.$

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 5.0

Відмітити питання

Завдання F

Завдання вимагає повного письмового розв'язку з малюнками фазових портретів

Опишіть фазовий портрет динамічної системи

$$\begin{cases} \dot{x} = (x-1)(y-2), \\ \dot{y} = (x-3)(y-1). \end{cases}$$

в околах її особливих точок.


1. Динамічна система має дві особливі точки – та (формат відповіді (x,y)).
2. Нехай $u = (u_1, u_2)$ – нові координати в околі особливої точки, а $\dot{u} = Au$ – лінеаризація динамічної системи в околі цієї точки. Серед матриць

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

лише та матриці є лінеаризаціями нашої динамічної системи в околі станів рівноваги.

3. Знайдіть власні значення і власні вектори матриць лінеаризацій.
4. Намалюйте фазові портрети в околі кожної точки рівноваги. Один зі станів рівноваги – , а інший – .

Типова динаміка системи в околі цих станів зображена на малюнках та відповідно.



Питання 1

Завершено

Балів 1,4 з 2,0

Відмітити питання

- Рівність вигляду $F(t, x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(n)}) = 0$, в якій функція F – відома, функція x – шукана та t – незалежна змінна, називаємо звичайним диференціальним рівнянням, якщо
 - ☐ функція x ефективно залежить від часу t ;
 - ☐ функція F не залежить від x ;
 - ☒ функція F ефективно залежить від якоїсь з похідних шуканої функції;
 - ☐ функція F ефективно залежить від найстаршої похідної шуканої функції.
- Яка з рівностей є диференціальним рівнянням?
 - ☐ $x^n(t) = x(t) + 1$
 - ☐ $\dot{x}(t) = \int_0^t s x(s) ds$
 - ☐ $\sin^2 \dot{x}(t) + x(t) = t^2 + \cos^2 \dot{x}(t)$
 - ☐ $\sin^2 \dot{x}(t) + x(t) = t^2 - \cos^2 \dot{x}(t)$
 - ☒ $\ddot{x}(t) = x(t - 1)$.

Питання 2

Завершено

Балів 1,6 з 2,0

Відмітити питання

- Порядком звичайного диференціального рівняння $F(t, x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(n)}) = 0$ називаємо
 - ☐ найменший порядок похідної шуканої функції, яка ефективно входить у рівняння;
 - ☒ число n , якщо похідна $x^{(n)}$ ефективно входить у рівняння;
 - ☐ найвищий степінь незалежної змінної, який містить рівняння;
 - ☐ суму порядків похідних шуканої функції.
- Який порядок мають диференціальні рівняння?
 - $(\ddot{x} - \dot{x})^2 = \ddot{x}^2 - 2\dot{x}\ddot{x} + t\ddot{x}$ другий
 - $(\ddot{x} + \dot{x})^2 = \ddot{x}^2 - 2\dot{x}\ddot{x} + t\ddot{x}$ другий
 - $(\ddot{x} + \dot{x})^2 = \ddot{x}^2 + 2\dot{x}\ddot{x} + t\ddot{x}$ третій

Питання 3

Завершено

Бали: 2.0 з 2.0

Відмітити питання

- Якщо неперервно диференційована функція v є потенціалом векторного поля $(m(x, y), n(x, y))$ (потенціалом для пари функцій $m(x, y)$ та $n(x, y)$), то виконується друга умова, серед запропонованих нижче.

$$dm = dn, \quad dv = m dx + n dy, \quad dv = v_x dx + v_y dy, \quad dv = m_y dx + n_x dy.$$

- Диференціальне рівняння вигляду $m(x, y) dx + n(x, y) dy = 0$ називаємо *рівнянням в повних диференціалах*, якщо
 - ☐ виконується умова $m_x = n_y$;
 - ☐ вираз $m(x, y) dx + n(x, y) dy$ є повним диференціалом функції n ;
 - ☐ вираз $m(x, y) dx + n(x, y) dy$ є повним диференціалом функції m ;
 - ☒ існує потенціал для пари функцій $m(x, y)$ та $n(x, y)$.
- Рівняння $m(x, y) dx + n(x, y) dy = 0$ буде рівнянням в повних диференціалах в деякому прямокутнику, тоді і лише тоді, коли в цьому прямокутнику виконується умова
 - ☐ $m_x = n_y$
 - ☒ $m_y = n_x$
 - ☐ $m_x = n_x$
 - ☐ $m_y = n_y$.
- Яке з диференціальних рівнянь є рівнянням в повних диференціалах?
 - ☐ $(e^y - e^x) dx + (e^x + e^y) dy = 0$;
 - ☐ $(e^y + 2xy) dx = (e^x + y^2) dy$;
 - ☒ $(e^x + 2xy) dx + (e^y + x^2) dy = 0$;
 - ☐ $(y - x)e^y dx = (x + y)e^x dy$.

Питання 4

Завершено

Балів 1,0 з 2,0

Відмітити питання

- Функцію $g = g(x, y)$ називаємо *однорідною степеня однорідності s* , якщо

- ☐ $g(\alpha x, \alpha y) = sg(x, y)$ для усіх x, y та $s > 0$;
- ☒ $g(\alpha x, \alpha y) = \alpha^s g(x, y)$ для усіх x, y та $\alpha > 0$;
- ☐ $g(\alpha x, \alpha y) = s^\alpha g(x, y)$ для усіх x, y та $\alpha > 0$.

- Якого степеня однорідності є функції?

$$f(t, x) = \frac{3x^2 - 2t^2}{5t^3} \quad 2 \quad \text{v}$$

$$f(t, x) = \ln x^3 - 3 \ln t + 1 \quad 0 \quad \text{v}$$

$$f(t, x) = \frac{2x - 3t}{tx^2} \quad -2 \quad \text{v}$$

- Диференціальне рівняння першого порядку $y' = f(x, y)$ називаємо *однорідним рівнянням*, якщо

- ☐ f є однорідною функцією додатного степеня однорідності;
- ☒ f є однорідною функцією степеня однорідності 0;
- ☐ f є однорідною функцією.

- В кожній з півплощин $x > 0$ та $x < 0$ однорідне диференціальне рівняння за допомогою заміни змінних $u = bx$ зводиться до рівняння $\text{рівняння із відокремленими змінними}$.

- Яке з диференціальних рівнянь є однорідним?

- ☐ $y' + \ln x^2 = y$
- ☐ $y' = x^2 \ln y^2 - x^2$
- ☐ $y' = y - y^2 \ln x$
- ☒ $xy' = y(\ln x - \ln y)$

Питання 5

Завершено

Балів 0,4 з 2,0

🚩 Відмітити питання

- Розв'язок диференціального рівняння $\dot{x} = f(t, x)$ називаємо *глобальним*, якщо
 - ☐ він визначений на усій числовій осі;
 - ☒ він визначений на найширшому інтервалі, поза яким він не існує;
 - ☐ він визначений в околі кожної точки.
- Нехай x - глобальний розв'язок рівняння $\dot{x} = f(t, x)$, визначений на скінченному чи нескінченному інтервалі $I = (a, b)$. Тоді виконується кожна з двох альтернатив
 - або число b – , або число b – і тоді розв'язок x має границю, коли t прямує до .
 - або число a – , або число a – і тоді розв'язок x має границю, коли t прямує до .

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до

2.0

Відмітити питання

- Якщо функція $v = v(t, x)$ – за обома змінними та за змінною x , то задача Коші $x' = v(t, x), \quad x(a) = b$ має розв'язок, який визначений .
- Задача Коші $x' = v(t, x), \quad x(a) = b$ є еквівалентною інтегральному рівнянню
 - ☐ $x(t) = a + \int_b^t v(s, x(s)) ds;$
 - ☐ $x(t) = b + \int_a^t v(s, x(s)) ds;$
 - ☐ $x(t) = b + \int_a^t v(s, x(s)) ds;$
 - ☐ $v(t, x(t)) = b + \int_a^t x(s) ds.$
- Якому з інтегральних рівняння є еквівалентною задача Коші $\dot{z} = \cos z, \quad z(2) = 1$?
 - ☐ $z(t) = 2 + \int_1^t \cos z(s) ds$
 - ☐ $z(t) = 1 + \int_2^t \cos z(s) ds$
 - ☐ $z(t) = 1 - \int_1^2 \cos z(s) ds.$

Питання 7

Завершено

Балів 0,0 з 2,0

🚩 Відмітити
питання

Які з тверджень є правильними для розв'язків лінійного однорідного рівняння

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y + a_n(x)y = 0?$$

Виберіть одну або декілька відповідей:

- ☒ Добуток двох розв'язків цього рівняння є знову його розв'язком.
- ☒ Частка двох розв'язків цього рівняння є знову його розв'язком.
- ☒ Стала функція завжди є його розв'язком.
- ☐ Тотожно нульова функція завжди є його розв'язком.
- ☐ Сума двох розв'язків цього рівняння є знову його розв'язком.
- ☒ Сума розв'язку цього рівняння і довільної сталої є знову його розв'язком.
- ☐ Довільна лінійна комбінація розв'язків є його розв'язком.
- ☐ Добуток довільного розв'язку цього рівняння на число є знову його розв'язком.

Питання 8

Завершено

Балів 0,0 з 2,0

🚩 Відмітити
питанняГеометричною кратністю власного значення λ матриці A називаємо

Виберіть одну відповідь:

- ☐ мінімальну кількість лінійно незалежних власних векторів матриці A .
- ☐ максимальну кількість лінійно незалежних власних векторів матриці A .
- ☐ максимальну кількість лінійно незалежних власних векторів матриці A , що відповідають власному значенню λ .
- ☐ кратність числа λ як кореня визначника матриці A .
- ☒ кратність числа λ як кореня характеристичного визначника $\det(A - \lambda E) = 0$.