

Московский Авиационный институт  
(Национальный исследовательский университет)

**Институт №8**  
**«Информационные технологии и прикладная  
математика»**

**Кафедра 813**  
**«Компьютерная математика»**

**Курсовой проект**  
**по дисциплине**  
**«Математический практикум»**

**Тема:**  
**«Математические вычисления в  
пакете Sage»**

**ВАРИАНТ № 8**

Студент: Грубенко  
Максим Дмитриевич

Группа: М8О-210Б-20

Преподаватели:  
Денисова И. П.  
Гавриш О. Н.  
Ганичева А. К.  
Пасисниченко М. А.

Оценка:

Дата:


Москва, 2021

# Содержание

<b>1</b>	<b>Исследование графиков</b>	<b>3</b>
	Область определения функции . . . . .	3
	Является ли функция четной или нечетной, является ли периодической	3
	Точки пересечения графика с осями координат . . . . .	4
	Промежутки знакопостоянства . . . . .	4
	Промежутки возрастания и убывания . . . . .	4
	Точки экстремума и значения в этих точках . . . . .	4
	Непрерывность. Наличие точек разрыва и их классификация . . . .	5
	Асимптоты. Найти необходимые пределы, построить асимптоты на графике . . . . .	5
<b>2</b>	<b>СЛАУ</b>	<b>6</b>
	Метод Крамера . . . . .	6
	Метод Гаусса . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Матрицы — Матричные уравнения</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Решение алгебраических уравнений третьей степени</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Решение алгебраических уравнений четвертой степени</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>НОД двух полиномов</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Линейные преобразования и характеристическое уравнение матрицы</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Упрощение уравнений фигур 2-го порядка в пространстве</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Численные методы — Интегралы</b>	<b>17</b>
	Метод прямоугольников . . . . .	17
	Метод трапеций . . . . .	18
<b>10</b>	<b>Численные методы — Метод касательных</b>	<b>19</b>
<b>11</b>	<b>Линейный оператор и базисы</b>	<b>21</b>
<b>12</b>	<b>Список литературы</b>	<b>22</b>

# 1 Исследование графиков

Дана функция  $f(x) = \sin(2 * x^3)/x^3 + x$ .



## Область определения функции

Область определения функции —  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \neq 0$  т.к. функция содержит в знаменателе  $x^3$ .

$$f(x) : D(f(x)) = (-\infty; +\infty) / 0$$

## Является ли функция четной или нечетной, является ли периодической

Функция  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  называется чётной, если справедливо равенство:

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in X$$

Функция называется нечётной, если справедливо равенство:

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in X$$

функция называется периодической с периодом  $T \neq 0$ , если для каждой точки  $x$  из её области определения точки  $x + T$  и  $x - T$  также принадлежат её области определения, и для них выполняется равенство  $f(x) = f(x + T) = f(x - T)$ .

Данная функция является нечетной и не является периодической.

## Точки пересечения графика с осями координат

По области определения функции  $x \neq 0$  значит функция никогда не пересекает ось ординат. Найдём точки пересечения графика функции  $f(x)$  с осью абсцисс. Для этого решим уравнение:  $\sin(2 * x^3)^2 / x^3 + x = 0$ . Функция никогда не пересекает ось абсцисс.


## Промежутки знакопостоянства

График функции никогда не пересекает ось абсцисс, но есть точка разрыва  $x = 0$ . При  $x > 0$  значение функции в любой точке положительное, а при  $x < 0$  — отрицательное.

## Промежутки возрастания и убывания

## Точки экстремума и значения в этих точках

График производной функции:



## Непрерывность. Наличие точек разрыва и их классификация

Если в точке имеются конечные пределы, но они не равны  $f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0)$ , то  $x_0$  называется точкой разрыва первого рода.

Точками разрыва второго рода называются точки, в которых хотя бы один из односторонних пределов равен  $\infty$  или не существует.


Данная функция имеет точку разрыва первого рода при  $x = 0$

## Асимптоты. Найти необходимые пределы, построить асимптоты на графике

Вертикальные асимптоты проходят через точки разрыва (когда предел функции в этой точке стремится к бесконечности).

Горизонтальные асимптоты проходят через точку с координатой  $y$ , которая является пределом функции при устремлении аргумента функции к бесконечности.

Наклонные асимптоты задаются графиком прямой  $kx + b$ , где  $k$  за наклон будет отвечать предел отношения функции к аргументу, где последний стремится к бесконечности. За смещение отвечает предел функции  $f(x) - kx$ , где  $x$  стремится к бесконечности.



## 2 СЛАУ

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 5x_2 - 4x_3 = -5, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -4, \end{cases}$$

### Метод Крамера

Решим данную систему методом Крамера. Получаем матрицу коэффициентов

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \text{ и столбец свободных членов } B = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}. D = \det(A) =$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 5 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -2. D \neq 0, \text{ следовательно система уравнений имеет решение.}$$

В определителях столбец коэффициентов при соответствующей неизвестной заменяется столбцом свободных членов системы.

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -5 & 5 & -4 \\ -4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -10, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -5 & -4 \\ 4 & -4 & -3 \end{vmatrix} = -12, D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & -5 \\ 4 & 1 & -4 \end{vmatrix} =$$

-20.

Найдем  $x_1 = D_1/D = 5$ ,  $x_2 = D_2/D = 6$ ,  $x_3 = D_3/D = 10$ .

### Метод Гаусса

Сначала необходимо проверить совместность системы по теореме Кронекера-Капелли. Для того чтобы линейная система являлась совместной, необходимо и достаточно, чтобы ранг расширенной матрицы этой системы был равен рангу её основной матрицы. Система уравнений разрешима тогда и только тогда, когда  $\text{rank } A = \text{rank}(A|B)$ , где  $(A|B)$  — расширенная матрица, полученная из матрицы  $A$  приписыванием столбца  $B$ .

Ранг матрицы коэффициентов  $\text{rank } A = 3$ .

Ранг расширенной матрицы  $\text{rank}(A|B) = 3$ .

Ранги матриц равны следовательно система совместна.

Далее необходимо привести матрицу к диагональному виду  $\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & -4 & -5 \\ 4 & 1 & -3 & -4 \end{array} \right)$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & -7/2 & 5/2 & 4 \\ 0 & 0 & 1/7 & 10/7 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{c} 5 \\ 6 \\ 10 \end{array} \right).$$

### 3 Матрицы — Матричные уравнения

Дано уравнение:

$$1/2 * X * \begin{pmatrix} -2 & 4 & -6 \\ -1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}^T - 3 * E = 1/4 * \begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ -2 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2$$

Решение уравнения сводится к двум вариантам умножения:

$$A * X = B$$

$$A^{-1} * A * X = A^{-1} * B$$

$$X = A^{-1} * B$$

$$X * A = B$$

$$X * A * A^{-1} = B * A^{-1}$$

$$X = B * A^{-1}$$

$$X * \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 8 & 5 \\ -1 & 0 & \frac{11}{2} \\ 1 & 2 & \frac{13}{4} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{21}{4} & \frac{81}{16} & \frac{43}{13} \\ \frac{13}{10} & \frac{9}{8} & \frac{20}{57} \\ -\frac{23}{20} & \frac{33}{16} & \frac{40}{40} \end{pmatrix}$$

## 4 Решение алгебраических уравнений третьей степени

Любое кубическое уравнение общего вида  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  при помощи замены переменной  $x = y - \frac{b}{3a}$  может быть приведено к указанной выше канонической форме с коэффициентами

$$p = \frac{c}{a} - \frac{b^2}{3a^2} = \frac{3ac - b^2}{3a^2},$$

$$q = \frac{2b^3}{27a^3} - \frac{bc}{3a^2} + \frac{d}{a} = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3}.$$

$$Q = \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2.$$

Если все коэффициенты кубического уравнения вещественны, то и  $Q$  вещественно и по его знаку можно определить тип корней:

$Q > 0$  — один вещественный корень и два сопряжённых комплексных корня.

$Q = 0$  — один однократный вещественный корень и один двукратный, или, если  $p = q = 0$ , то один трёхкратный вещественный корень.

$Q < 0$  — три вещественных корня.

По формуле Кардано, корни кубического уравнения в канонической форме равны:

$$y_1 = \alpha + \beta,$$

$$y_{2,3} = -\frac{\alpha + \beta}{2} \pm i \frac{\alpha - \beta}{2} \sqrt{3}, \text{ где}$$

$$\alpha = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{Q}},$$

$$\beta = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{Q}},$$

Дискриминант многочлена  $y^3 + py + q$  при этом равен  $\Delta = -108Q$ .

Решим данное уравнение:

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$$

Вычислим коэффициенты:

$$p = -\frac{4}{3}$$

$$q = -\frac{16}{27}$$

$$Q = 0$$

$Q = 0$  — один однократный вещественный корень и один двукратный.

Корни уравнения в алгебраическом, тригонометрическом и экспоненциальном представлениях:

$$x_0 = 3$$

$$x_0 = 3 * \cos(0) + 3 * i * \sin(0)$$


$$x_0 = 3 * e^{0*i}$$

$$x_{1,2} = 1$$

$$x_{1,2} = 1 * \cos(0) + 1 * i * \sin(0)$$

$$x_{1,2} = 1 * e^{0*i}$$





## 5 Решение алгебраических уравнений четвертой степени

Дано уравнение:  $x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 3 = 0$

Метод Феррари состоит из двух этапов.

На первом этапе уравнения вида

$$a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0,$$

где  $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$  - произвольные числа, причем  $a_0 \neq 0$ .

приводятся к уравнениям четвертой степени, у которых отсутствует член с третьей степенью неизвестного.

На втором этапе полученные уравнения решаются при помощи разложения на множители, однако для того, чтобы найти требуемое разложение на множители, приходится решать кубические уравнения, например методом Кардано.

Пусть уравнение имеет вид  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ :

Произведем замену:  $y = x - \frac{a}{4}$ , где  $a$  — коэффициент при переменной в третьей степени уравнения с коэффициентом при старшей степени равным 1.

$y = x - 3/4$ , тогда заданное уравнение имеет вид:

$$y^4 - \frac{59}{8}y^2 + \frac{51}{8}y + \frac{525}{256} = 0.$$

Найдем значение коэффициентов  $p, q, r$  для исходного уравнения, чтобы уравнение приняло вид:  $y^4 + py^3 + qy^2 + ry + r = 0$ :

$$p = b - \frac{3a^2}{8} = -\frac{3}{32}(\sqrt{21} - 3)^2 - 4;$$

$$q = \frac{a^3}{8} - \frac{ab}{2} + c = \frac{1}{64}(\sqrt{21} - 3)^3 + \sqrt{21} - 6;$$

$$r = \frac{-3a^4}{256} + \frac{a^2b}{16} - \frac{ca}{4} + d = -\frac{3}{4096}(\sqrt{21} - 3)^4 - \frac{1}{16}(\sqrt{21} - 3)^2 + \frac{3}{8}\sqrt{21} + \frac{15}{8}.$$

Добавив и вычитая в левой части уравнения выражение  $2sy^2 + s^2$  получим:  
 $-ps^2 + 2s^3 - \frac{1}{4}q^2 + pr - 2rs$

Это выражение называется кубическая резольвента. Найдем хотя бы одно значение  $s$  из уравнения  $2s^3 + \frac{59}{8}s^2 - \frac{525}{128}s - \frac{51783}{2048} = 0$ .

$$s_0 = -\frac{41}{16}$$

Получаем два уравнения из которого вычисляется  $y$ , а затем с помощью обратной замены —  $x$ .


$$y^2 - \frac{3}{2}y - \frac{7}{16} = 0 ; y^2 + \frac{3}{2}y - \frac{75}{16} = 0$$

$$x_0 = 1.000$$

$$x_1 = -1.000$$

$$x_2 = -3.791$$

$$x_3 = 0.7913$$



## 6 НОД двух полиномов

Для полиномов  $f(x)$  и  $g(x)$  по алгоритму Евклида найти наибольший общий делитель (НОД). Представить НОД в виде:  $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$

Алгоритм Евклида (алгоритм последовательного деления) нахождения наибольшего общего делителя многочленов  $a$  и  $b$  :

$r_k$  — это остаток от деления предпредыдущего числа на предыдущее, а предпоследнее делится на последнее нацело, то есть:

$$a = bq_0 + r_1,$$

$$b = r_1q_1 + r_2,$$

$$r_1 = r_2q_2 + r_3,$$

$$\dots$$

$$r_{k-2} = r_{k-1}q_{k-1} + r_k,$$

$$\dots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n,$$

$$r_{n-1} = r_nq_n.$$

Таким образом последний ненулевой остаток является наибольшим общим делителем исходных многочленов  $a$  и  $b$ .

Даны полиномы  $f = x^4 + x^3 - 2x^2 - x - 1$  и  $g = x^3 + x^2 - x - 1$ .

$$\gcd(f, g) = 1$$

По теореме Безу НОД можно представить в виде:  $\gcd(f, g) = f * u + v * g$ :

$$\gcd(f, g) = (x^4 + x^3 - 2x^2 - x - 1) * (-\frac{1}{4}x^3 + x - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}) * (x^3 + x^2 - x - 1) = 1$$

## 7 Линейные преобразования и характеристическое уравнение матрицы

Дано преобразование в базис:  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{cases} e'_0 = e_1 + e_2 + e_3, \\ e'_1 = e_1 + e_2, \\ e'_2 = 2e_2 + e_3, \end{cases}$

Пусть преобразование задаётся матрицей  $A$ . А матрица перехода в другой базис задаётся матрицей  $S$ . Тогда искомая матрица  $A'$  находится по формуле:

$$A' = S^{-1}AS$$

$$\text{Тогда матрица } A' = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Найдем характеристический полином. Он задается формулой:

$$\phi_A(\lambda) = |A - \lambda E|$$

Характеристический полином матриц  $A$  и  $A'$  совпадает и равен:

$$\phi_A = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda$$

Найдем собственные числа  $\phi_A(\lambda) = 0$

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda = 0$$

Отсюда собственные числа равны:


$$\lambda_0 = 1.50 - 0.866i$$

$$\lambda_1 = 1.50 + 0.866i$$

$$\lambda_2 = 0.000$$

## 8 Упрощение уравнений фигур 2-го порядка в пространстве

Дана функции  $u(x, y, z) = -6xy + 4xz + 3z^2 - x - y + z - 10$



Составим матрицу  $A$  этой квадратичной формы и столбец коэффициентов линейной формы:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ -3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} & 8 & 5 \\ -1 & 0 & \frac{11}{2} \\ 1 & 2 & \frac{13}{4} \end{pmatrix}$$

Найдем собственные числа матрицы  $A$ . Характеристический полином:

$$\phi_A = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 13\lambda + 27$$

Корни характеристического полинома — собственные числа матрицы  $A$ :

$$\lambda_0 = -3.332, \lambda_1 = 1.780, \lambda_2 = 4.553$$

Найдем взаимно перпендикулярные единичные собственные векторы  $s_1, s_2, s_3$ , соответствующие собственным числам, и составим из них матрицу  $S = (s_1|s_2|s_3)$ . Так как все собственные числа простые, поэтому для каждого корня найдем ненулевое решение однородной СЛАУ  $(A - \lambda_i E)l_i = 0$ , для каждого  $i = 0, 1, 2$ .

$$\begin{aligned}v_0 &= (1.000, 0.9003, -0.3158); \\v_1 &= (1.000, -1.686, -1.639); \\v_2 &= (1.000, -0.6589, 1.288).\end{aligned}$$

Нормируем векторы. Чтобы нормировать вектор, разделим координаты вектора на его модуль.

$$\begin{aligned}v_0 &= (0.7235, 0.6514, -0.2285); \\v_1 &= (0.3914, -0.6598, -0.6414); \\v_2 &= (0.5686, -0.3747, 0.7323).\end{aligned}$$

Составим матрицу из векторов для перехода к новому базису:

$$S = \begin{pmatrix} 0.7235 & 0.6514 & -0.2285 \\ 0.3914 & -0.6598 & -0.6414 \\ 0.5686 & -0.3747 & 0.7323 \end{pmatrix}$$

Вычислить столбец коэффициентов линейной формы  $a' = S^T a$

$$a' = \begin{pmatrix} -0.2732 \\ -0.1831 \\ 0.8012 \end{pmatrix}$$

Составим уравнение «почти» канонического вида:

$$f(x, y, z) = \lambda_0(x)^2 + \lambda_1(y)^2 + \lambda_2(z)^2 + 2a'_0x + 2a'_1y + 2a'_2z + a.$$

$$u(x, y, z) = -3.332x^2 + 1.780y^2 + 4.553z^2 - 0.5463x - 0.3662y + 1.602z - 10.$$


Дополним до полного квадрата линейные и квадратичные члены, перенесем вправо свободные члены и разделим все уравнение на правую часть, чтобы справа оставалась 1:

$$\begin{aligned}\lambda_0(x + \frac{a'_0}{\lambda_0})^2 + \lambda_1(y + \frac{a'_1}{\lambda_1})^2 + \lambda_2(z + \frac{a'_2}{\lambda_2})^2 &= \frac{(a'_0)^2}{\lambda_0} + \frac{(a'_1)^2}{\lambda_1} + \frac{(a'_2)^2}{\lambda_2} - a \\ -0.3287(x + 0.08197)^2 + 0.1755(y - 0.1029)^2 + 0.4491(z + 0.1760)^2 &= 10.14 \\ -0.3287(x + 0.08197)^2 + 0.1755(y - 0.1029)^2 + 0.4491(z + 0.1760)^2 &= 1\end{aligned}$$

Теперь заменим значения в скобках на соответствующие переменные  $X, Y, Z$ . Получим канонический вид заданного уравнения фигуры второго порядка:

$$-0.3287 X^2 + 0.1755 Y^2 + 0.4491 Z^2 = 1$$

Фигура, построенная по каноническому уравнению:






## 9 Численные методы — Интегралы

Найти площадь закрашенной фигуры методом трапеций и прямоугольников. Площадь численно равна интегралу:





$$\int_0^e \frac{8x - \arctan(2x)}{4x^2 + 1} dx.$$



### Метод прямоугольников

Отрезок интегрирования разбивается на равные части отрезки длины:  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ . Данная величина называется шагом разбиения. С помощью шага разбиения можно регулировать точность вычисления интеграла. В результате получим точки:  $x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} = b$ . Тогда значение интеграла будет суммой площадей всех маленьких прямоугольников:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x_n$$



Значение интеграла полученное методом прямоугольников с шагом разбиения 0.10.


$$\int_0^e \frac{8x - \arctan(2x)}{4x^2 + 1} dx = 2.95340840823963.$$

## Метод трапеций

Отрезок интегрирования разбивается на равные части отрезки длины:  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ .

Численно интеграл будет равен сумме площадей маленьких прямоугольных трапеций:

$$\sum_{i=1}^n \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \cdot \Delta x_i$$



Значение интеграла полученное методом трапеций с шагом разбиения 0.30.

$$\int_0^e \frac{8x - \arctan(2x)}{4x^2 + 1} dx = 3.06880051479486.$$

Результат, полученный встроенными средствами Sage:

$$\int_0^e \frac{8x - \arctan(2x)}{4x^2 + 1} dx = 2.937314588264436.$$

## 10 Численные методы — Метод касательных

Метод касательных (метод Ньютона) предназначен для приближенного нахождения нулей функции.

Чтобы численно решить уравнение  $f(x) = 0$  методом простой итерации, его необходимо привести к эквивалентному уравнению:  $x = \varphi(x)$ , где  $\varphi$  — сжимающее отображение.

Для наилучшей сходимости метода в точке очередного приближения  $x^*$  должно выполняться условие  $\varphi'(x^*) = 0$ . Решение данного уравнения ищут в виде  $\varphi(x) = x + \alpha(x)f(x)$ , тогда:

$$\varphi'(x^*) = 1 + \alpha'(x^*)f(x^*) + \alpha(x^*)f'(x^*) = 0.$$

В предположении, что точка приближения «достаточно близка» к корню  $\tilde{x}$  и что заданная функция непрерывна ( $f(x^*) \approx f(\tilde{x}) = 0$ ), окончательная формула для  $\alpha(x)$  такова:


$$\alpha(x) = -\frac{1}{f'(x)}.$$

С учётом этого функция  $\varphi(x)$  определяется:


$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

При некоторых условиях эта функция в окрестности корня осуществляет сжимающее отображение.

Дана функция  $f(x) = \frac{x^2 + 3 \cos(\frac{1}{2}x^2) - 1}{3x} - \frac{1}{3}$ . Вычислить с помощью метода Ньютона корни соответствующего уравнения.



Запустим два раза метод Ньютона для двух окрестностей. Первая точка будет  $x = 2$ , а вторая  $x = 2.5$ . Приблизительно получили  $x_1 = 1.90503$ ,  $x_2 = 2.55589$



## 11 Линейный оператор и базисы

## 12 Список литературы

1. «Справочник по математике» Корн Г., Корн Т., 1973
2. [sagemath.org](http://sagemath.org)
3. <https://www.wolframalpha.com/input/?i=e%5Ex+%3D+x>
4. <http://doc.sagemath.org/html/ru/tutorial/tour.html>
5. <http://window.edu.ru/resource/872/25872/files/volsu456.pdf>
6. «Справочник по высшей математике» А.А.Гусак, 1999г.
7. «Справочник по высшей математике» А.С.Киркинский, 2006г.
8. «Аналитическая геометрия в примерах и задачах» Бортаковский, 2005г
9. А.С.Бортаковский, Е.А. Пегачкова «Типовые задачи по аналитической геометрии» с 65
10. «Киркинский А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учебное пособие.» - М: Академический Проект, 2006.