# ADHD-синдром у взрослых – Скринер со шкалой самооценки V1.1 (ASRS-V1.1)

# Есть ли у вас ADHD-синдромом у взрослых?
## Приведенные ниже вопросы помогут вам решить.

Многие люди болеют гиперактивным расстройством внимания (ADHD-синдромом у взрослых), даже не подозревая об этом. Почему? Это происходит потому, что его симптомы часто принимают за признаки стресса. Если на протяжении большей части вашей жизни у вас проявляются такие симптомы, то, возможно, вы страдаете ADHD-синдромом у взрослых – болезнью, которая поддается диагностированию и лечению.

Приведенная ниже анкета, для начала, может помочь вам распознать признаки и (или) симптомы ADHD-синдрома у взрослых, но не заменит консультацию специально обученного профессионального медицинского работника. **Точный диагноз можно поставить только после клинического обследования.** Независимо от ответов на вопросы анкеты, если вас что-то беспокоит в связи с диагнозом и лечением ADHD-синдрома у взрослых, обсудите это с вашим врачом.

**Этот скринер со шкалой самооценки V1.1 (ASRS-V1.1) предназначен для людей в возрасте от 18 лет.**

## синдром у взрослых – Скринер со шкалой самооценк (ASRS-V1.1)

**Дата**

| *Отметьте клетку с ответом, который лучше всего описывает ваше самочувствие и поведение за последние 6 месяцев. Чтобы обсудить результаты, передайте, пожалуйста, заполненную анкету обслуживающему вас профессиональному медицинскому работнику во время следующего визита к нему.* | Никогда | Редко | Иногда | Часто | Очень часто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Как часто вам бывает трудно закончить работу после того как самое трудное уже сделано? | | | | | |
| 2. Как часто вам бывает трудно навести порядок перед выполнением работы, требующей организованности? | | | | | |
| 3. Как часто у вас возникают трудности с запоминанием времени встреч или своих обязанностей? | | | | | |
| 4. Как часто вы избегаете или откладываете начало работы, требующей больших умственных усилий? | | | | | |
| 5. Как часто вы беспокойно перебираете руками или ногами, когда приходится долго сидеть на одном месте? | | | | | |
| 6. Как часто вы испытываете чрезмерную активность и непреодолимое желание что-то сделать, как если бы у вас внутри был мотор? | | | | | |

*Подсчитайте количество отметок, сделанных в темной заштрихованной части графика. Четыре (4) или большее количество таких отметок свидетельствует о том, что ваши симптомы, возможно, совпадают с симптомами ADHD-синдрома у взрослых. Теперь может оказаться полезным поговорить с обслуживающим вас профессиональным медицинским работником об оценке этих результатов.*

# Полезность скрининга для взрослых пациентов с ADHD-синдромом

Исследования показали, что симптомы ADHD-синдрома могут сохраниться у взрослых людей и оказывать существенное влияние на их взаимоотношения с другими людьми, карьеру и даже личную безопасность[1-4]. Поскольку эту болезнь зачастую неправильно понимают, многие пациенты не получают надлежащего лечения и вследствие этого не могут полностью реализовать свои возможности. Проблема отчасти связана с трудностью диагностирования, особенно у взрослых людей.

Шкала самооценки ADHD-синдрома у взрослых (ASRS v1.1) и система подсчета баллов были разработаны в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Рабочей группой по взрослому ADHD-синдрому, в состав которой входили следующие психиатры и исследователи:

Леонард Адлер, доктор медицины,
адъюнкт-профессор психиатрии и неврологии,
New York University Medical School

Рональд Кесслер, доктор философии,
профессор, отдел политики здравоохранения,
Harvard Medical School

Томас Спенсер, доктор медицины,
адъюнкт-профессор психиатрии,
Harvard Medical School

Как профессиональный медицинский работник вы можете использовать ASRS v1.1 в качестве инструмента для скрининга взрослых пациентов, страдающих ADHD-синдромом. Результаты скрининга могут свидетельствовать о необходимости более глубокого клинического обследования. Вопросы из анкеты ASRS v1.1 согласуются с критериями DSM-IV и касаются проявлений симптомов ADHD-синдрома у взрослых. Содержание анкеты отражает также ту роль, которая отведена в DSM-IV симптомам, нарушениям и истории болезни для постановки правильного диагноза.

Заполнение анкеты скрининга занимает менее пяти минут, и такая анкета может дать дополнительную информацию, играющую критически важную роль в процессе диагностирования.

Библиография:

1. Schweitzer, J.B., Cummins, T.K., Kant, C.A. Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Med Clin North Am*. 2001;85(3):10-11, 757-777.
2. Barkley, R.A. *Attention deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment (2nd ed.)*. 1998.
3. Biederman, J., Faraone, S.V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, K. A, et al. Patterns of psychiatric comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with ADHD. *Am J Psychiatry*. 1993:150:1792-1798.
4. American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision)*. Washington, DC. 2000:85-93.