

GATE-CS.51

EE23BTECH11046 - Poluri Hemanth*

Question: Consider the following recurrence:

$$f(1) = 1; \quad (1)$$

$$f(2n) = 2f(n) - 1, \text{ for } n \geq 1; \quad (2)$$

$$f(2n+1) = 2f(n) + 1, \text{ for } n \geq 1. \quad (3)$$

Hence $x(2^n) = 1$ for every $n \geq 0$ value.
So statement B is TRUE.

(C)

Let, $x(5 \cdot 2^k) = 2^{k+1} + 1$ be true for any $k \geq 0$,

$$x(5 \cdot 2^{k+1}) = x(2(5 \cdot 2^k)) \quad (15)$$

From (2)

$$= 2x(5 \cdot 2^k) - 1 \quad (16)$$

$$= 2^{k+2} + 1 \quad (17)$$

$k = -1$,From (17)

$$x(5) = 2^1 + 1 \quad (18)$$

$$= 3 \quad (19)$$

Proof:-

$$x(5) = x(2 \cdot 2 + 1) \quad (20)$$

From (3),(14)

$$= 2x(2) + 1 \quad (21)$$

$$= 3 \quad (22)$$

Hence $x(5 \cdot 2^n) = 2^{n+1} + 1$ for $n \geq 1$

So statement C is TRUE.

(D)

$$x(2^n + 1) = x(2 \cdot 2^{n-1} + 1) \quad (23)$$

From (3),(14)

$$= 2x(2^{n-1}) + 1 \quad (24)$$

$$= 3 \quad (25)$$

Hence statement D is FALSE.

Then, which of the following is/are **TRUE**?

(A) $f(2^n - 1) = 2^n - 1$

(B) $f(2^n) = 1$

(C) $f(5 \cdot 2^n) = 2^{n+1} + 1$

(D) $f(2^n + 1) = 2^n + 1$

[GATE-CS.51 2022]

Solution:

(A)

let $x(2^k - 1) = 2^k - 1$ for any $k \geq 1$,

$$x(2^{k+1} - 1) = x(2(2^k - 1) + 1) \quad (4)$$

From (3),

$$= 2x(2^k - 1) + 1 \quad (5)$$

$$= 2(2^k - 1) + 1 \quad (6)$$

$$= 2^{k+1} - 1 \quad (7)$$

From (1),(7)

$$x(2 - 1) = 2 - 1 \quad (k = 0) \quad (8)$$

$$= 1 \quad (9)$$

Hence $x(2^n - 1) = 2^n - 1$ for $n \geq 1$

So statement A is TRUE

(B)

Let $x(2^k) = 1$ for any $k \geq 0$

$$x(2^{k+1}) = x(2 \cdot 2^k) \quad (10)$$

From (2)

$$= 2x(2^k) - 1 \quad (11)$$

$$= 1 \quad (12)$$

From (11),(2)

$$x(2) = 2x(1) - 1 \quad (13)$$

$$= 1 \quad (14)$$




Fig. 1. plot of $x(n)$