Вопрос 18. Линейная и логистическая регрессии

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация 1

2 Линейная модель и оценка наименьших квадратов 2

3 Статистические свойства оценки МНК 3

4 Численная сторона МНК 5

5 Регуляризация: гребень и лассо 7

6 Обучение регрессий первыми методами 8

7 Логистическая регрессия 9

8 Метрики качества бинарной классификации 11

9 Разобранные задачи 12

10 Вопросы, которые стоит ожидать 13

11 Источники 13

1 Постановка и мотивация

Регрессия отвечает на главный вопрос математического моделирования: по наблюдениям зависимой величины y от факторов x восстановить функциональную связь и использовать её для прогноза. Когда о связи известно только то, что она приблизительно линейна, модель записывается как

$$y_i = a_i^{\mathsf{T}}\theta + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \dots, m,$$

где $a_i \in \mathbb{R}^n$ — известный вектор факторов i-го наблюдения (первая компонента равна 1, если в модели есть свободный член), $\theta \in \mathbb{R}^n$ — неизвестный вектор параметров, ε_i — ошибка модели и измерения. Вопрос развивает два сюжета: оценка наименьших квадратов для непрерывного отклика и логистическая регрессия (англ. *logistic regression*) для бинарного.

Метод наименьших квадратов (МНК, англ. *least squares*) — проекция вектора наблюдений на линейную оболочку столбцов матрицы плана: это ортогональная проекция в смысле вопроса 09 (теория Рисса). При шумных данных постановка становится плохо обусловленной и требует регуляризации — её теория дана в вопросе 02 (регуляризация Тихонова = гребневая регрессия); здесь та же конструкция получается с оценочной стороны. Логистическая регрессия переводит линейную модель на бинарный отклик через вероятность и обучается уже не явной формулой, а методами минимизации из вопроса 10.

Обозначения. m — число наблюдений, n — число параметров ($m \geq n$), матрица плана $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ имеет строки a_i^{T}. Сингулярные числа A: $d_1 \geq \ldots \geq d_n \geq 0$ (обозначение как в [вопросе 02](../02-ml-inverse-problems/), где буква σ занята дисперсией шума). Дисперсия шума — σ^2. Сигмоида: $s(z) = 1/(1+e^{-z})$. Оценки обозначаются $\hat{\theta}$, невязка МНК $r = y - A\hat{\theta}$.

2 Линейная модель и оценка наименьших квадратов

Определение 2.1 (линейная регрессионная модель)**.** Наблюдения y_i порождаются моделью

$$y_i = a_i^{\mathsf{T}}\theta + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

где $\theta \in \mathbb{R}^n$ неизвестно, ошибки ε_i — случайные величины. Матричная запись: $y = A\theta + \varepsilon$.

Определение 2.2 (оценка МНК)**.** Оценкой наименьших квадратов называется любой вектор

$$\hat{\theta} \in \arg\min_{\theta \in \mathbb{R}^n} Q(\theta), \qquad Q(\theta) = \|A\theta - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} (a_i^{\mathsf{T}}\theta - y_i)^2.$$

Величина $Q(\hat{\theta})$ — остаточная сумма квадратов (RSS).

Условия минимума называются нормальными уравнениями (англ. *normal equations*).

Теорема 2.3 (нормальные уравнения)**.** *Вектор $\hat{\theta}$ минимизирует Q тогда и только тогда, когда*

$$A^{\mathsf{T}}(A\hat{\theta} - y) = 0.$$

Если $\operatorname{rank} A = n$*, то решение единственно и имеет вид*

$$\hat{\theta} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}y.$$

Доказательство. Для любых $\theta, z \in \mathbb{R}^n$ и $t \in \mathbb{R}$ по разности квадратов

$$\|A(\theta + tz) - y\|_2^2 = \|A\theta - y\|_2^2 + 2t\, z^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}(A\theta - y) + t^2\|Az\|_2^2. \tag{1}$$

Необходимость. Пусть $\hat{\theta}$ — минимум, но $w := A^{\mathsf{T}}(A\hat{\theta} - y) \neq 0$. Возьмём в (1) $\theta = \hat{\theta}$, $z = -w$ и малый $t > 0$: линейный член $2t\|w\|_2^2$ отрицателен, квадратичный $t^2\|Aw\|_2^2 = o(t)$, значит при малых t правая часть меньше $Q(\hat{\theta})$ — противоречие.

Достаточность. Если $A^{\mathsf{T}}(A\hat{\theta} - y) = 0$, то в (1) линейный член обнуляется при любом z, и $\|A(\hat{\theta} + z) - y\|_2^2 = Q(\hat{\theta}) + \|Az\|_2^2 \geq Q(\hat{\theta})$.

Единственность при полном ранге. Матрица $A^{\mathsf{T}}A$ симметрична и положительно определена: для $z \neq 0$ имеем $z^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}Az = \|Az\|_2^2 > 0$, так как $\operatorname{rank} A = n$ означает $\ker A = \{0\}$. Значит $A^{\mathsf{T}}A$ обратима, и нормальные уравнения дают единственное решение $(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}y$. □

Замечание 2.4 (геометрия). Условие $A^{\mathsf{T}}(A\hat{\theta} - y) = 0$ означает ортогональность невязки $r = y - A\hat{\theta}$ всем столбцам A, то есть всему $\operatorname{range}(A)$. Прогноз $\hat{y} = A\hat{\theta}$ — ортогональная проекция y на подпространство $\operatorname{range}(A)$: задача МНК есть задача о наилучшем приближении в гильбертовом пространстве $\mathbb{R}^m$ (вопрос 09). При $\operatorname{rank} A = n$ проектор записывается как

$$P_A = A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}, \qquad \hat{y} = P_A y, \qquad r = (I - P_A)y,$$

причём $P_A^{\mathsf{T}} = P_A$, $P_A^2 = P_A$, $\operatorname{tr} P_A = n$ (след равен рангу проектора: в ортонормированном базисе $\operatorname{range}(A)$ дополненного до полного, $P_A = \operatorname{diag}(I_n, 0)$).

Теорема 2.5 (существование и минимальная норма при неполном ранге)**.** *Множество решений задачи МНК непусто, выпукло и замкнуто. Среди решений есть единственное решение минимальной евклидовой нормы; если $d_r > 0 = d_{r+1}$ и $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$ — сингулярное разложение, то*

$$\hat{\theta} = \sum_{j=1}^{r} \frac{u_j^{\mathsf{T}} y}{d_j}\, v_j,$$

где u_j, v_j — столбцы U, V.

Доказательство. Непустота и замкнутость очевидны (минимум непрерывной функции на $\mathbb{R}^n$). Выпуклость: если $Q(\theta_1) = Q(\theta_2) = \min Q$, то для $\theta = (\theta_1 + \theta_2)/2$ параллелограммное тождество

$$Q(\theta) = \tfrac{1}{2}Q(\theta_1) + \tfrac{1}{2}Q(\theta_2) - \tfrac{1}{4}\|A(\theta_1 - \theta_2)\|_2^2 \le \min Q,$$

значит $\|A(\theta_1 - \theta_2)\|_2 = 0$; тогда по (1) линейный член обнуляется ($A(\theta_1 - \theta_2) \perp$ невязке) и Q постоянна на отрезке $[\theta_1, \theta_2]$, то есть любая его точка — решение.

Существование и единственность минимума нормы: замкнутое выпуклое множество решений непусто, на нём непрерывная функция $\|\theta\|_2^2$ достигает минимума, а он единствен в силу строгой выпуклости нормы: при $\theta_1 \neq \theta_2$ $\|(\theta_1 + \theta_2)/2\|_2^2 < (\|\theta_1\|_2^2 + \|\theta_2\|_2^2)/2$.

Вывод формулы. Ортогональные преобразования сохраняют 2-норму; с подстановкой $\alpha = V^{\mathsf{T}}\theta$ (столбцы V ортонормированы)

$$Q(\theta) = \|\Sigma\alpha - U^{\mathsf{T}} y\|_2^2 = \sum_{j=1}^{r} \bigl(d_j\alpha_j - u_j^{\mathsf{T}} y\bigr)^2 + \sum_{j=r+1}^{m} (u_j^{\mathsf{T}} y)^2.$$

Первые r слагаемых обращаются в нуль при $\alpha_j = u_j^{\mathsf{T}} y / d_j$ (и только так), последние от θ не зависят. Норма $\|\theta\|_2^2 = \|\alpha\|_2^2$ минимальна при $\alpha_{r+1} = \dots = \alpha_n = 0$, что и даёт формулу. □

Определение 2.6 (псевдообратная матрица)**.** Псевдообратной Мура—Пенроуза (англ. *Moore—Penrose pseudoinverse*) матрицы $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$ называется $A^{+} = V\Sigma^{+}U^{\mathsf{T}}$, где Σ^{+} получается из Σ транспонированием и заменой положительных сингулярных чисел обратными. Решение минимальной нормы задачи МНК есть $A^{+}y$; при полном ранге столбцов $A^{+} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}$.

3 Статистические свойства оценки МНК

Далее фиксируем стандартные посылки.

Обозначения (посылки (G)). (G1) $y = A\theta + \varepsilon$ при детерминированной матрице A полного ранга ($\operatorname{rank} A = n < m$); (G2) $\mathsf{E}\varepsilon = 0$; (G3) $\mathsf{D}\varepsilon = \sigma^2 I_m$ (ошибки некоррелированы и одинаково дисперсны). Нормальность ошибок пока не предполагается.

Теорема 3.1 (несмещённость и ковариация)**.** *При посылках (G) $\mathsf{E}\hat{\theta} = \theta$ и $\mathsf{D}\hat{\theta} = \sigma^2(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}$.*

Доказательство. Оценка линейна по y: $\hat{\theta} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}y = \theta + (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}\varepsilon$, откуда $\mathsf{E}\hat{\theta} = \theta$. Для ковариации линейного преобразования $\mathsf{D}(M\varepsilon) = M(\mathsf{D}\varepsilon)M^{\mathsf{T}}$ при $M = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}$ получаем $\mathsf{D}\hat{\theta} = \sigma^2(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}A(A^{\mathsf{T}}A)^{-1} = \sigma^2(A^{\mathsf{T}}A)^{-1}$. □

Лемма 3.2. *Пусть $P \in \mathbb{R}^{m\times m}$ симметрична и идемпотентна,* $\operatorname{rank} P = k$*, а $\mathsf{D}\varepsilon = \sigma^2 I_m$. Тогда $\mathsf{E}\|P\varepsilon\|_2^2 = \sigma^2 k$.*

Доказательство. Симметричная идемпотентная матрица есть ортопроектор: в её спектральном разложении $P = W\,\mathrm{diag}(I_k, 0)W^{\mathsf T}$ с ортогональной W. Тогда

$$\mathsf E\|P\varepsilon\|_2^2 = \mathsf E\big[\mathrm{tr}(P\varepsilon\varepsilon^{\mathsf T}P)\big] = \mathrm{tr}\big(P\,\mathsf E[\varepsilon\varepsilon^{\mathsf T}]P\big) = \sigma^2\,\mathrm{tr}\,P^2 = \sigma^2\,\mathrm{tr}\,P = \sigma^2 k,$$

где использованы линейность следа, $\mathsf E[\varepsilon\varepsilon^{\mathsf T}] = \sigma^2 I_m$ и $\mathrm{tr}\,P = k$ (след равен сумме собственных значений, у P их ровно k единичных). □

Теорема 3.3 (несмещённая оценка дисперсии)**.** *При посылках (G) оценка*

$$\hat\sigma^2 = \frac{\|y - A\hat\theta\|_2^2}{m - n}$$

несмещена: $\mathsf E\hat\sigma^2 = \sigma^2$.

Доказательство. По теореме 3.1 $A\hat\theta - A\theta = A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}\varepsilon = P_A\varepsilon$, поэтому $y - A\hat\theta = (I - P_A)\varepsilon$. Матрица $I - P_A$ — ортопроектор на $\mathrm{range}(A)^\perp$ ранга $m - n$ (см. замечание 2.4), остаётся применить лемму 3.2. □

Теорема Гаусса—Маркова (англ. *Gauss—Markov theorem*) утверждает, что среди линейных несмещённых оценок оценка МНК оптимальна.

Теорема 3.4 (Гаусс — Марков)**.** *При посылках (G) оценка $\hat\theta$ наименьших квадратов — наилучшая линейная несмещённая оценка (англ.* best linear unbiased estimator*, BLUE): для любой линейной оценки $\tilde\theta = Cy$ $(C \in \mathbb R^{n\times m})$, несмещённой для всех θ при верной модели $(CA = I_n)$, выполнено*

$$\mathsf D\hat\theta \preceq \mathsf D\tilde\theta$$

(разность ковариаций положительно полуопределена), и равенство достигается только при $C = (A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}$.

Доказательство. Разложим $C = (A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T} + D$. Несмещённость $\tilde\theta$ для всех θ равносильна $CA = I_n$; так как $(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}A = I_n$, получаем $DA = 0$. Ковариация $\tilde\theta = \theta + C\varepsilon$ равна $\sigma^2 CC^{\mathsf T}$; вычисляем по разложению с учётом $DA = 0$:

$$CC^{\mathsf T} = \big((A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T} + D\big)\big(A(A^{\mathsf T}A)^{-1} + D^{\mathsf T}\big) = (A^{\mathsf T}A)^{-1} + (A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}D^{\mathsf T} + DA(A^{\mathsf T}A)^{-1} + DD^{\mathsf T}.$$

Первый смешанный член: $\big(DA(A^{\mathsf T}A)^{-1}\big)^{\mathsf T} = 0$ и сам равен нулю. Итого $\mathsf D\tilde\theta = \mathsf D\hat\theta + \sigma^2 DD^{\mathsf T} \succeq \mathsf D\hat\theta$; равенство в смысле Лёвнера возможно лишь при $D = 0$. □

Замечание 3.5 (что существенно в посылках)*.* Нормальность ошибок для BLUE не нужна — только нулевое среднее, равные дисперсии и некоррелированность. Без несмещённости оптимальность исчезает: оценка $\tilde\theta = c\hat\theta$ с $c < 1$ имеет ковариацию $c^2\mathsf D\hat\theta \prec \mathsf D\hat\theta$, но смещена. Без равенства дисперсий (гетероскедастичности) или при коррелированности ошибок $\hat\theta$ перестаёт быть BLUE, и оценку улучшают взвешенным МНК (веса обратно дисперсиям). Регуляризованные оценки (раздел 5) намеренно жертвуют несмещённостью ради меньшей дисперсии — обмен, который выгоден на дне кривой «смещение — дисперсия» (вопрос 02).

Теперь добавим нормальность ошибок и получим связь МНК с максимальным правдоподобием.

Теорема 3.6 (МНК как максимальное правдоподобие)**.** *Пусть $\varepsilon \sim \mathcal N(0, \sigma^2 I_m)$. Тогда:*

1. оценка максимального правдоподобия параметра θ совпадает с оценкой МНК; 2. $\hat\theta \sim \mathcal N\big(\theta, \sigma^2(A^{\mathsf T}A)^{-1}\big)$; 3. $(m-n)\hat\sigma^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{m-n}$ и оценки $\hat\theta$ и $\hat\sigma^2$ независимы; 4. оценка максимального правдоподобия дисперсии смещена: $\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{\|y - A\hat\theta\|_2^2}{m}$, $\mathsf E\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{m-n}{m}\sigma^2$.

Доказательство. Логарифм правдоподобия

$$\ln L(\theta, \sigma^2) = -\frac{m}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{\|y - A\theta\|_2^2}{2\sigma^2}.$$

При любом $\sigma^2 > 0$ максимум по θ достигается при минимуме $\|y - A\theta\|_2^2$, что и даёт п. 1. П. 2 следует из линейности $\hat\theta$ по нормально распределённому y и теоремы 3.1.

П. 3: $y - A\hat\theta = (I - P_A)\varepsilon$ (теорема 3.3). По спектральному разложению $I - P_A = W\,\mathrm{diag}(0_n, I_{m-n})W^{\mathsf T}$; вектор $\eta = W^{\mathsf T}\varepsilon/\sigma$ имеет распределение $\mathcal{N}(0, I_m)$, и

$$\frac{(m-n)\hat\sigma^2}{\sigma^2} = \frac{\|W^{\mathsf T}(I - P_A)\varepsilon\|_2^2}{\sigma^2} = \sum_{j=n+1}^{m}\eta_j^2 \sim \chi^2_{m-n}.$$

Для независимости заметим, что векторы $W^{\mathsf T}P_A\varepsilon$ (от которых линейно зависит $\hat\theta$) и $W^{\mathsf T}(I - P_A)\varepsilon$ (от которого зависит $\hat\sigma^2$) совместно гауссовы, и их ковариация равна $\sigma^2 W^{\mathsf T}P_A(I - P_A)W = 0$; некоррелированные гауссовы векторы независимы.

П. 4: сравнение формул для $\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}}$ и $\hat\sigma^2$ вместе с теоремой 3.3 даёт $\mathsf{E}\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{m-n}{m}\sigma^2$. □

Замечание 3.7 (вывод для практики). Из пп. 2–3 следует, что при нормальных ошибках статистика

$$(\hat\theta_j - \theta_j)\big/(\hat\sigma\sqrt{v_j}),$$

где v_j — j-й диагональный элемент $(A^{\mathsf T}A)^{-1}$, имеет распределение Стьюдента с $m - n$ степенями свободы — она служит для доверительных интервалов и проверки значимости отдельных коэффициентов (см. [вопрос 14](../14-interval-estimation-tests/)).

4 Численная сторона МНК

Решение $\hat\theta = (A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}y$ само по себе не алгоритм: оно требует формирования $A^{\mathsf T}A$, и это источник потери точности. Пусть $d_1 \ge \ldots \ge d_n > 0$ — сингулярные числа A; **число обусловленности**

$$\kappa_2(A) = d_1/d_n.$$

Теорема 4.1 (погрешность метода нормальных уравнений)**.** *Если $\hat\theta_{NE}$ — решение, вычисленное по нормальным уравнениям в машинной арифметике с точностью u при точном формировании $A^{\mathsf T}A$ и $A^{\mathsf T}y$, то*

$$\frac{\|\hat\theta_{NE} - \hat\theta\|_2}{\|\hat\theta\|_2} \approx u\,\kappa_2(A)^2.$$

схема. Разложение Холецкого $A^{\mathsf T}A = GG^{\mathsf T}$ в машинной арифметике решает не исходную, а близкую систему $(A^{\mathsf T}A + E)\hat\theta_{NE} = A^{\mathsf T}y$ с $\|E\|_2 \approx u\|A^{\mathsf T}A\|_2$ (свойство устойчивости разложения Холецкого для положительно определённых матриц). По теореме о погрешности решения системы ошибка делится на $\|A^{\mathsf T}A\|_2$ и умножается на $\|(A^{\mathsf T}A)^{-1}\|_2 = 1/d_n^2$, а $\|A^{\mathsf T}A\|_2 = d_1^2$ — отсюда $u\,d_1^2/d_n^2 = u\,\kappa_2(A)^2$. □

Прямой вывод $\hat\theta$ через $A^{\mathsf T}A$ квадратично чувствителен к обусловленности. Устойчивые схемы работают с самой матрицей A.

Теорема 4.2 (решение МНК через QR-разложение)**.** *Пусть* $\operatorname{rank} A = n$ *и* $A = QR$ *— тонкое QR-разложение (*$Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *имеет ортонормированные столбцы,* $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *верхняя треугольная). Тогда* $\hat\theta$ *есть единственное решение системы*

$$R\hat\theta = Q^{\mathsf T} y, \qquad \min_\theta Q(\theta) = \|(I - QQ^{\mathsf T})y\|_2^2.$$

Вычисленное таким образом $\hat\theta_{QR}$ *есть точное решение задачи МНК для близких данных* $A + \delta A$, $y + \delta y$ *с*

$$\|\delta A\|_2 \lesssim mu\|A\|_2, \qquad \|\delta y\|_2 \lesssim mu\|y\|_2$$

(обратная устойчивость), поэтому его относительная ошибка есть $O\big(u(\kappa_2(A) + \tan\theta\,\kappa_2(A)^2)\big)$ *при ненулевой невязке.*

Доказательство. Ортогональные преобразования сохраняют 2-норму. Дополним Q до квадратной ортогональной $\bar Q = [\,Q\ \bar Q_\perp\,]$; тогда

$$\|A\theta - y\|_2^2 = \big\|\bar Q^{\mathsf T}(A\theta - y)\big\|_2^2 = \|R\theta - Q^{\mathsf T} y\|_2^2 + \|\bar Q_\perp^{\mathsf T} y\|_2^2,$$

поскольку $\bar Q^{\mathsf T} A = \binom{R}{0}$. Второе слагаемое от θ не зависит, первое обращается в нуль при $R\hat\theta = Q^{\mathsf T} y$; R невырождена (её сингулярные числа совпадают с $d_j > 0$), значит решение единственно. Минимальное значение равно $\|\bar Q_\perp^{\mathsf T} y\|_2^2 = \|(I - QQ^{\mathsf T})y\|_2^2$.

Утверждение обратной устойчивости — результат Лоусона и Хэнсона о методе Хаусхолдера: вычисленное $\hat R$ есть точный треугольный множитель матрицы, близкой к A с относительной погрешностью порядка mu, а обратная подстановка устойчива. Оценка ошибки следует далее из теоремы 4.3. □

Теорема 4.3 (чувствительность задачи МНК к данным)**.** *Пусть* $\|A\theta - y\|_2 = \min$ *с невязкой* r *и* $\|(A + \delta A)\hat\theta - (y + \delta y)\|_2 = \min$*;* $A, \delta A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m \ge n$, $\operatorname{rank} A = n$, $b \ne 0$,

$$\varepsilon = \max\Big\{\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2}, \frac{\|\delta y\|_2}{\|y\|_2}\Big\} < \frac{d_n}{d_1}, \qquad \sin\theta = \frac{\|r\|_2}{\|y\|_2} \ne 1.$$

Тогда

$$\frac{\|\hat\theta - \theta\|_2}{\|\theta\|_2} \le \varepsilon\Big\{\frac{2\kappa_2(A)}{\cos\theta} + \tan\theta\,\kappa_2(A)^2\Big\} + O(\varepsilon^2), \tag{2}$$

$$\frac{\|\hat r - r\|_2}{\|y\|_2} \le \varepsilon(1 + 2\kappa_2(A))\min(1, m - n) + O(\varepsilon^2). \tag{3}$$

Доказательство. Пишем $\delta A = \varepsilon E$, $\delta y = \varepsilon f$ с $\|E\|_2 \le \|A\|_2$, $\|f\|_2 \le \|y\|_2$ и рассматриваем семейство $A(t) = A + tE$, $y(t) = y + tf$, $t \in [0, \varepsilon]$. Так как $t\|E\|_2 < d_n$ при $t \le \varepsilon$, все $A(t)$ имеют ранг n и их решения $x(t)$ нормальных уравнений дифференцируемы; тейлоровское разложение в точке $t = 0$ даёт $\hat\theta = \theta + \varepsilon\dot x(0) + O(\varepsilon^2)$ (точка применения — $t = \varepsilon$).

Дифференцируем тождество $A(t)^{\mathsf T}A(t)x(t) = A(t)^{\mathsf T}y(t)$ в нуле:

$$A^{\mathsf T}A\,\dot x(0) = A^{\mathsf T}(f - E\theta) + E^{\mathsf T}(y - A\theta),$$

откуда

$$\dot x(0) = (A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}(f - E\theta) + (A^{\mathsf T}A)^{-1}E^{\mathsf T}r. \tag{4}$$

Оценим нормы множителей сингулярным разложением $A = U\Sigma V^{\mathsf T}$:

$$\|(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}\|_2 = \frac{1}{d_n}, \qquad \|(A^{\mathsf T}A)^{-1}\|_2 = \frac{1}{d_n^2}, \qquad \|A(A^{\mathsf T}A)^{-1}\|_2 = \frac{1}{d_n}.$$

Первое слагаемое в (4):

$$\frac{\|(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}(f-E\theta)\|_2}{\|\theta\|_2}\le\frac{\|f\|_2+\|E\|_2\|\theta\|_2}{d_n\|\theta\|_2}\le\kappa_2(A)\Big(\frac{\|y\|_2}{\|A\|_2\|\theta\|_2}+1\Big).$$

Второе:

$$\frac{\|(A^{\mathsf T}A)^{-1}E^{\mathsf T}r\|_2}{\|\theta\|_2}\le\frac{\|E\|_2\|r\|_2}{d_n^2\|\theta\|_2}\le\tan\theta\,\kappa_2(A)^2,$$

так как ортогональность $A\theta\perp r$ (замечание 2.4) даёт теорему Пифагора $\|A\theta\|_2^2+\|r\|_2^2=\|y\|_2^2$, то есть $\|A\|_2\|\theta\|_2\ge\|A\theta\|_2=\|y\|_2\cos\theta$ и $\|r\|_2/\|A\|_2\|\theta\|_2\le\tan\theta$. Подстановка в (4) даёт (2).

Для невязки: $r(t)=y(t)-A(t)x(t)$, дифференцирование даёт

$$\dot r(0)=(I-P_A)(f-E\theta)-A(A^{\mathsf T}A)^{-1}E^{\mathsf T}r,$$

где $P_A=A(A^{\mathsf T}A)^{-1}A^{\mathsf T}$ — ортопроектор. Используем $\|I-P_A\|_2=\min(1,m-n)$ (при $m=n$ проектор равен I, иначе его норма равна 1), $\|f\|_2\le\|y\|_2$, $\|E\theta\|_2\le\|A\|_2\|\theta\|_2\le\kappa_2(A)\|y\|_2$ (так как $\|\theta\|_2=\|A^+y\|_2\le\|y\|_2/d_n$) и $\|A(A^{\mathsf T}A)^{-1}E^{\mathsf T}r\|_2\le\|E\|_2\|r\|_2/d_n\le\kappa_2(A)\|r\|_2\le\kappa_2(A)\min(1,m-n)\|y\|_2$, что и даёт (3). □

Замечание 4.4 (как читать оценки). При нулевой невязке ($\theta=0$ в угле) чувствительность решения линейна по $\kappa_2(A)$ — как у квадратной системы. Член $\tan\theta\,\kappa_2^2$ включается при ненулевой невязке и делает задачу по-настоящему плохо обусловленной при большом κ_2: квадратичная зависимость достигается на примерах. Невязка, напротив, чувствительна к данным линейно, и метод нормальных уравнений для невязки приемлем. Отсюда практическое правило: решение считают по QR-разложению (Хаусхолдер или модифицированный Грамм—Шмидт) или SVD, а нормальные уравнения с разложением Холецкого применяют лишь при хорошей обусловленности и малом n — они вдвое дешевле. Полный ранг приближённо определяется по сингулярным числам: порог $d_j\le\delta$ при допуске δ порядка $u\|A\|$ (или точности данных).

Стоимость методов для $m\ge n$ (ведущие члены числа флопов [02]):

Метод	Флопы	Устойчивость
Нормальные уравнения + Холецкий	$mn^2+n^3/3$	$u\kappa_2^2$
QR Хаусхолдера	$2mn^2-\frac{2}{3}n^3$	обратно устойчив
QR (модиф. Грамм—Шмидт)	$2mn^2$	обратно устойчив
SVD (Чана)	$2mn^2+11n^3$	контроль ранга

SVD нужен и в другой ситуации — при неполном ранге: он выдаёт решение минимальной нормы A^+y (теорема 2.5) и позволяет отсечь малые сингулярные числа, от которых решение неустойчиво (мост к регуляризации).

5 Регуляризация: гребень и лассо

При плохой обусловленности $A^{\mathsf T}A$ (мультиколлинеарность факторов, $d_n\approx0$) дисперсия $\hat\theta$ велика — оценка неустойчива (подробный разбор и связь с некорректными задачами — вопрос 02). Гребневая регрессия (англ. *ridge regression*) добавляет штраф за норму вектора параметров.

Определение 5.1 (гребневая регрессия)**.** Оценка гребневой регрессии с параметром $\alpha\ge0$:

$$\hat\theta_\alpha=\arg\min_\theta\ Q(\alpha,\theta),\qquad Q(\alpha,\theta)=\|A\theta-y\|_2^2+\alpha\|\theta\|_2^2.$$

Параметр α у источников именуется λ ([16]) или τ ([53]).

Теорема 5.2 (существование, единственность и фильтр)**.** *Задача гребня имеет единственное решение*

$$\hat{\theta}_\alpha = (A^{\mathsf{T}}A + \alpha I)^{-1} A^{\mathsf{T}} y,$$

линейное по y. Если $A = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$ — сингулярное разложение, то

$$\hat{\theta}_\alpha = \sum_{j=1}^{n} \frac{d_j}{d_j^2 + \alpha}\,(u_j^{\mathsf{T}} y)\,v_j, \qquad A\hat{\theta}_\alpha = \sum_{j=1}^{n} \frac{d_j^2}{d_j^2 + \alpha}\,(u_j^{\mathsf{T}} y)\,u_j.$$

Коэффициенты $\dfrac{d_j^2}{d_j^2+\alpha} \le 1$ — фильтр: направления с малыми сингулярными числами сжимаются сильнее. След шляпной матрицы гребня — эффективное число степеней свободы:

$$\mathrm{df}(\alpha) = \operatorname{tr}\bigl[A(A^{\mathsf{T}}A + \alpha I)^{-1}A^{\mathsf{T}}\bigr] = \sum_{j=1}^{n} \frac{d_j^2}{d_j^2 + \alpha},$$

непрерывно убывающее от n при $\alpha = 0$ до 0 при $\alpha \to \infty$.

Доказательство. По тождеству (1) с добавкой $\alpha\|\theta\|^2$:

$$Q(\alpha, \theta + tz) = Q(\alpha,\theta) + 2t\,z^{\mathsf{T}}\bigl(A^{\mathsf{T}}(A\theta - y) + \alpha\theta\bigr) + t^2\bigl(\|Az\|_2^2 + \alpha\|z\|_2^2\bigr).$$

При $\alpha > 0$ квадратичная форма строго положительно определена ($\|Az\|_2^2 + \alpha\|z\|_2^2 > 0$ при $z \neq 0$), значит Q строго выпукла, а необходимое условие нулевого градиента $A^{\mathsf{T}}A\theta + \alpha\theta = A^{\mathsf{T}}y$ даёт единственное решение. Фильтр получается подстановкой SVD: $A^{\mathsf{T}}A + \alpha I = V(\Sigma^2 + \alpha I)V^{\mathsf{T}}$, обращение которой переводится в веса $d_j/(d_j^2+\alpha)$. Для df: след диагональной в базисе U матрицы $U\,\operatorname{diag}\bigl(d_j^2/(d_j^2+\alpha)\bigr)\,U^{\mathsf{T}}$ равен сумме её диагональных элементов. □

Замечание 5.3 (свойства гребня). (1) Оценка смещена: $\mathsf{E}\hat{\theta}_\alpha = (A^{\mathsf{T}}A + \alpha I)^{-1}A^{\mathsf{T}}A\,\theta \neq \theta$, зато дисперсия меньше, чем у МНК (выполняется в каждом сингулярном направлении с коэффициентом $d_j^2/(d_j^2+\alpha)^2$ вместо $1/d_j^2$ — задача про это ниже); существует α, минимизирующее среднеквадратичный риск — обмен «смещение — дисперсия» подробно разобран в вопросе 02. (2) В отличие от МНК, гребень корректно определён при любом ранге и при $n > m$ (штраф делает матрицу системы положительно определённой). (3) Байесовский смысл: $\hat{\theta}_\alpha$ — MAP-оценка при гауссовском априоре $\theta \sim \mathcal{N}(0, \nu^2 I)$ с $\alpha = \sigma^2/\nu^2$ (вывод — вопрос 02). (4) Параметр α выбирают перекрёстной проверкой по правилу одной стандартной ошибки (вопрос 02).

Лассо заменяет квадратичный штраф на штраф L_1:

$$\min_{\theta}\ \|A\theta - y\|_2^2 \quad \text{при условии} \quad \|\theta\|_1 \le t,$$

что обнуляет часть коэффициентов и отбирает факторы (лапласовский априор; сравнение гребня и лассо — вопрос 02). Для гребня есть явная формула, для лассо её нет — решают численно (проксимальный градиент, координатный спуск).

6 Обучение регрессий первыми методами

Когда m велико или n велико, разложений тяжело, и обе задачи (МНК и гребень) решают градиентными итерациями — теми же методами, что и прочие задачи минимизации (вопрос 10; подробная теория скоростей — [63]).

Градиенты. Для функционала МНК $\nabla Q(\theta) = 2A^{\mathsf{T}}(A\theta - y)$; константа Липшица градиента $L = 2d_1^2$ (наибольшее собственное значение Гессиана $2A^{\mathsf{T}}A$); для гребня $L = 2(d_1^2+\alpha)$. Шаг градиентного спуска $\eta \le 1/L$ гарантирует убывание функционала (лемма спуска, [63]): $Q(\theta_{k+1}) \le Q(\theta_k) - \eta(1 - L\eta/2)\|\nabla Q(\theta_k)\|_2^2$. На квадратичной задаче спектр $A^{\mathsf{T}}A$ сжат на $[\mu, L]$ с $\mu = 2d_n^2$ даёт линейную сходимость с коэффициентом $(\kappa-1)/(\kappa+1)$, $\kappa = L/\mu = \kappa_2(A)^2$ — в квадрате хуже, чем у самой матрицы A, отсюда и выгода QR/SVD при плохой обусловленности; для гребня спектр сдвинут, $\kappa = (d_1^2+\alpha)/(d_n^2+\alpha)$.

Стохастический спуск. На шаге берут случайное подмножество B (минибатч) и оценку градиента $g(\theta) = \frac{2}{|B|}\sum_{i\in B}(a_i^{\mathsf{T}}\theta - y_i)a_i$; она несмещённа: $\mathsf{E}_B g(\theta) = \nabla Q(\theta)$. При убывании шага по правилу Роббинса—Монро $\sum_k \eta_k = \infty$, $\sum_k \eta_k^2 < \infty$ итерации сходятся (формулировка — [63], [64]; стохастический градиентный спуск подробно разобран в вопросе 02); увеличение батча в b раз снижает дисперсию оценки в b раз.

Моментум. Усреднение градиентов $v_{k+1} = \beta v_k + \nabla Q(\theta_k)$, $\theta_{k+1} = \theta_k - \eta v_{k+1}$ (метод тяжёлого шарика) для квадратичной задачи ускоряет сходимость до коэффициента $(\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$ вместо $(\kappa-1)/(\kappa+1)$ (вывод — вопрос 10, [63]) — практический рецепт при большом κ. Разница режимов видна на сквозном примере вопроса: матрица плана с $\kappa_2(A) \approx 42$ даёт градиентному спуску на log-loss с шагом $1/L$ около $2{,}3 \cdot 10^4$ итераций, а IRLS в логистической части сходится за 5 итераций (числа — в `examples.ipynb`, примеры 2–3).

7 Логистическая регрессия

Теперь отклик бинарный: $y_i \in \{0, 1\}$ — принадлежность объекта a_i к классу 1. Линейная модель на прямую $a_i^{\mathsf{T}}\theta$ выходить не может — значения не из $\{0, 1\}$; логистическая регрессия пропускает её через сигмоиду (англ. *sigmoid*), превращая в вероятность.

Определение 7.1 (логистическая модель)**.**

$$\mathsf{P}(y_i = 1 \mid a_i) = p_i(\theta) = s(a_i^{\mathsf{T}}\theta), \qquad s(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}.$$

Отсюда $\mathsf{P}(y_i = 0 \mid a_i) = 1 - p_i = s(-a_i^{\mathsf{T}}\theta)$ и правило классификации $\widehat{y}_i = \mathbb{1}\{a_i^{\mathsf{T}}\theta > 0\}$: разделяющая граница — гиперплоскость $a^{\mathsf{T}}\theta = 0$.

Лемма 7.2 (свойства сигмоиды)**.** *$s'(z) = s(z)(1-s(z))$; $s(-z) = 1-s(z)$; $\ln s(z) = z - \ln(1+e^z)$; $\ln(1-s(z)) = -\ln(1+e^z)$.*

Доказательство. Непосредственное дифференцирование и алгебра: $s(z) = e^z/(1+e^z)$, откуда $\ln s(z) = z - \ln(1+e^z)$; остальное — проверка подстановкой. □

Определение 7.3 (log-loss / бинарная перекрёстная энтропия)**.** Функция правдоподобия выборки (наблюдения независимы):

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{m} p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}.$$

Логарифмическая функция потерь (англ. *log-loss*, или бинарная перекрёстная энтропия, англ. *cross-entropy*) — отрицательное логарифмическое правдоподобие:

$$Q(\theta) = -\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{m}\bigl[\ln(1+e^{a_i^{\mathsf{T}}\theta}) - y_i\, a_i^{\mathsf{T}}\theta\bigr].$$

Оценка максимального правдоподобия есть $\arg\min_\theta Q(\theta)$.

Явной формулы для минимизатора Q нет (система оценочных уравнений нелинейна): логистическая регрессия обучается итеративно — в этом коренное отличие от линейной.

Теорема 7.4 (гладкость, выпуклость, градиент и гессиан)**.** *Q выпукла и бесконечно дифференцируема; с обозначениями $p = (p_i)$, $W = \operatorname{diag}(p_i(1-p_i))$:*

$$\nabla Q(\theta) = A^{\mathsf{T}}(p - y), \qquad \nabla^2 Q(\theta) = A^{\mathsf{T}} W A \succeq 0.$$

Если $\operatorname{rank} A = n$ *и все* $0 < p_i < 1$*, то Q строго выпукла, и её минимум (если существует) единствен.*

Существование минимума связано с разделимостью классов: при линейной неразделимости минимум достигается (доказательство ниже), при разделимости инфимум не достигается (замечание 7.8).

Доказательство. Слагаемое $y_i a_i^{\mathsf{T}}\theta$ линейно, вторые производные даёт только $\varphi_i(\theta) = \ln(1 + e^{a_i^{\mathsf{T}}\theta})$. По лемме 7.2 $\nabla\varphi_i = s(a_i^{\mathsf{T}}\theta)\, a_i = p_i a_i$ и

$$\nabla^2\varphi_i = s'(a_i^{\mathsf{T}}\theta)\, a_i a_i^{\mathsf{T}} = p_i(1-p_i)\, a_i a_i^{\mathsf{T}}.$$

Суммирование по i даёт формулы градиента и гессиана. Для любого $z \in \mathbb{R}^n$

$$z^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} W A\, z = \sum_{i=1}^{m} p_i(1-p_i)\,(a_i^{\mathsf{T}} z)^2 \geq 0,$$

так как $0 < p_i < 1$; значит $A^{\mathsf{T}} W A \succeq 0$ и Q выпукла. Если $\operatorname{rank} A = n$ и $z \neq 0$, то $Az \neq 0$, существует i с $a_i^{\mathsf{T}} z \neq 0$, и $z^{\mathsf{T}}\nabla^2 Q\, z > 0$ — строгая выпуклость.

Существование минимума. Вдоль луча $\theta = \theta_0 + tz$ пользуемся $\ln(1 + e^u) \geq \max(u, 0)$. Если $a_i^{\mathsf{T}} z > 0$ и $y_i = 0$, слагаемое растёт как $t\, a_i^{\mathsf{T}} z \to +\infty$; если $a_i^{\mathsf{T}} z < 0$ и $y_i = 1$, слагаемое растёт как $-t\, a_i^{\mathsf{T}} z$ (точнее, $\ln(1 + e^{a_i^{\mathsf{T}}\theta}) - a_i^{\mathsf{T}}\theta = \ln(1 + e^{-a_i^{\mathsf{T}}\theta}) \to +\infty$). Значит, если классы линейно неразделимы, то для любого z с $Az \neq 0$ найдётся i в одной из этих ситуаций, $Q \to +\infty$ вдоль любого луча с $Az \neq 0$, и сужение Q на $(\ker A)^{\perp}$ — непрерывная коэрцитивная функция — достигает минимума; сдвиг на $\ker A$ значение Q не меняет ($a_i^{\mathsf{T}}(\theta + z) = a_i^{\mathsf{T}}\theta$ при $z \in \ker A$), поэтому множество минимизаторов — непустое аффинное подпространство, параллельное $\ker A$. При $\operatorname{rank} A = n$ оно состоит из одной точки по строгой выпуклости. При разделимости классов инфимум не достигается (замечание 7.8). □

Замечание 7.5 (оценочные уравнения). Условие $\nabla Q = 0$ есть система $A^{\mathsf{T}}(y - p) = 0$ из n нелинейных уравнений; если среди столбцов A есть константа, первое из них даёт $\sum_i y_i = \sum_i p_i(\widehat{\theta})$: сумма предсказанных вероятностей равна числу единиц. Это свойство используют для контроля сходимости.

Теорема 7.6 (метод Ньютона и IRLS)**.** *Шаг Ньютона для Q с текущей точки θ:*

$$\theta^{+} = \theta + (A^{\mathsf{T}} W A)^{-1} A^{\mathsf{T}}(y - p).$$

Он совпадает с решением взвешенной задачи наименьших квадратов с весами W и рабочим откликом $z = A\theta + W^{-1}(y - p)$:

$$\theta^{+} = \arg\min_{\varphi} (z - A\varphi)^{\mathsf{T}} W (z - A\varphi).$$

Итерации (приведение весов W и отклика z к текущей точке и решение взвешенной МНК-задачи) называются повторно взвешенными наименьшими квадратами (англ. iteratively reweighted least squares*, IRLS); вес максимален у объектов у границы ($p_i \approx 1/2$).*

Доказательство. Нормальные уравнения взвешенной задачи: $A^{\intercal}WA\,\varphi = A^{\intercal}Wz$. Подставляем $Wz = WA\theta + (y - p)$:

$$A^{\intercal}WA\,\varphi = A^{\intercal}WA\,\theta + A^{\intercal}(y - p),$$

откуда $\varphi = \theta + (A^{\intercal}WA)^{-1}A^{\intercal}(y - p)$ — это и есть шаг Ньютона (гессиан $\nabla^2 Q = A^{\intercal}WA$ обратим при полном ранге A, так как $W \succ 0$). □

Замечание 7.7 (сходимость и промахи). Для строго выпуклой гладкой функции метод Ньютона локально квадратично сходится к минимуму (теория — вопрос 10); глобально на практике применяют демпфирование: при возрастании Q шаг делят пополам (у [16] — стандартная рекомендация). Регуляризованный вариант $Q(\theta) + \frac{\alpha}{2}\|\theta\|_2^2$ имеет гессиан $A^{\intercal}WA + \alpha I \succ 0$ — сильную выпуклость при любом ранге A и сепарабельности классов (разделимость разбирается ниже), и тот же шаг IRLS с заменой $A^{\intercal}WA \to A^{\intercal}WA + \alpha I$.

Замечание 7.8 (разделимость классов). Если выборка линейно разделима (существует φ: $y_i = 1 \Rightarrow a_i^{\intercal}\varphi > 0$, $y_i = 0 \Rightarrow a_i^{\intercal}\varphi < 0$), то $\inf Q$ не достигается: вдоль луча $\theta = t\varphi$ при $t \to \infty$ величина Q строго убывает, значит оценка максимального правдоподобия не существует ($\|\hat{\theta}\| \to \infty$), и в точной арифметике IRLS не останавливается по критерию $\nabla Q = 0$. В машинной арифметике есть дополнительная ловушка: вероятности p_i сатурируют до точных 0 и 1, гессиан вырождается, и норма градиента формально падает ниже любого порога — критерий $\|\nabla Q\| < \varepsilon$ даёт ложную остановку при неограниченно растущей $\|\theta_k\|$ (на сквозном примере вопроса $\|\theta_k\|$ достигает ≈ 718 при выполненном пороге 10^{-8} — замер в examples.ipynb, пример 4). Надёжные стоп-сигналы — рост $\|\theta_k\|$ и идеальная классификация обучения. Выход — регуляризация (гребень с малым α делает минимум существующим и единственным) либо остановка по изменению прогнозов. Это свойство важно помнить: идеально точная классификация на обучении для логистической регрессии означает, что оценка ушла на бесконечность.

Мультиномиальный случай (K классов) вводит $K - 1$ векторов параметров через логиты $\ln \frac{\mathsf{P}(G=k|a)}{\mathsf{P}(G=K|a)} = a^{\intercal}\theta_k$; структура правдоподобия и шагов Ньютона та же, но весовая матрица на наблюдение уже не диагональна ([16], §4.4). Для отбора факторов применяют L_1-штраф к θ (решение — координатным спуском).

8 Метрики качества бинарной классификации

Порог классификации $\widehat{y} = \mathbb{1}\{p_i > \pi\}$ (по умолчанию $\pi = 1/2$) разбивает объекты по матрице ошибок (англ. *confusion matrix*): TP и TN — верные срабатывания, FP — ложная тревога, FN — пропуск. Из неё выводят:

Метрика	Определение	Когда важна
Accuracy (доля верных, англ. *accuracy*)	$(\mathrm{TP} + \mathrm{TN})/m$	классы сбалансированы
Precision (точность, англ. *precision*)	$\mathrm{TP}/(\mathrm{TP} + \mathrm{FP})$	цена ложной тревоги высока
Recall (полнота, англ. *recall*)	$\mathrm{TP}/(\mathrm{TP} + \mathrm{FN})$	цена пропуска высока

Accuracy бесполезна при дисбалансе классов (всех в меньший класс): например, при 1% единиц константный прогноз «все нули» даёт accuracy 99%. Порог π балансирует precision и recall и подбирается по контрольной выборке.

Где работает конструкция.

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
Линейная регрессия, полный ранг	$\|A\theta - y\|_2^2$	$\hat\theta = (A^\top A)^{-1} A^\top y$	несмещённость, BLUE (Гаусс — Марков)
Линейная регрессия, плохо обусловлена	$\|A\theta - y\|^2 + \alpha\|\theta\|^2$	$(A^\top A + \alpha I)^{-1} A^\top y$	устойчивость ценой смещения
Линейная регрессия, большие m, n	то же, итеративно	GD/SGD, momentum	масштабируемость
Логистическая регрессия	log-loss (перекрёстная энтропия)	IRLS / GD / SGD	вероятность класса, разделяющая гиперплоскость

9 Разобранные задачи

Задача 9.1. Гребень через сингулярное разложение. Пусть $A = U\Sigma V^\top$. Вывести $\hat\theta_\alpha$ и доказать, что $\|\hat\theta_\alpha\|_2 < \|\hat\theta\|_2$ при $\alpha > 0$, если $\hat\theta \neq 0$.

Решение. Формула — теорема 5.2. Для норм в базисе V:

$$\|\hat\theta_\alpha\|_2^2 = \sum_{j=1}^{n} \frac{d_j^2}{(d_j^2+\alpha)^2}(u_j^\top y)^2, \qquad \|\hat\theta\|_2^2 = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{d_j^2}(u_j^\top y)^2,$$

и $\dfrac{d_j^2}{(d_j^2+\alpha)^2} < \dfrac{1}{d_j^2}$ при $\alpha > 0$ и $d_j > 0$; если $\hat\theta \neq 0$, хотя бы одно слагаемое ненулевое и строгое неравенство сохраняется. ■

Задача 9.2. Градиент и гессиан log-loss непосредственно. Для одного наблюдения вычислить $\nabla_\theta \left[\ln(1 + e^{a^\top\theta}) - y\, a^\top\theta\right]$ и ∇_θ^2, проверить положительную полуопределённость.

Решение. Обозначим $u = a^\top\theta$. $\frac{\partial}{\partial\theta_j}\ln(1+e^u) = \frac{e^u}{1+e^u}a_j = s(u)a_j$; линейное слагаемое даёт $-ya_j$. Градиент: $(s(u)-y)a$. Гессиан: $\frac{\partial}{\partial\theta_k}\big[s(u)a_j\big] = s'(u)a_k a_j = s(u)(1-s(u))a_j a_k$ — матрица $s(u)(1-s(u))\,aa^\top = \lambda aa^\top$ с $\lambda > 0$; для любого z: $z^\top(\lambda aa^\top)z = \lambda(a^\top z)^2 \geq 0$. Сумма по наблюдениям даёт $A^\top W A$ из теоремы 7.4. ■

Задача 9.3. Неполный ранг. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $y = (2, 0)^\top$. Найти все решения МНК и решение минимальной нормы.

Решение. Нормальные уравнения $A^\top A\theta = A^\top y$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\theta = \binom{2}{2}$, то есть $\theta_1 + \theta_2 = 1$; множество решений — прямая $(t, 1-t)^\top$. Минимум нормы при $t = 1/2$: $\hat\theta = (1/2,\, 1/2)^\top$. Проверка через SVD: $d_1 = 2$, $u_1 = v_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$; $\hat\theta = \frac{u_1^\top y}{d_1}v_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{1}$. ■

Задача 9.4. Эквивалентность МНК и правдоподобия. Записать правдоподобие модели $y = A\theta + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$, показать, что максимизация по θ совпадает с МНК, и сравнить оценки дисперсии.

Решение. Плотность: $L = (2\pi\sigma^2)^{-m/2}\exp(-\|y - A\theta\|^2/(2\sigma^2))$; минимизация $-\ln L$ по θ — минимизация $\|y - A\theta\|^2$. Оценка по σ^2: $\hat\sigma^2_{\text{ML}} = \|y - A\hat\theta\|^2/m$ с ожиданием $\frac{m-n}{m}\sigma^2$ (теорема 3.6); несмещённая $\hat\sigma^2$ делит на $m - n$. ■

10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Выведите нормальные уравнения. Что меняется при неполном ранге матрицы плана?
- Что такое решение минимальной нормы и как его получить через SVD?
- Сформулируйте и докажите теорему Гаусса—Маркова. Какие посылки существенны?
- Почему решать задачу МНК через нормальные уравнения нельзя при большом числе обусловленности? Откуда берётся квадрат κ_2?
- Что такое гребневая регрессия, как записывается её решение через сингулярные числа, что делает фильтр с малыми d_j?
- Откуда берётся log-loss? Почему логистическую регрессию нельзя решить явной формулой?
- Запишите градиент и гессиан log-loss. Что следует из их вида для сходимости обучения?
- Что такое IRLS и почему шаг Ньютона совпадает со взвешенной МНК?
- Что произойдёт с оценкой логистической регрессии на линейно разделимой выборке?

11 Источники

Основные источники вопроса. Локаторы (страницы) даны в README этого вопроса.

[16] (Хасти, Тибширани, Фридман) — постановка МНК, нормальные уравнения и геометрия, теорема Гаусс — Марков (формулировка §3.2.2, доказательство — упр. 3.3), гребневая регрессия с SVD-фильтром и df, вся теория логистической регрессии: правдоподобие, градиент и гессиан, IRLS, замечания о сходимости и разделимости.

[02] (Голуб, Ван Лоун) — глава о методе наименьших квадратов: нормальные уравнения и их погрешность (κ_2^2), QR-разложение и его обратная устойчивость, теорема о чувствительности решения и невязки к данным, псевдообратная матрица, решение минимальной нормы, таблица стоимости методов.

[53] (Воронцов) — МНК как эмпирический риск, мультиколлинеарность и гребень через сингулярное разложение, лассо, градиент и гессиан логистического функционала, IRLS как последовательность взвешенных МНК-задач.

[63] [64] (Меркулов) — обучение регрессий первыми методами: лемма спуска и скорости градиентного спуска, несмещённость стохастического градиента и оценки SGD, метод тяжёлого шарика.

[06] (Турчин) — математическая статистика: функция правдоподобия и метод максимального правдоподобия (фон раздела 7).

[51] (Гудфеллоу, Бенджио, Курвилль) — перекрёстная энтропия как функция потерь и обучение логистической регрессии градиентными методами.