今日論文 • 第 01 篇 需訂閱／付費

針灸改善輕至中度抑鬱症狀及前額葉皮質功能：假針對照隨機試驗與近紅外腦功能成像研究

Acupuncture improves depressive symptoms and prefrontal cortical function in mild to moderate depressive disorder: A randomized sham-controlled trial and fNIRS study

作者 Yang B, Wang T, Zhu F, Liu Y, Li Z, Luo L, Yin L, Mao S, Wu J, Miao R 等

期刊 Neuropharmacology（2026年11月15日；線上／刊物資料）

識別碼 PMID 42379469 • DOI 10.1016/j.neuropharm.2026.111088

取用 需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42379469/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2026.111088

研究是什麼

這是一項針對輕至中度抑鬱障礙的隨機、假針對照臨床試驗，並以功能性近紅外光譜（fNIRS）觀察前額葉皮質激活與功能連接，探討針灸改善情緒症狀的可能神經機制。

方法要點

- 患者隨機分為真針組（RA）或假針組（SA），接受為期 8 周的標準化治療。
- 臨床結果包括抑鬱自評量表（SDS）、焦慮自評量表（SAS）、生活質素量表 SF-36，以及中醫證候積分。
- 部分受試者接受靜息態及任務態 fNIRS，評估前額葉激活與功能連接。
- 摘要未列明總樣本量及具體分數差值，解讀時須保留此限制。

主要結果

- 與基線相比，真針組 SDS、SAS 顯著下降，SF-36 情緒相關範疇顯著改善。
- 效果自第 4 周出現，治療結束後可持續至 12 周；真針組改善幅度較假針組更大、亦較穩定。
- fNIRS 顯示真針後背外側及內側前額葉激活增強、前額葉功能連接加強；假針組神經改變有限。
- 作者認為，調節前額葉激活與連接，可能是針灸抗抑鬱效應的機制之一。

中醫診所臨床啟示

- 輕至中度抑鬱或伴隨焦慮的門診患者，若藥物反應不佳或難以耐受，可將針灸作為輔助選項討論。
- 必須先排除急重症、雙相情感障礙及自殺風險，並與精神科或家庭醫生協調，不可取代必要藥物或心理治療。
- 向患者說明：目前公開摘要未提供樣本量及精確分差，證據仍須對照全文後再作判斷。

限制與解讀注意

- 樣本量及具體效應量未在摘要列出。
- 假針對照設計有助減低安慰劑效應，但針灸試驗難以完全致盲。
- fNIRS 只覆蓋皮質淺層，不能直接推論深部腦區改變。

> 聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。