今日論文 ・ 第 02 篇 需訂閱／付費

頰針改善中度抑鬱患者的抑鬱及焦慮症狀：三臂隨機對照試驗與功能磁力共振研究

Cheek acupuncture can improve the depressive and anxious symptoms of patients with moderate depression disorders

作者 Jia X, Shen P, Wang C, Zhou G, Zhou H, Xu F, Jiang S

期刊 Complementary Therapies in Medicine（2026年8月）

識別碼 PMID 42128035 ・ DOI 10.1016/j.ctim.2026.103383

取用 需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42128035/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.ctim.2026.103383

研究是什麼

單中心三臂隨機對照試驗，比較真頰針、假頰針與口服舍曲林，對中度抑鬱患者 HAMD-17、HAMA 的影響，並以 fMRI 觀察真頰針組治療前後的局部一致性（ReHo）改變。

方法要點

- 浙江中醫藥大學附屬醫院針灸科及精神衛生科門診招募（2022年9月至2025年5月），系統隨機分為頰針組（AC）、假頰針組（SAC）及藥物組。
- 頰針取頭點（CA-1）、頸點（CA-5）、上焦（CA-2）、中焦（CA-3）、下焦（CA-4），約刺入 5–7.5 mm，不作補瀉，共 10 針，留針 30 分鐘。
- 假頰針取真穴向身體前正中線旁開 10 mm，用鈍頭針不刺入皮膚。每周 3 次，共 12 周、36 次。藥物組口服舍曲林。
- 於基線及治療後第 1、2、3、4、8、12 周及治療結束後 2 個月評估 HAMD-17、HAMA；僅頰針組接受治療前後 fMRI。摘要未列樣本量及具體分差。

主要結果

- 三組治療後 HAMD-17、HAMA 均較基線顯著下降（P<0.001），均可改善中度抑鬱的抑鬱及焦慮症狀。
- 作者報告頰針組療效優於假針組及藥物組；三組均約自第 2 周起效（藥物組焦慮改善約自第 3 周）。
- 頰針組分數由第 3 至第 8 周持續下降，其後進入平台，治療後 2 個月隨訪仍維持；假針及藥物組改善主要見於早期，後期較趨穩定。
- fMRI：治療後左側額中回（L-MFG）ReHo 下降，左側額上回（L-SFG）ReHo 上升，作者推測與情緒、認知控制回路重塑有關。

中醫診所臨床啟示

- 中度抑鬱門診可將頰針作為輔助討論，但對「優於舍曲林」的結論須審慎：藥物組無法像針灸那樣雙盲，優效可能受期望效應影響。
- fMRI 只在真頰針組進行，並無假針或藥物對照影像，不能單獨證明特異性機制。
- 嚴重抑鬱、自殺風險、精神病性症狀或需急性處理者，必須轉介西醫精神科，不可延遲。

限制與解讀注意

- 單中心；摘要未提供樣本量及精確分差。
- 藥物對照未致盲；影像只覆蓋真針組。
- 結果尚待全文核對及獨立重複。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。