今日論文 • 第 03 篇 公開全文

間接灸改善精神分裂症患者的失眠及相關症狀：隨機對照試驗

Indirect moxibustion therapy improves insomnia and associated symptoms in patients with schizophrenia

作者 Cai J, Wu M, Zhang J

期刊 Trials 第 27 卷第 1 期（2026年7月29日）

識別碼 PMID 42928360 • PMC13700130 • DOI 10.1186/s13063-026-09915-w

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42928360/
- DOI／期刊頁 https://doi.org/10.1186/s13063-026-09915-w
- PMC 公開全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13700130/

研究是什麼

單中心隨機對照試驗，評估在低劑量右佐匹克隆（dexzopiclone）基础上，加用間接灸（IM）對比假間接灸（SIM），對精神分裂症共病失眠患者睡眠質素（PSQI）及生活質素（SQLS）的影響。

方法要點

- 共 120 人，隨機分為間接灸組與假灸組各 60 人，標準化干預 8 周。
- 兩組均同時使用低劑量助眠藥；倫理審查來自上海市精神衛生中心（SMHC-IRB-2023-08），試驗註冊號 NCT06171308。
- 主要比較治療第 4、8 周 PSQI 及 SQLS 相對於基線的組間校正差值。

主要結果

- 基線 PSQI、SQLS 兩組相若。第 4 及第 8 周，間接灸組分數均顯著低於假灸組。
- PSQI：第 4 周 10.10±1.76 對 13.50±1.65；第 8 周 10.65±1.54 對 12.77±2.05。組間校正差第 4 周 −3.399（95% CI −4.078 至 −2.719），第 8 周 −2.115（95% CI −2.795 至 −1.435）；均 P<0.001。
- SQLS：組間校正差第 4 周 −6.801，第 8 周 −7.732（95% CI −10.071 至 −5.393）；均 P<0.001。
- 作者認為改善具統計及臨床意義，但屬初步結果，需要多中心、更長期、更豐富終點的試驗驗證。

中醫診所臨床啟示

- 已在精神專科穩定用藥、仍有失眠的精神分裂症患者，間接灸或可作輔助，但必須與精神科協調。
- 不可自行減停抗精神病藥或助眠藥；兩組皆同時使用低劑量右佐匹克隆，結果反映的是「加用間接灸」而非單用艾灸取代藥物。
- 結果不能外推至無精神病診斷的一般失眠，亦不能外推至急性精神症狀未穩者。

限制與解讀注意

- 單中心；隨訪僅 8 周。
- 假灸難以完全致盲；擴充結局指標及長期安全性仍不足。

> 聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。