MAT

$$Pa \rightarrow a_n = a_1 + (n-1).R$$

$$Pg \rightarrow a_n = a_1 . R^{(n-1)}$$

$$Spa = \frac{(a_1 + a_n).n}{2}$$

$$Spg = \frac{a_n.(R^n - 1)}{(R-1)}$$

$$X_V = \frac{-b}{2a} \qquad y_V = \frac{-\Delta}{4a}$$

a

$a > 0$ $\quad$ $a < 0$

c



b

$b > 0$ $\quad$ $b = 0$ $\quad$ $b < 0$



GLOSSÁRIO:

- PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- FUNÇÃO QUADRÁTICA
- PROGRESSÃO ARITMÉTICA

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

P.E.

$$\mu \text{ ou } \bar{x} = \frac{\sum x_n}{n}$$

QUARTIS = Q1, Q2, Q3...

mediana

mediana = meio

Moda = + repete

$$\text{Moda}_{(INT)} = L_i + \left(\frac{\Delta 1}{\Delta 1 + \Delta 2}\right) . h$$

$$\text{Amplitude} = X_n - X_1$$

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$\text{Amplitude Interquartil} = Q3 - Q1$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\sigma^2 \text{ ou } s^2 = \frac{\sum (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

↳ $P(A \cap B)_{m.e.} = \emptyset$

↳ $P(A \cap B)_{Ind.} = P(A) . P(B)$

$$\text{cov}(x,y) = \sum \frac{(x_n - \bar{x}) . (y_n - \bar{y})}{n}$$

$$\mu = n . s$$

$$\sigma^2 = n . s . F$$

$$\text{cov}(x+y) = \text{VAR}(x) + \text{VAR}(y) + 2\text{cov}(x,y)$$

coef. de det. $= r^2$

$$\text{cov}(x-y) = \text{VAR}(x) + \text{VAR}(y) - 2\text{cov}(x,y)$$

$$r = \frac{\text{cov}(x,y)}{\sigma_x . \sigma_y}$$

$$\text{cov}(x,y) = E(x.y) - E(x).E(y)$$

$$\mu(d_p) = \sum x_n . p(x = x_n)$$

$X \sim N(\mu, \sigma)$

- σ → DESV. PAD.
- μ → MÉDIA
- N → NORMAL
- $\sim$ → SEGUE
- X → VARIÁVEL

$$\sigma^2(dp) = E(x^2) - (E(x))^2$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

$$P(B) \rightarrow P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})$$

VALORES FIXOS DIST. NORMAL

$\mu - \sigma < x < \mu + \sigma = 68\%$

$\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma = 95\%$

$\mu - 3\sigma < x < \mu + 3\sigma = 99{,}7\%$

DIST. NORM. PAD.

$\mu = 0 \quad \sigma = 1$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

GLOSSÁRIO:

- TENDÊNCIA CENTRAL
- DISPERSÃO
- DISTRIBUIÇÃO PROBABILIDADE
- TEOREMA DE BAYES
- PROBABILIDADE CONDICIONAL
- CORRELAÇÃO LINEAR
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL
- DISTRIBUIÇÃO NORMAL

CB

$$CR = \frac{(CN \cdot IE)}{II}$$

GLOSSÁRIO:

- CÂMBIO CÁLCULO

TI

$$A = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

$$P = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$R = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$E = \frac{VN}{VN + FP}$$

$$S\ F1 = \frac{2 \cdot \text{PRECISÃO} \cdot \text{REVOCAÇÃO}}{\text{PRECISÃO} + \text{REVOCAÇÃO}}$$

ACURÁCIA PRECISÃO REVOCAÇÃO

ESPECIFICIDADE SCORE F1