

Work 2

Henrique Araujo Lima

01 de maio de 2018

Descrição:

Reexecute e explique os comandos R na 7a. ed. do livro texto na pagina 211.

Desenvolvimento:

Geração de números aleatórios:

Os próximos comandos mostram como gerar 1000 números aleatórios com os inteiros [0, 1, ..., 9].

```
y = c(0:9) #cria um vetor com os valores (0,1,2,...,9)
x = sample(y, 1000, replace=T) #cria uma amostra de tamanho 1000 com os valores
    #contidos no vetor y
x # exibe a amostra
```

```
##      [1] 6 4 4 2 7 4 7 6 1 4 6 3 4 0 8 7 9 5 3 3 0 9 2 8 0 3 0 7 8 2 3 5 7 7
##      [35] 0 2 5 6 9 6 9 4 8 7 8 9 3 6 3 8 3 9 0 6 3 5 3 5 3 0 7 4 3 1 3 8 6 0
##      [69] 2 1 1 4 2 4 6 0 3 3 9 2 3 5 1 6 4 2 8 9 9 0 4 7 9 3 5 3 7 0 0 9 1 9
##     [103] 8 3 5 8 5 2 5 6 6 9 2 0 2 6 8 3 4 5 5 8 3 2 7 7 2 8 5 0 4 6 8 9 9 5
##     [137] 5 9 7 2 0 9 2 1 2 3 9 9 7 7 4 1 8 5 2 9 9 4 5 9 9 4 5 5 5 1 7 6 5 4
##     [171] 8 3 0 3 4 8 8 4 2 5 0 4 0 1 0 1 1 4 0 7 6 0 2 3 8 7 9 3 9 9 8 6 1 1
##     [205] 8 5 1 6 8 8 4 4 6 6 3 5 4 8 7 4 2 8 7 1 7 5 9 2 6 2 7 5 0 8 6 3 5 6
##     [239] 0 0 4 2 4 0 5 1 7 9 2 5 5 4 6 8 6 6 3 2 8 4 9 0 5 5 8 4 7 6 0 6 2 3
##     [273] 1 5 4 7 3 4 0 3 6 4 1 3 7 3 9 3 3 3 2 4 6 2 5 4 4 4 3 5 0 3 5 2 6 9
##     [307] 2 7 0 8 4 6 7 8 4 2 7 6 9 9 8 7 6 5 1 3 0 6 0 1 3 2 5 7 5 1 1 7 3 8
##     [341] 0 5 3 7 6 9 5 1 2 2 4 0 5 6 9 7 2 3 5 8 8 1 5 3 6 5 6 8 2 6 3 4 3 9
##     [375] 7 8 2 7 3 1 5 9 3 4 8 2 7 3 3 0 3 4 6 2 8 5 4 6 9 3 5 3 5 4 7 5 5 2
##     [409] 0 0 0 6 4 2 6 5 0 9 6 4 3 3 2 3 4 1 6 7 9 0 2 5 4 7 9 8 7 5 7 3 1 1
##     [443] 3 8 7 1 5 5 2 7 6 8 3 4 9 5 4 3 3 6 1 3 7 8 3 7 7 9 0 6 2 2 0 3 2 9
##     [477] 1 4 9 1 3 8 8 5 3 3 4 5 9 4 0 9 1 1 3 1 3 3 2 7 8 1 3 4 4 4 9 3 3 5
##     [511] 4 0 6 4 8 7 3 1 0 1 3 5 4 8 0 8 9 5 0 9 6 1 5 8 3 2 2 0 2 2 2 1 8 2
##     [545] 1 0 8 4 7 6 1 2 1 8 8 2 6 6 0 7 5 8 1 9 6 3 8 8 4 7 5 0 6 4 3 5 2 8
##     [579] 3 6 5 3 5 2 7 1 1 0 5 1 4 2 1 1 9 7 9 6 2 2 7 1 4 5 9 2 7 4 3 8 6 6
##     [613] 9 4 7 3 8 4 0 2 9 8 2 7 6 3 7 1 1 8 4 6 0 4 9 1 2 6 5 5 4 3 3 8 2 1
##     [647] 2 1 4 7 9 2 3 1 9 9 3 5 3 0 5 7 8 0 6 3 5 4 5 2 5 7 6 0 5 7 3 1 7 5
##     [681] 0 6 1 4 1 4 1 3 2 7 1 9 7 5 6 2 0 4 4 9 0 9 6 1 1 3 9 3 1 7 1 6 2 0
##     [715] 2 1 5 1 2 6 2 5 4 3 4 2 8 6 4 2 7 4 9 5 2 1 4 7 9 5 5 3 6 3 8 6 3 6
##     [749] 3 5 2 1 8 8 6 8 2 5 6 4 0 5 4 3 2 5 7 3 7 9 7 7 3 9 7 4 6 3 8 8 9 6
##     [783] 3 8 0 3 4 4 6 0 8 5 7 3 5 9 3 2 5 1 2 6 2 3 1 1 7 0 1 5 3 7 1 2 7 2
##     [817] 7 2 6 3 8 1 6 1 9 5 0 3 9 4 2 7 0 5 3 3 7 5 4 3 1 0 1 3 6 6 9 2 3 8
##     [851] 3 0 2 8 3 7 7 3 8 7 4 6 5 9 0 7 4 6 7 1 3 7 8 5 9 8 7 3 1 0 1 1 9 1
##     [885] 9 9 1 8 7 3 7 0 8 6 5 7 9 7 7 4 0 0 6 9 6 7 1 8 9 4 0 9 6 6 3 5 3 7
##     [919] 0 7 5 3 5 5 7 3 6 6 8 1 5 9 8 2 7 8 2 4 8 2 4 5 3 8 4 7 9 9 2 0 0 7
##     [953] 6 2 9 8 4 9 9 6 4 4 7 1 3 1 0 0 9 2 4 8 4 2 3 2 1 3 2 0 6 5 2 1 1 3
##     [987] 8 7 4 3 8 9 5 8 1 0 2 5 5 8
```

Calculando probabilidade binomial:

Os comandos a seguir mostram como calcular a probabilidade binomial quando X esta em uma distribuição binomial com $n = 10$ e $\pi = 0,6$.

```
dbinom(3,10,.6) #calcula a probabilidade P(X=3)

## [1] 0.04246733

pbinom(3,10,.6) #calcula a probabilidade P(X<=3)

## [1] 0.05476188

# Calcula a probabilidade de P(X=k) para k = 0, 1, 2, ..., 10
k = c(0:10)
dbinom(k,10,.6)

## [1] 0.0001048576 0.0015728640 0.0106168320 0.0424673280 0.1114767360
## [6] 0.2006581248 0.2508226560 0.2149908480 0.1209323520 0.0403107840
## [11] 0.0060466176
```

Calculando probabilidade de Poisson:

Os comandos a seguir mostram como calcular a probabilidade de Poisson quando Y esta em uma distribuição binomial com $\lambda = 10$ e $\pi = 0,6$.

```
dbinom(3,10,.6) #calcula a probabilidade P(Y=3)

## [1] 0.04246733

pbinom(3,10,.6) #calcula a probabilidade P(Y<=3)

## [1] 0.05476188

# Calcula a probabilidade de P(Y=3)$ para k = 0, 1, 2, ..., 10
k = c(0:10)
dbinom(k,10,.6) #calcula a probabilidade P(X=3)

## [1] 0.0001048576 0.0015728640 0.0106168320 0.0424673280 0.1114767360
## [6] 0.2006581248 0.2508226560 0.2149908480 0.1209323520 0.0403107840
## [11] 0.0060466176
```

Calculando probabilidade normal:

Os comandos a seguir mostram como calcular a probabilidade quando X esta em uma distribuição normal com $\mu = 23$ e $\sigma = 5$.

```
pnorm(18,23,5) #calcula a probabilidade P(X<=18)

## [1] 0.1586553

1-pnorm(18,23,5) #calcula a probabilidade P(X>18)

## [1] 0.8413447

qnorm(.85,23,5) #calcula o 85o percentil

## [1] 28.18217
```


Gerando uma amostra da distribuição média \bar{y} :

Os comandos em R a seguir simulam uma amostragem da distribuição da média \bar{y} . Serão gerados 10000 valores para a média \bar{y} . Cada valor (dos 10000) é gerado como sendo a média de uma amostra aleatória de tamanho 16 de uma população com distribuição normal cuja média é $\mu = 43$ e $\sigma = 7$. Posteriormente é possível verificar os valores gerados, o histograma, a média e o desvio padrão dos 10000 valores.

```
r=10000
y=rep(0,16)
ybar16=rep(0,r)
for(i in 1:r){
  y = rnorm(16,43,7) #gera uma amostra normal de tamanho 16 da população
  ybar16[i] = mean(y) #calcula a média da amostra
}
head(ybar16) #exibe os primeiros elementos da amostra
```

```
## [1] 42.54150 42.55532 39.92366 42.15789 42.91623 42.29954
```

```
hist(ybar16, border="deepskyblue2") #exibe o histograma da amostra
```



```
mean(ybar16) #exibe a média da amostra
```

```
## [1] 43.01791
```


```
sd(ybar16) #exibe o desvio padrão da amostra
```

```
## [1] 1.734134
```

Gerando a plotagem do gráfico 4.28 do livro.

```
y = c(133, 137, 148, 149, 152, 167, 174, 179, 189, 192, 201, 209, 210, 211, 218, 238, 245,
      248, 253, 257)
y=sort(y)
n=length(y)
i=1:n
u=(i-0.375)/(n+0.25)
x=qnorm(u)
plot(x,y,xlab="Normal quantiles", ylab="Cholesterol readings", lab=c(7,8,7),
     ylim=c(100,280), main="Normal Reference Ditribution Plot\n Cholesterol readings",
     cex =.95, col="deepskyblue2")
abline(lm(y~x), col="deepskyblue2")
```

**Normal Reference Ditribution Plot
Cholesterol readings**



```
cor(x,y) #calcula a correlação entre as variáveis
```

```
## [1] 0.9818437
```