

TREC & KREC of twins: Decomposing the covariance matrix

Henrique Aparecido Laureano* Wagner Hugo Bonat[†]

Stéphanne Maria Jeha Bortoletto[‡]

Carolina Cardoso de Mello Prando[§]

August, 2022

Abstract

Keywords:

Introduction

Methods

Data

Statistical analysis

The statistical analysis was performed through the R (R Core Team 2022) language and environment for statistical computing.

Modelos multivariados de regressão feitos para lidar com as interrelações genéticas e ambientais de dados de gêmeos (Bonat and Hjelmberg 2022) foram aplicados para entender a dinâmica das medidas de TREC e KREC.

*Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brazil

[†]Laboratório de Estatística e Geoinformação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil

[‡]Faculdades Pequeno Príncipe & Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brazil

[§]Faculdades Pequeno Príncipe & Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, Curitiba, Paraná, Brazil

The main used R packages are: `{dplyr}` (Wickham et al. 2022), `{stringr}` (Wickham 2019), `{ggplot2}` (Wickham 2016), `{tidyr}` (Wickham and Girlich 2022), `{broom}` (Robinson, Hayes, and Couch 2022) and `{mglm4twin}` (Bonat 2022, 2018; Bonat and Hjelmberg 2022; Bonat and Jorgensen 2016).

Results

Modelamos as medidas de TREC e KREC conjuntamente em duas frentes: na média e na variância. Como temos mais de uma variável e vamos também modelar a correlação entre elas, chamamos de covariância.

Para estudar a herdabilidade e o relacionamento genético e ambiental das medidas, usamos um modelo chamado de ACE. Basicamente, decompomos a matriz de variância-covariância (a partir daqui chamaremos simplesmente de matriz de covariância) em três matrizes:

- A: efeito/componente genético/herdabilidade;
- C: efeito/componente mútuo do ambiente (common environment);
- E: efeito/componente único do ambiente (unique environment).

Além de considerarmos essa decomposição da covariância podemos também colocar covariáveis nela.

Tanto na média quanto na covariância usamos/testamos o efeito de seis covariáveis:









- Peso;
- Idade gestacional;
- Tipo de parto;
- Sexo;
- Zigocidade;
- Gêmeo (1 ou 2, para ver se realmente existe uma aleatoriedade na disposição dos dados).

A zigocidade é um termo chave dessa modelagem, dado que precisamos informar quantos pares de gêmeos são monozigotos e dizigotos. Portanto, o par que não tem essa informação foi descartado. Ficamos/usamos 198 gêmeos.

Automatic initial values selected.

Automatic initial values selected.

Automatic initial values selected.



Começamos com um modelo bivariado ACE, modelando TREC e KREC conjuntamente. Contudo, observamos valores- p muito altos para o componente C. Tal fato indica que tal componente não é necessário. Portanto, ajustamos um modelo AE e vemos se é melhor ficar com ele. Abaixo temos algumas medidas de qualidade do ajuste dos dois modelos.

De modo geral, o modelo ACE apresenta melhores medidas. Contudo ele tem três parâmetros a mais. A diferença das medidas entre os modelos não é grande o suficiente para justificar permanecermos com um modelo maior sendo que o componente C não é estatisticamente significativo. Assim, ficamos com o modelo bivariado AE.

Agora, a seleção de variáveis. Começamos pela média. Das seis variáveis ficamos com apenas duas, ou seja, das seis apenas duas se mostram significativas. As medidas do modelo inicial e

	Estimates	std.error	z value	Pr(> z)
TREC				
(Intercept)	-97.1912	127.8171	-0.7604	0.4470
id_gest	8.0203	3.5627	2.2512	0.0244
sexoMasculino	-34.7133	15.0805	-2.3019	0.0213
KREC				
(Intercept)	-160.7853	126.7882	-1.2681	0.2047
id_gest	7.7597	3.5385	2.1929	0.0283

	Estimates	std.error	Percentage	z value	Pr(> z)
Environment component (E)					
TREC	3712.4482	2751.5400	27.1019	1.3492	0.1773
KREC	1391.8790	4100.7340	10.0955	0.3394	0.7343
TREC & KREC	862.7034	490.8413	19.6407	1.7576	0.0788
Genetic component (A)					
TREC	8703.5756	3370.8550	63.5385	2.5820	0.0098
KREC	9990.1531	5750.4968	72.4603	1.7373	0.0823
TREC & KREC	2633.3467	1090.5257	59.9521	2.4147	0.0157

do final são apresentadas abaixo.

Vemos que as medidas dos modelos são bem similares, apesar do modelo final ter praticamente metade dos parâmetros do modelo inicial. No modelo final ficamos com duas covariáveis como significativas para o TREC e com uma variável significativa para o KREC.

Para TREC as variáveis significativas são a idade gestacional e o sexo, i.e. a idade gestacional e o sexo do gêmeo tem uma associação significativa com o valor de TREC. Para o KREC, apenas a idade gestacional é significativa, o sexo é irrelevante (sem diferença significativa de um sexo para outro).

Para o TREC, o intercepto corresponde a um gêmeo de idade gestacional média e do sexo feminino. Conforme aumentamos a idade gestacional aumentamos seu TREC no valor de seu coeficiente estimado (8.0203). Se o gêmeo é do sexo masculino, estimamos que seu TREC diminua 34.7133, em relação ao intercepto. Mesma ideia para o KREC e a idade gestacional.

Agora, a covariância. Decompomos a variância do TREC (1.3698107×10^4), a variância do KREC (1.3787069×10^4) e a covariância entre os dois (4392.4173) da seguinte maneira.

Temos as estimativas divididas pelos componentes ambiental e genético. Como podemos ver pela coluna percentage, a soma das estimativas (do TREC, por exemplo) não dá 1. Isso

	Estimates	std.error	z value	Pr(> z)
Environmentability				
TREC	0.2990	0.2096	1.4267	0.1537
KREC	0.1223	0.3634	0.3365	0.7365
Heritability				
TREC	0.7010	0.2096	3.3449	0.0008
KREC	0.8777	0.3634	2.4155	0.0157

	Estimates	std.error	z value	Pr(> z)
Bivariate environmentability	0.2468	0.1580	1.5619	0.1183
Environment correlation	0.3795	0.5943	0.6386	0.5231
Bivariate heritability	0.7532	0.1580	4.7676	0.0000
Genetic correlation	0.2824	0.1397	2.0209	0.0433

quer dizer que nem toda a variabilidade observada é explicada pelo componente ambiental ou genético. Vemos que o componente genético é muito mais significativo, principalmente no TREC.

Abaixo temos as medidas de ambientalidade e herdabilidade. Vemos que apenas a herdabilidade é significativa, para ambos TREC e KREC.

A única correlação significativa é a genética, a ambiental não é. Seguindo a mesma ideia, a herdabilidade bivariada/conjunta é significativa. A ambiental não é.

Tentamos verificar o efeito das covariáveis também na covariância, mas não conseguimos. Não conseguimos convergência. Solução? Ajustar modelos univariados. Os componentes de média se mantêm exatamente os mesmos.

TREC

Partimos do modelo AE com idade gestacional e sexo como covariáveis na média e fizemos a seleção de covariáveis na covariância. Das seis covariáveis nenhuma é significativa no componente E, ambiental. No componente A, genético, a variável parto é significativa.

	Estimates	Std.error	Percentage
Environment component (E)	3534.162	2773.739	25.8004
Genetic component (A)			
partoCesariana	9851.598	3647.523	71.9194
partoNormal	-10976.948	3140.646	-80.1348

	Estimates	Std.error	Percentage
Environment component (E)			
partoCesariana.zigocidadeDZ	-8562.138	3940.7251	-62.1027
partoNormal	9185.825	4003.8748	66.6264
zigocidadeMZ	9829.275	609.2463	71.2934
Genetic component (A)			
partoCesariana	22781.346	3823.2523	165.2371
partoNormal	-22636.617	3909.9002	-164.1873

26% da variabilidade observada é explicada/atribuída pelo componente ambiental. O tipo de parto é significativo no componente genético. Com um gêmeo que teve parto do tipo cesaria, o componente genético explica 72% da variabilidade. Ou seja, os componentes ambiental e genético explicam cerca de 98% de toda a variabilidade da variável TREC. Agora, num gêmeo que teve parto normal, (o poder de) explicação cai 80%. Ou seja, num gêmeo com parto normal o componente genético não explica nada da variabilidade. Isso é justificado pela (baixa) representatividade nos dados, 7.0707071% apenas dos gêmeos tiveram parto normal.

KREC

Partimos do modelo AE com idade gestacional como covariável na média e fizemos a seleção de covariáveis na covariância. Das seis covariáveis, tipo de parto e zigocidade são significativas no componente E, ambiental. No componente A, genético, a variável parto é significativa.

Num gêmeo com parto tipo cesaria e dizigoto, nada da variabilidade do KREC é explicada pelo componente ambiental (-62%). Contudo, se mudamos para um gêmeo de parto normal a explicação cresce 66%, ou seja, 4% (-62 + 66) da variabilidade é explicada pelo componente ambiental. Num gêmeo monozigoto o percentual explicado é 9% (-62 + 71).

Quando olhamos para o componente genético a diferença entre tipos de parto é abismal. Num gêmeo dizigoto de parto tipo cesaria temos 103% (-62 + 165) da variabilidade unicamente explicada pelo componente genético. Tal efeito é tão grande mas ao mesmo incerto, que o percentual estoura. No caso de parto normal temos exatamente o contrário. O desbalancamento das frequências de tipo de parto na base de dados acaba gerando esses resultados “estranhos”.

References

Bonat, Wagner Hugo. 2018. “Multiple Response Variables Regression Models in R: The mcglm Package.” *Journal of Statistical Software* 84 (4): 1–30. <https://doi.org/10.18637/jss.v084.i04>.

- . 2022. *mglm4twin: Multivariate Generalized Linear Models for Twin Data*. R package version 0.3.0. <https://github.com/wbonat/mglm4twin>.
- Bonat, Wagner Hugo, and Jacob V. B. Hjelmberg. 2022. “Multivariate Generalized Linear Models for Twin and Family Data.” *Behavior Genetics* 52 (2): 123–40. <https://doi.org/10.1007/s10519-021-10095-3>.
- Bonat, Wagner Hugo, and Bent Jorgensen. 2016. “Multivariate Covariance Generalized Linear Models.” *Journal of Royal Statistical Society - Series C* 65: 649–75.
- R Core Team. 2022. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.
- Robinson, David, Alex Hayes, and Simon Couch. 2022. *broom: Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles*. R package version 0.8.0. <https://CRAN.R-project.org/package=broom>.
- Wickham, Hadley. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. ISBN 978-3-319-24277-4. <https://ggplot2.tidyverse.org>.
- . 2019. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. R package version 1.4.0. <https://CRAN.R-project.org/package=stringr>.
- Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, and Kirill Müller. 2022. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.0.9. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.
- Wickham, Hadley, and Maximilian Girlich. 2022. *tidyr: Tidy Messy Data*. R package version 1.2.0. <https://CRAN.R-project.org/package=tidyr>.