




UNIDADE I

Análise Matemática

Prof. Me. Rene Ignácio

Apresentação

- Profissional de ciência da computação tem que resolver problemas físicos do mundo real.
- Deve conhecer ferramentas matemáticas para construir modelos computacionais.
- Modelar um problema físico, obter um modelo matemático, determinar a solução numérica do modelo criado:



Fonte: Adaptado de: livro-texto.

- A fase de obtenção da solução do modelo matemático usa conceitos matemáticos: derivadas, integrais, equações diferenciais e séries numéricas.

Exemplo de um problema físico

Aquecer água que circula dentro de uma tubulação de metal:



Fonte: Autoria própria.

Modelo matemático permitirá determinar a temperatura de saída da água quente a partir das variáveis:

- Temperatura e vazão da água de entrada.
- Comprimento da tubulação.
- Quantidade de calor fornecido.

Introdução

Veremos os principais conceitos relacionados às séries numéricas:

- Começamos com o estudo das sequências infinitas e suas propriedades.
- Depois, o conceito de séries infinitas e seus critérios de convergência.
- E, por fim, as séries de potências.

Sequências

Sequências de ações comuns no dia a dia:

Rotina matinal:

- Acordar, levantar da cama, escovar os dentes, tomar banho, se vestir, tomar café da manhã e sair de casa.

Trabalhar em um projeto:


- Definir os objetivos, pesquisar informações relevantes, criar um plano de ação, executar as tarefas, avaliar os resultados e fazer ajustes, se necessário.

Fazer uma viagem:

- Planejar o roteiro, comprar as passagens, reservar hospedagem, preparar as malas, ir ao aeroporto ou à rodoviária, viajar e aproveitar o destino.

Figuras


Sequência de figuras:



Fonte: livro-texto.




Fonte: Autoria própria.




Fonte: Autoria própria.

Imagens digitais


Sequências na era do computador: envolvem sequências numéricas \times cores \times matrizes.



Fonte: livro-texto.



Fonte: livro-texto.



Fractal Mandelbrot.

Fonte: Adaptado de:

<http://math.ymsh.tp.edu.tw/Home/gallery/mandelbrot>

Somas infinitas: dízimas periódicas

$$\frac{1}{3} = 0,333 \dots = 0,\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n}$$

$$\frac{2}{3} = 0,666 \dots = 0,\overline{6} = \frac{6}{10} + \frac{6}{100} + \frac{6}{1000} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{10^n}$$

$$\frac{12}{99} = \frac{4}{33} = 0,121212 \dots = 0,\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{10000} + \frac{12}{1000000} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{100^n}$$

$$\frac{123}{999} = \frac{41}{333} = 0,123123 \dots = 0,\overline{123} = \frac{123}{1000} + \frac{123}{1000000} + \frac{123}{1000000000} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{123}{1000^n}$$

Fonte: Autoria própria.

O número pi (π) não pode ser expresso como uma fração, é um número irracional.

Mas é possível usar frações aproximadas:

$$\frac{22}{7} = 3\frac{1}{7} \cong \pi \text{ (erro de 0,04\%)}$$

$$\frac{335}{113} = 3\frac{16}{113} \cong \pi \text{ (erro de 0,000008\%)}$$

Sequências numéricas

- São conjuntos de números que seguem uma determinada ordem ou padrão.

Podem ser criadas:

Pela adição/subtração de um número constante:

3, 6, 9, 12, 15 (cada termo é obtido adicionando 3 ao termo anterior).

Pela multiplicação/divisão de um número constante:

2, 4, 8, 16, 32 (cada termo é obtido multiplicando o termo anterior por 2).

Pelo uso de funções matemáticas para gerar os termos:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots$$

(série de Taylor para o seno de x)

Notação

- A notação de sequência é usada para representar uma lista ordenada de números que seguem um determinado padrão ou regra.
- Geralmente, tem a forma: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
- a_1 é o primeiro termo da sequência,
- a_2 é o segundo termo da sequência, e assim por diante,
- até o último termo a_n .

Para representar o enésimo termo das sequências numéricas, usaremos a notação:

- $a(n) = a_n = \{a_n\}$
- Exemplo: $\{a_n\} = \{n + 1\}$
- $n = 1 \Rightarrow a_1 = 1 + 1 = 2$ (1º termo da sequência)
- $n = 2 \Rightarrow a_2 = 2 + 1 = 3$ (2º termo da sequência)
- $n = 3 \Rightarrow a_3 = 3 + 1 = 4$ (3º termo da sequência)

Classificação das sequências numéricas

- As sequências numéricas podem ser classificadas em finitas e infinitas.
- Finitas – têm um número máximo de termos que não pode ser aumentado.
- $\{0,5,10,15\}$
sequência dos quatro primeiros números naturais múltiplos de 5,
pode ser indicada pelos termos $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$.
- $\{a_n\} = \{3n | n \text{ é número natural e } 2 \leq n \leq 7\} = \{6,9,12,15,18\}$
 - Vantagens: facilidade de cálculo, memorização, visualização, análise e eficiência computacional.
 - Desvantagens: limitações de modelagem, limitações de previsão e limitações de generalização.

Classificação das sequências numéricas

- Infinitas – têm número infinito de termos.
- A sequência pode continuar indefinidamente e nunca chegar a um fim.
- $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$
sequência dos números naturais ímpares pode ser indicada pelos termos
 $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots, a_n, \dots\}$
- $\{a_n\} = \{3n | n \geq 0\} = \{0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$
 - Vantagens: representar quantidades muito grandes, modelar fenômenos complexos.
 - Desvantagens: difícil manipulação matemática, podem não ser aplicáveis na prática.

Interatividade

Uma sequência numérica começa com 1 e continua com a soma do número anterior com o dobro do número anterior. Qual é o quinto número da sequência?

- a) 3.
- b) 81.
- c) 27.
- d) 161.
- e) 243.

Resposta

Uma sequência numérica começa com 1 e continua com a soma do número anterior com o dobro do número anterior. Qual é o quinto número da sequência?

- a) 3.
- b) 81.
- c) 27.
- d) 161.
- e) 243.

A sequência começa em 1 e a partir do 2º termo:

$$\{a_n\} = \{a_{n-1} + 2 \times a_{n-1}\}$$

$$\{1, 3, 9, 27, 81, 243, \dots\}$$

O quinto termo é 243.

Sequências numéricas infinitas

Lista de números escritos em uma ordem definida:

- $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots, a_n, \dots\}$.
- a_1 é o primeiro termo da sequência.
- a_2 é o segundo termo da sequência.
- a_n é o enésimo termo da sequência.

O primeiro termo também pode ser representado por a_0 :

- $\{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_n, \dots\}$


Exemplo 1

$$\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\}$$

Os termos desta sequência são:

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$$

- Observe que os termos da sequência diminuem constantemente, chegando cada vez mais próximo de 0 (zero).



Representação geométrica da sequência

$$\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\}$$

Fonte: Adaptado de: livro-texto.

- Dizemos que a sequência converge para 0.


Exemplo 2

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}$$

Os termos desta sequência são:

$$\left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots \right\}$$

- Agora, os termos da sequência tendem a 1 (um) quanto maior for o valor de n .



Representação geométrica da sequência

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}$$

Fonte: Adaptado de: livro-texto.

- Aqui dizemos que a sequência converge para 1.


Exemplo 3

$$\{a_n\} = \{5\}$$

Os termos desta sequência são:

$\{5, 5, 5, 5, 5 \dots\}$

- Os termos da sequência mantêm o mesmo valor quanto maior for o valor de n .



Representação geométrica da sequência

$$\{a_n\} = \{5\}$$

Fonte: Adaptado de: livro-texto.

- Agora dizemos que a sequência converge para a constante 5.


Exemplo 4

$$\{a_n\} = \left\{ (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right) \right\}$$

Os termos desta sequência são:

$$\left\{ 0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$$

- Observe que os termos dessa sequência têm o sinal alternado quanto maior for o valor de n .



Representação geométrica da sequência

$$\{a_n\} = \left\{ (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right) \right\}$$

Fonte: Adaptado de: livro-texto.

- Os termos positivos se aproximam de 1 e os termos negativos se aproximam de -1.
- Neste caso, a sequência é divergente.

Sequências infinitas

- Nem todas sequências têm uma equação simples.
- Sequência de Fibonacci.
- Leonardo Fibonacci a descreveu no século XIII, quando a usou para modelar o crescimento de uma população de coelhos.
- $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21, \dots\}$
- $f_1 = 1, f_2 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
 - A sequência de Fibonacci aparece em muitas áreas da matemática e da ciência, incluindo a geometria, a teoria dos números, a biologia, a física e até mesmo a análise técnica do mercado financeiro.

Limite de sequências infinitas

- Sequências numéricas convergem e outras divergem.
- Limites de sequências numéricas são utilizados em análise matemática para determinar o comportamento de uma sequência à medida que o número de termos aumenta infinitamente.
- O limite de uma sequência é o valor para o qual a sequência converge ou se aproxima à medida que o número de termos aumenta.
 - Notação: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
 - A sequência tende ao limite L quando n tende ao infinito.

Importância dos limites de sequências numéricas

Análise de algoritmos:

- Em ciência da computação, são usados para analisar o desempenho de algoritmos. O tempo de execução de um algoritmo pode ser descrito como uma sequência numérica, e o limite dessa sequência pode ser usado para determinar a eficiência do algoritmo.
- Exemplo: Algoritmo itera sobre cada elemento de um vetor ordenado e verifica se ele corresponde ao elemento procurado.
- O tempo de execução pode ser descrito como a sequência $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots, a_n, \dots\}$, em que a_n é o tempo necessário para procurar um elemento em um vetor de tamanho n .

Análise financeira:

- As taxas de juros são representadas como sequências numéricas, e o limite pode ser usado para prever o retorno do investimento a longo prazo.

Limite

- O limite é um conceito fundamental da análise matemática que descreve o comportamento de uma sequência numérica à medida que seu índice aumenta.
- É um número que a sequência se aproxima à medida que seu índice aumenta infinitamente. Esse número não precisa estar presente na sequência.

Sequência dos inversos dos números naturais:

$$\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$$

Conforme o índice aumenta, a sequência se aproxima de zero, mas nunca alcança zero!

Usando o limite:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
- Portanto, dizemos que o limite da sequência é zero.
- É uma sequência convergente.

Divergência

- Uma sequência diverge quando não há um número L para o qual a sequência se aproxima à medida que n aumenta.

Divergente positiva:

- Se ela aumenta sem limites à medida que o índice n aumenta infinitamente.
 $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$.

Divergente negativa:

- Se ela diminui sem limites à medida que o índice n aumenta infinitamente.
 $\{-1, -2, -3, -4, \dots\}$.

Nestes dois casos, temos:

- Divergência positiva: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$
- Divergência negativa: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

Interatividade

Zenão, filósofo grego, século V a.C., criou o paradoxo da corrida: para percorrer uma distância finita, é preciso antes percorrer uma metade dessa distância. E, antes disso, é preciso percorrer metade dessa metade, e assim por diante. Com base nisso, está correto afirmar que:

- a) É uma sequência infinita e convergente.
- b) É impossível percorrer uma distância finita, pois sempre há uma metade a percorrer antes.
- c) É uma sequência infinita e divergente.
- d) A velocidade dos corredores diminui pela metade a cada nova distância percorrida.
- e) É uma sequência finita.

Resposta

Zenão, filósofo grego, século V a.C., criou o paradoxo da corrida: para percorrer uma distância finita, é preciso antes percorrer uma metade dessa distância. E, antes disso, é preciso percorrer metade dessa metade, e assim por diante. Com base nisso, está correto afirmar que:

- a) É uma sequência infinita e convergente.
- b) É impossível percorrer uma distância finita, pois sempre há uma metade a percorrer antes.
- c) É uma sequência infinita e divergente.
- d) A velocidade dos corredores diminui pela metade a cada nova distância percorrida.
- e) É uma sequência finita.

Exemplo usando as leis do limite

$$\{a_n\} = \{n + 3\}$$

Propriedades:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n &= \infty \\ \lim_{n \rightarrow \infty} k &= k \end{aligned} \right\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + 3) = \lim_{n \rightarrow \infty} n + \lim_{n \rightarrow \infty} 3 = \infty + 3 = \infty$$

- Logo, a sequência é divergente.

Teorema do confronto

- Ideia: aprisionar uma sequência dentro de outras duas conhecidas.
 - Sequências numéricas: $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$
 - $\{a_n\}$ e $\{c_n\}$ convergem para o mesmo limite L
 - Para todo n : $a_n \leq b_n \leq c_n$
 - Então, a sequência $\{b_n\}$ também converge para L .
-
- Observe que as sequências $\{a_n\}$ e $\{c_n\}$ "aprisionam" a sequência $\{b_n\}$.
 - Cada termo de $\{a_n\}$ é menor ou igual ao correspondente termo de $\{b_n\}$.

Então, usando limites:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$


Exemplo com o teorema do confronto

$\{a_n\} = \left\{ \frac{\cos n}{n} \right\}$ Converge ou diverge?

O cosseno é uma função que relaciona um ângulo com um número real entre -1 e 1:

$$-1 \leq \cos n \leq 1$$

- Dividindo todos os membros por n :
$$\frac{-1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$$
- Aplicando o limite a cada termo:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$



Fonte: Autoria própria.

- Já sabemos que:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = 0$$
- Portanto:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$$
- Sequência convergente.

Regra de L'Hôpital para limite de sequências numéricas

Técnica que pode ser aplicada a sequências numéricas quando:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{g(b_n)} = \frac{0}{0} \quad \text{ou} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{g(b_n)} = \frac{\infty}{\infty}$$

Proposta – calcular o limite do quociente das derivadas para obter o limite original:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(a_n)}{g'(b_n)}$$

Assim, podemos usar a seguinte regra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{g(b_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(a_n)}{g'(b_n)}$$

Exemplo com regra de L'Hôpital

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{\ln n}{n^2} \right\}$$

- Podemos usar a regra, pois temos um limite indeterminado: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = \frac{\infty}{\infty}$

Calcular o limite do quociente das derivadas para obter o limite original:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \times \frac{1}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{\infty} = 0$$

- Portanto, a sequência é convergente.


$$\{b_n\} = \left\{ \frac{n^2}{\ln n} \right\} \Rightarrow \text{é o inverso da } \{a_n\}, \text{ logo, divergente!}$$

Sequências crescentes

- Uma sequência numérica é crescente se cada termo subsequente é maior ou igual ao termo anterior.

Por exemplo, a sequência:

- $\{a_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- É crescente, porque cada termo subsequente é maior do que o termo anterior.
- Seus termos crescem indefinidamente.




Sequências decrescentes

- Uma sequência numérica é decrescente se cada termo subsequente é menor ou igual ao termo anterior.

Por exemplo, a sequência:

- $\{a_n\} = \{5, 4, 3, 2, 1, \dots\}$
- É decrescente, porque cada termo subsequente é menor do que o termo anterior.
- Seus termos diminuem indefinidamente.



Sequências limitadas

- É uma sequência que está "presa" entre dois valores finitos, e seus termos não divergem para o infinito.
- $L \leq a_n \leq M$
- $a_n = (1, 2, 3, 4, 5)$
é limitada: termos estão entre 1 e 5.
- $b_n = (-1, -2, -3, \dots, -n)$
é limitada: termos são menores ou iguais a -1 e maiores ou iguais a -n.

Soma de uma série infinita

Matematicamente, a soma de uma série infinita é definida como o limite da soma dos seus n primeiros termos quando n tende ao infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n)$$

- Se o limite existe e é finito, a série infinita é convergente e sua soma é o valor do limite.
- Caso contrário, a série é divergente e não tem uma soma finita.
- Usamos o termo “série infinita” em vez de “soma infinita”.

Problema das séries infinitas:

Determinar quais são convergentes e quais são divergentes!

Somas parciais

É uma sequência infinita de números obtida pela soma acumulada dos primeiros termos da sequência numérica original:

- $S_1 = a_1$
- $S_2 = a_1 + a_2$
- $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$
- \vdots
- $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum a_n$
 - $\{a_n\} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
 - $\{S_1, S_2, S_3, \dots\} = \{1, 3, 6, 10, 15, \dots\}$
 - Cada elemento da sequência construída são somas parciais.

Limite de somas parciais

- Na análise de uma sequência de números que cresce rapidamente, a sequência original pode parecer caótica e difícil de entender.
- Usando somas parciais, podemos começar a ver um padrão emergir até mesmo determinar se a sequência original converge ou diverge.
- Aplicando limites, podemos entender a sequência original:

$$\text{Convergência: } \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L \right\rangle \Rightarrow \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \right\rangle$$

$$\text{Divergência: } \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty \right\rangle \Rightarrow \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty \right\rangle$$

Interatividade

A alternativa correta que define soma parcial é:

- a) A soma dos primeiros n termos da série infinita.
- b) A soma dos termos ímpares da série infinita.
- c) A soma dos termos pares da série infinita.
- d) A soma dos últimos n termos da série infinita.
- e) A soma dos termos consecutivos da série infinita.

Resposta

A alternativa correta que define soma parcial é:

- a) A soma dos primeiros n termos da série infinita.
- b) A soma dos termos ímpares da série infinita.
- c) A soma dos termos pares da série infinita.
- d) A soma dos últimos n termos da série infinita.
- e) A soma dos termos consecutivos da série infinita.

Exemplo usando somas parciais

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \dots$$

$$S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

$$S_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} = \frac{4}{5}$$

Os quatro primeiros termos das somas são: $\left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots\right\}$ padrão $\longrightarrow, S_n = \frac{n}{n+1}$

Usando limites e a regra de L'Hôpital:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n)'}{(n+1)'} = 1$$

Logo, a série infinita converge:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Série geométrica

- Série infinita em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma razão.

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + a.r + a.r^2 + \dots + a.r^{n-1} + \dots$$

$$\boxed{\text{Razão geométrica: } r} \therefore \boxed{|r| < 1 \Rightarrow \text{converge} \Rightarrow S = \frac{a}{1-r}} \therefore \boxed{|r| > 1 \Rightarrow \text{diverge}}$$

Exemplo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{10^n} = \frac{5}{10} + \frac{5}{10^2} + \frac{5}{10^3} + \dots = \frac{5}{10} + \frac{5}{10} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^1 + \frac{5}{10} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \dots + \underbrace{\frac{5}{10}}_a \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}}_{r < 1}$$

Esta série geométrica converge e a soma é:

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{5}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{5}{9}$$

Série telescópica

Série infinita de termos que se cancelam mutuamente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

- Todos os termos intermediários se cancelam, restando o primeiro e o último termo na soma.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 + \frac{1}{n+1}$$

Usando limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) = 1 + \frac{1}{\infty} = 1$$


- Esta série telescópica converge e a soma é 1.

Série harmônica

Série infinita cujos termos são os inversos dos números naturais:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

- É um exemplo clássico de uma série divergente.
- Cada termo desta série tende a zero quando o índice da sequência tende ao infinito.
- No entanto, a soma dos termos da série não converge para um valor finito.
- Isso ocorre porque, à medida que adicionamos mais termos, a soma aumenta sem limite.



Teste do enésimo termo para divergência

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}_{\text{convergente}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

No entanto, se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \nRightarrow$ não se pode afirmar que a série é convergente!
(Série harmônica).

$$\text{Regra} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \\ \text{ou} \\ \text{não existe} \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \text{ é divergente}$$

Teste da integral

Se a integral definida de uma função decrescente diverge, então a série infinita correspondente também diverge:

$$\begin{array}{ccc} \int_1^{\infty} f(x) dx & \Rightarrow & \sum_{n=1}^{\infty} a_n \\ \textit{converge} & \Rightarrow & \textit{converge} \\ \textit{diverge} & \Rightarrow & \textit{diverge} \end{array}$$

Série harmônica: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{1}{x} dx = \ln(x) \Big|_1^{\infty} = \ln(\infty) - \ln(1) = \infty - 0 = \infty$$

- Portanto, esta série harmônica é divergente.

P-séries (ou série hiper-harmônica)

Série cujos termos são os inversos das potências de um número natural maior que 1:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \Rightarrow \begin{cases} p > 1 \rightarrow \textit{convergente} \\ p \leq 1 \rightarrow \textit{divergente} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \Rightarrow p = 4 > 1 \rightarrow \textit{convergente}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow p = 1 \rightarrow \textit{divergente}$$

- Série harmônica.

O teste das séries alternadas (teorema de Leibniz)

Séries alternadas têm os termos alternadamente positivos e negativos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

Teste de Leibniz, uma sequência de termos positivos $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ deve satisfazer as seguintes propriedades, para ser convergente:

$$\boxed{a_n \geq a_{n+1}} \text{ (satisfaz: } 1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \dots)$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0} \text{ (satisfaz: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0)$$

- Portanto, esta série alternada é convergente.

Convergência absoluta e condicional

Uma série é dita convergente absoluta se a série dos valores absolutos de seus termos for convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots \text{ é convergente} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ é absolutamente convergente}$$

Por outro lado, é dita convergente condicional se a série converge apenas quando os valores absolutos dos termos da série são somados, mas não converge quando os termos são somados sem considerar seus sinais.

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots \text{ (série alternada)}$$

- É convergente: os termos diminuem e tendem a zero.
- Não é absolutamente convergente: a série dos valores absolutos é a série harmônica, que é divergente.

Teste da razão e da raiz

Teste da razão – divisão de dois termos consecutivos da série:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \Rightarrow \begin{cases} L < 1 \rightarrow \textit{absolutamente convergente} \\ L > 1 \text{ ou } \infty \rightarrow \textit{divergente} \\ L = 1 \rightarrow \textit{nada se pode afirmar, fazer outro teste} \end{cases}$$

Teste da raiz – utilização da raiz n-ésima de um termo da série:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \Rightarrow \begin{cases} L < 1 \rightarrow \textit{absolutamente convergente} \\ L > 1 \text{ ou } \infty \rightarrow \textit{divergente} \\ L = 1 \rightarrow \textit{nada se pode afirmar, fazer outro teste} \end{cases}$$

Interatividade

A série cujos termos são os inversos dos números naturais é chamada de:

- a) Série geométrica.
- b) Série aritmética.
- c) Série harmônica.
- d) Série telescópica.
- e) Série de Taylor.

Resposta

A série cujos termos são os inversos dos números naturais é chamada de:

- a) Série geométrica.
- b) Série aritmética.
- c) **Série harmônica.**
- d) Série telescópica.
- e) Série de Taylor.

ATÉ A PRÓXIMA!