

# CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bùi Tiến Lên

Đại học Khoa Học Tự Nhiên

01/01/2017



## KHÁI NIỆM ĐỒ THỊ

## NỘI DUNG

1. KHÁI NIỆM ĐỒ THỊ
2. KHÁI NIỆM BẬC CỦA ĐỈNH
3. MỘT SỐ DẠNG ĐỒ THỊ
4. CÁC QUAN HỆ GIỮA ĐỒ THỊ
5. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ
6. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DÂY CHUYỀN, ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH VÀ MẠCH
7. TÌM KIẾM, DUYỆT TRÊN ĐỒ THỊ
8. MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC TRÊN ĐỒ THỊ
9. ĐỒ THỊ CÓ TRỌNG SỐ
10. MỘT SỐ LOẠI ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG

## Đồ thị có hướng

### Định nghĩa 1.1

Đồ thị  $G$  được gọi là **đồ thị có hướng** (**directed graph**) được định nghĩa bởi

- ▶ Tập hợp các **đỉnh** (**vertex**)  $V \neq \emptyset$
- ▶ Tập hợp các **cạnh** (**edge**)  $E$
- ▶ Mỗi cạnh  $e \in E$  được liên kết với một cặp đỉnh  $(v_i, v_j)$ ,  $v_i$  được gọi là đỉnh đầu và  $v_j$  được gọi là đỉnh cuối

Đồ thị được ký hiệu  $G = (V, E)$

- ▶ Số lượng các đỉnh của  $V$  được gọi là **bậc** (**order**) của đồ thị  $G$
- ▶ Số lượng các cạnh của  $E$  được gọi là **kích thước** (**size**) của đồ thị  $G$

## Đồ thị có hướng (cont.)

### Lưu ý

Các đỉnh hoặc các cạnh của đồ thị có thể được

- ▶ Gán nhãn
- ▶ Gán màu
- ▶ Gán trọng số


Mục đích biểu diễn thông tin dữ liệu để giải quyết một bài toán nào đó

## Đồ thị có hướng (cont.)

### Định nghĩa 1.2

- ▶ **Cạnh khuyên** (**loop edge**) là cạnh có đỉnh cuối trùng với đỉnh đầu
- ▶ **Hai cạnh song song** (**multiple edges**) là hai cạnh có đỉnh đầu trùng nhau và đỉnh cuối trùng nhau

## Đồ thị có hướng (cont.)



**Hình 1.1:** Đồ thị có hướng 4 đỉnh và 9 cạnh. Hãy xác định cạnh khuyên và song song.


## Đồ thị vô hướng

### Định nghĩa 1.3

Đồ thị  $G$  được gọi là **đồ thị vô hướng** (**undirected graph**) được định nghĩa bởi

- ▶ Tập hợp các đỉnh  $V \neq \emptyset$
- ▶ Tập hợp các cạnh  $E$
- ▶ Mỗi cạnh  $e \in E$  được liên kết với một cặp đỉnh  $\{v_i, v_j\}$  không phân biệt thứ tự

## Đồ thị vô hướng (cont.)



**Hình 1.2:** Đồ thị vô hướng 4 đỉnh và 8 cạnh. Hãy xác định các cạnh khuyên và song song

## Đồ thị vô hướng (cont.)

### Định nghĩa 1.4

Đồ thị vô hướng có được bằng cách loại bỏ hướng của các cạnh của đồ thị có hướng được gọi là **đồ thị nền** (**underlying undirected graph**)

## Đồ thị vô hướng (cont.)



(a) đồ thị có hướng  $G$

(b) đồ thị vô hướng  $G'$


**Hình 1.3:** Đồ thị có hướng  $G$  và đồ thị nền vô hướng  $G'$

## Đồ thị hỗn hợp

### Định nghĩa 1.5

**Đồ thị hỗn hợp** (**mixed graph**) là đồ thị có cả cạnh có hướng và cạnh vô hướng

## Đồ thị hỗn hợp (cont.)



Hình 1.4: Đồ thị hỗn hợp 4 đỉnh và 6 cạnh

## Quan hệ kề

### Định nghĩa 1.6


Cho một đồ thị  $G = (V, E)$

**Quan hệ giữa đỉnh và đỉnh** Nếu hai đỉnh  $v_i$  và  $v_j$  được liên kết bằng một cạnh  $e$  thì hai đỉnh này được gọi là **kề (adjacent)** nhau

**Quan hệ giữa cạnh và cạnh** Nếu hai cạnh  $e_i$  và  $e_j$  có một đỉnh chung  $v$  thì hai cạnh này được gọi là **kề (adjacent)** nhau

**Quan hệ giữa cạnh và đỉnh** Khi một cạnh  $e$  là liên kết của cặp đỉnh  $(v_i, v_j)$  thì đỉnh  $v_i$  và  $v_j$  **kề, liên thuộc (incident)** với cạnh  $e$ , cạnh  $e$  **kề** với đỉnh  $v_i$  và đỉnh  $v_j$

## Quan hệ kề (cont.)




Hình 1.5: Đồ thị vô hướng 4 đỉnh và 5 cạnh. Hãy xác định mối quan hệ kề giữa đỉnh-đỉnh, cạnh-cạnh và liên thuộc giữa đỉnh-cạnh

## Quan hệ kề (cont.)


### Định nghĩa 1.7

Cho một đồ thị  $G = (V, E)$


- ▶ Tập hợp  $V' \subset V$  sao cho các đỉnh không kề nhau được gọi là **tập đỉnh độc lập (independent vertex set or stable set)**
- ▶ Tập hợp  $E' \subset E$  sao cho các cạnh không kề nhau được gọi là **tập cạnh độc lập (independent edge set or matching set)**
- ▶ Tập hợp  $V' \subset V$  sao cho các đỉnh đôi một kề nhau được gọi là **nhóm (clique)**



Hình 1.6: Các đỉnh  $\{a, e, g, j\}$  độc lập nhau



Hình 1.7: Các cạnh  $\{ab, ef, ij\}$  độc lập nhau



Hình 1.8: Các đỉnh  $\{a, b, c\}$  tạo thành một nhóm

## KHÁI NIỆM BẬC CỦA ĐỈNH

## Bậc của đỉnh

### Định nghĩa 1.8

Cho một đồ thị  $G$  **bậc** (**degree**) của một đỉnh  $v$  của đồ thị là tổng số các cạnh kề với đỉnh  $v$  (qui ước mỗi cạnh khuyên được tính 2 lần). Bậc của đồ thị ký hiệu  $\deg(v)$  hoặc  $d(v)$

- ▶ **Bậc cực đại** (**maximum degree**) của đồ thị  $G$  (ký hiệu là  $\Delta(G)$ ) là giá trị lớn nhất của bậc của các đỉnh của đồ thị  $G$ .
- ▶ **Bậc cực tiểu** (**minimum degree**) của đồ thị  $G$  (ký hiệu là  $\delta(G)$ ) là giá trị nhỏ nhất của bậc của các đỉnh của đồ thị  $G$

## Bậc của đỉnh (cont.)

### Định nghĩa 1.9

Cho một đồ thị có hướng  $G$  và đỉnh  $v$  của đồ thị


- ▶ **Nửa bậc ngoài** (**out-degree**) của đỉnh  $v$  là số cạnh đi ra khỏi đỉnh  $v$  và ký hiệu là  $d^+(v)$
- ▶ **Nửa bậc trong** (**in-degree**) của đỉnh  $v$  là số cạnh đi vào đỉnh  $v$  và ký hiệu là  $d^-(v)$

## Bậc của đỉnh (cont.)


### Định nghĩa 1.10

- ▶ **Đỉnh cô lập** (**isolated vertex**) là đỉnh có bậc bằng 0
- ▶ **Đỉnh treo** (**pendant vertex**) là đỉnh có bậc bằng 1
- ▶ **Cạnh treo** (**pendant edge**) là cạnh kề với đỉnh treo

## Bậc của đỉnh (cont.)



(a) Đồ thị vô hướng



(b) Đồ thị có hướng

Hình 1.9: Hãy xác định bậc của các đỉnh của các đồ thị

## Những định lý về bậc của đỉnh

### Định lý 1.1 (Định lý thứ nhất - định lý bắt tay)

Trong một đồ thị  $G = (V, E)$ , tổng của các bậc của các đỉnh bằng hai lần tổng số cạnh

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| \quad (1.1)$$

#### Chứng minh

- ▶ Nhận thấy mỗi cạnh  $e = (u, v)$  được tính một lần trong  $d(u)$  và một lần trong  $d(v)$ .
- ▶ Từ đó suy ra tổng tất cả các bậc của các đỉnh bằng hai lần số cạnh

■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Hệ quả 1.1

Số đỉnh bậc lẻ của một đồ thị là một số chẵn

#### Chứng minh

- ▶ Gọi  $V_{\text{even}}$  và  $V_{\text{odd}}$  tương ứng là tập các đỉnh bậc chẵn và tập các đỉnh bậc lẻ của đồ thị  $G = (V, E)$ . Khi đó

$$2|E| = \sum_{v \in V_{\text{even}}} d(v) + \sum_{v \in V_{\text{odd}}} d(v) \quad (1.2)$$

- ▶ Vế trái là một số chẵn và tổng thứ nhất cũng là một số chẵn nên tổng thứ hai là một số chẵn. Vì  $d(v)$  là lẻ với  $v \in V_{\text{odd}}$  cho nên số phần tử của  $V_{\text{odd}}$  phải là một số chẵn

■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định lý 1.2

Cho một đồ thị có hướng  $G = (V, E)$  ta có công thức sau

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E| \quad (1.3)$$

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định lý 1.3

Cho một đồ thị đơn có số đỉnh  $n \geq 2$  luôn tồn tại ít nhất hai đỉnh có cùng bậc

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định lý 1.4

Cho một đồ thị đơn có số đỉnh  $n \geq 3$  có đúng hai đỉnh cùng bậc thì hai đỉnh này không thể đồng thời có bậc 0 hoặc bậc  $n - 1$

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định nghĩa 1.11

Một dãy số nguyên không âm  $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$  được gọi là **khả đồ thị (graphical)** nếu tồn tại một đồ thị  $G$  sao cho dãy số này là bậc của các đỉnh của đồ thị

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định lý 1.5 (Định lý Havel & Hakimi)

Một dãy  $n$  số nguyên không âm và không tăng

$$\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

với  $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0$ ,  $n \geq 2$ ,  $d_1 \geq 1$  và  $d_{d_1+1} \geq 1$  là khả đồ thị nếu và chỉ nếu dãy  $n - 1$  số nguyên sau

$$\{d_2 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n\}$$

là khả đồ thị

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Những định lý về bậc của đỉnh (cont.)

### Định lý 1.6 (Định lý Erdos & Gallai)

Một dãy  $n$  số nguyên dương và không tăng

$$\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

là dãy bậc của một đồ thị đơn nếu và chỉ nếu dãy nó thỏa

$$\sum_{i=1}^k d_i \leq k(k+1) + \sum_{j=k+1}^n \min\{k, d_j\}$$

với mọi  $k = 1, \dots, n - 1$

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■



# MỘT SỐ DẠNG ĐỒ THỊ

## Giới thiệu

Đồ thị có thể là **đồ thị vô hạn** (**infinite graph**) hoặc **đồ thị hữu hạn** (**finite graph**). Trong môn học này chúng ta chỉ xem xét đồ thị hữu hạn. Có nhiều dạng đồ thị hữu hạn

- ▶ Đồ thị đơn
- ▶ Đồ thị rỗng
- ▶ Đồ thị đều
- ▶ Đồ thị đầy đủ
- ▶ Đồ thị phân đôi
- ▶ Đồ thị phân đôi, đủ
- ▶ Đồ thị vòng
- ▶ Đồ thị sao
- ▶ Đồ thị bánh xe
- ▶ Đồ thị n-lập phương

## Đồ thị đơn


### Định nghĩa 1.12

- ▶ **Đồ thị đơn** (**simple graph**) là đồ thị không có cạnh khuyên và không có cạnh song song
- ▶ **Đa đồ thị** (**multigraph**) là đồ thị có thể có cạnh khuyên và cạnh song song

## Đồ thị rỗng

### Định nghĩa 1.13

**Đồ thị rỗng** (**null graph**) là đồ thị có tập cạnh là tập rỗng




Hình 1.10: Các đồ thị rỗng

## Đồ thị đều

### Định nghĩa 1.14

**Đồ thị đều** (**regular graph**) là đồ thị đơn có các đỉnh cùng bậc. Gọi  $k$  là bậc của các đỉnh thì đồ thị được gọi là  $k$ -đều

## Đồ thị đều (cont.)



Hình 1.11: Các kiểu đồ thị  $k$ -đều

## Đồ thị đều (cont.)

### Tính chất 1.1


Đồ thị  $k$ -đều có  $n$  đỉnh thì sẽ có  $\frac{n \cdot k}{2}$  cạnh

## Đồ thị đầy đủ


### Định nghĩa 1.15

**Đồ thị đầy đủ** (**complete graph**) là đồ thị đơn mà giữa hai đỉnh bất kỳ đều có một cạnh nối chúng. Đồ thị đủ có  $n$  đỉnh được ký hiệu là  $K_n$ .


## Đồ thị đầy đủ (cont.)




(a) đồ thị  $K_3$



(b) đồ thị  $K_4$



(c) đồ thị  $K_5$



(d) đồ thị  $K_6$

Hình 1.12: Các kiểu đồ thị  $K_n$

## Đồ thị đầy đủ (cont.)

### Tính chất 1.2

- ▶ Đồ thị đầy đủ  $K_n$  sẽ có  $\frac{n(n-1)}{2}$  cạnh
- ▶ Đồ thị đơn với  $n$  đỉnh thì sẽ có tối đa là  $\frac{n(n-1)}{2}$  cạnh


## Đồ thị phân đôi

### Định nghĩa 1.16

Cho một đồ thị  $G = (V, E)$  là một đồ thị đơn, đồ thị  $G$  được gọi là **đồ thị phân đôi** (**bipartite graph**) nếu tập  $V$  được chia thành hai tập con  $V_1$  và  $V_2$  sao cho

- ▶ Hai tập con  $V_1$  và  $V_2$  là phân hoạch của  $V$  nghĩa là  $V_1 \neq \emptyset$ ,  $V_2 \neq \emptyset$ ,  $V_1 \cup V_2 = V$ ,  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
- ▶ Hai đỉnh bất kỳ của  $V_1$  không kề nhau, và hai đỉnh bất kỳ của  $V_2$  không kề nhau

## Đồ thị phân đôi (cont.)




Hình 1.13: Đồ thị phân đôi

## Đồ thị phân đôi, đủ

### Định nghĩa 1.17

Cho  $G = (V, E)$  là một đồ thị phân đôi với hai tập con  $V_1$  và  $V_2$ , đồ thị  $G$  được gọi là **đồ thị phân đôi, đủ** nếu với mọi cặp đỉnh  $x \in V_1$  và  $y \in V_2$  thì có đúng một cạnh nối chúng. Đồ thị phân đôi, đủ được ký hiệu là  $K_{m,n}$  với  $|V_1| = m$  và  $|V_2| = n$

## Đồ thị phân đôi, đủ (cont.)



Hình 1.14: Các kiểu đồ thị  $K_{m,n}$

## Đồ thị phân đôi, đủ (cont.)


### Tính chất 1.3

Đồ thị phân đôi, đủ  $K_{m,n}$  sẽ có  $m.n$  cạnh

## Đồ thị vòng

### Định nghĩa 1.18

**Đồ thị vòng (circular graph)** là đồ thị đơn có  $n$  đỉnh  $\{v_1, \dots, v_n\}$  và  $n$  cạnh  $\{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)\}$ . Đồ thị vòng với  $n$  đỉnh được ký hiệu là  $C_n$




Hình 1.15: Các kiểu đồ thị vòng

## Đồ thị sao

### Định nghĩa 1.19

**Đồ thị sao (star graph)** là đồ thị đơn có  $n + 1$  đỉnh. Trong đó có duy nhất một đỉnh có bậc  $n$  và các đỉnh còn lại có bậc là 1




Hình 1.16: Đồ thị sao

## Đồ thị bánh xe

### Định nghĩa 1.20

**Đồ thị bánh xe (wheel graph)** là đồ thị đơn có  $n + 1$  đỉnh được tạo từ đồ thị  $C_n$  và một đỉnh nối với tất cả các đỉnh của  $C_n$ . Đồ thị bánh xe được ký hiệu là  $W_n$




Hình 1.17: Đồ thị bánh xe  $W_5$


## Đồ thị n-lập phương

### Định nghĩa 1.21


**Đồ thị n-lập phương (n-cube graph)** là đồ thị đơn có  $2^n$  đỉnh. Mỗi đỉnh được biểu diễn bằng một dãy  $n$  số nhị phân. Hai đỉnh là kề nhau nếu dãy nhị phân của chúng khác nhau đúng 1 bit. Đồ thị n-lập phương ký hiệu là  $Q_n$



Hình 1.18: Đồ thị  $Q_2$



Hình 1.19: Đồ thị  $Q_3$



Hình 1.20: Đồ thị  $Q_4$

### Tính chất 1.4

- ▶ Bậc của các đỉnh của đồ thị  $Q_n$  là  $n$
- ▶ Số các cạnh của đồ thị  $Q_n$  là  $n * 2^{n-1}$

## Các thao tác trên đồ thị

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  với  $V$  là tập đỉnh và  $E$  là tập cạnh

- ▶ Thêm đỉnh  $v$  vào đồ thị  $G$

$$V = V + \{v\}$$

- ▶ Xóa đỉnh  $v$  khỏi đồ thị  $G$

$$V = V - \{v\}$$

sau đó xóa các cạnh kề với  $v$  khỏi  $G$

- ▶ Thêm cạnh  $e = (x, y)$  vào đồ thị  $G$

$$E = E + \{e\}$$

sau đó thêm hai đỉnh  $x, y$  vào đồ thị  $G$

- ▶ Xóa cạnh  $e$  khỏi đồ thị  $G$

$$E = E - \{e\}$$

## Các thao tác trên đồ thị (cont.)

### Định nghĩa 1.22

Cho hai đồ thị  $G_1 = (V_1, E_1)$  và  $G_2 = (V_2, E_2)$

- ▶ Phép hợp

$$G_1 \cup G_2 = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$$

- ▶ Phép giao

$$G_1 \cap G_2 = (V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2)$$

## Các thao tác trên đồ thị (cont.)

### Định nghĩa 1.23

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Tích Cartesian  $G \times G'$  được xác định như sau

- ▶ Tập đỉnh  $V \times V'$
- ▶ Tập cạnh: hai đỉnh  $(u, u') \in V \times V'$  và  $(v, v') \in V \times V'$  được xem là kề nhau nếu
  - ▶  $u = v$  và  $u'$  và  $v'$  kề nhau
  - ▶  $u' = v'$  và  $u$  và  $v$  kề nhau

## CÁC QUAN HỆ GIỮA ĐỒ THỊ

## Giới thiệu

- ▶ Quan hệ con
- ▶ Quan hệ sinh
- ▶ Quan hệ bộ phận
- ▶ Quan hệ đẳng cấu
- ▶ Quan hệ bù

## Quan hệ con

### Định nghĩa 1.24

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Ta nói đồ thị  $G'$  là **đồ thị con (subgraph)** của đồ thị  $G$  nếu và chỉ nếu  $V' \subseteq V$  và  $E' \subseteq E$   
Ký hiệu  $G' \subseteq G$

## Quan hệ bộ phận

### Định nghĩa 1.25

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Đồ thị  $G'$  là đồ thị con của đồ thị  $G$ . Đồ thị  $G'$  được gọi là **đồ thị bộ phận** (**spanning subgraph**) của đồ thị  $G$  nếu và chỉ nếu  $V' = V$

## Quan hệ sinh

### Định nghĩa 1.26

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Đồ thị  $G'$  là đồ thị con của đồ thị  $G$ . Đồ thị  $G'$  được gọi là **đồ thị sinh** (**induced subgraph**) của đồ thị  $G$  nếu và chỉ nếu  $V' \subseteq V$  và  $e = (x, y) \in E, x, y \in V' \Rightarrow e \in E'$

## Quan hệ đẳng cấu

### Định nghĩa 1.27

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Hai đồ thị được gọi là **đẳng cấu** (**isomorphic**) nếu và chỉ nếu tồn tại song ánh

$$f : V \rightarrow V' \quad (1.4)$$

bảo toàn liên kết cạnh giữa  $E$  và  $E'$

## Quan hệ đẳng cấu (cont.)

### Định lý 1.7

Điều kiện cần để hai đồ thị  $G$  và  $G'$  đẳng cấu là chúng phải có

- ▶ Số đỉnh bằng nhau
- ▶ Số cạnh bằng nhau
- ▶ Bậc của các đỉnh tương ứng bằng nhau

### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■



### Định nghĩa 1.28

Cho hai đồ thị  $G = (V, E)$  và  $G' = (V', E')$ . Hai đồ thị được gọi là **bù nhau (complement)** nếu và chỉ nếu  $V = V', E \cap E' = \emptyset, G \cup G' = K_n$  với  $n$  là số đỉnh của hai đồ thị. Ký hiệu  $G' = \bar{G}$ .

### Định nghĩa 1.29

Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , đồ thị  $G$  được gọi là **tự bù (self complement)** nếu và chỉ nếu  $G$  đẳng cấu với  $\bar{G}$ .

## Biểu diễn đồ thị bằng hình học

Biểu diễn đồ thị  $G = (V, E)$  bằng hình học như sau

- ▶ Mỗi đỉnh  $v \in V$  của đồ thị được biểu diễn bằng điểm hoặc hình tròn hoặc hình chữ nhật
- ▶ Mỗi cạnh  $e \in E$  của đồ thị được biểu diễn bằng đoạn thẳng hoặc cung
- ▶ Nếu đồ thị có hướng thì mỗi đoạn thẳng hoặc cung sẽ có thêm dấu mũi tên
- ▶ Bước quan trọng nhất là **vẽ đồ thị (graph drawing)**


## BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ

## Biểu diễn đồ thị bằng hình học (cont.)

Có nhiều cách vẽ đồ thị. Trong đó có những cách vẽ phổ biến là

- ▶ Vẽ ngẫu nhiên (**random layout**)
- ▶ Vẽ dạng hình tròn (**circular layout**)
- ▶ Vẽ dạng lưới (**grid layout**)
- ▶ Vẽ dạng hình cây (**tree layout**)
- ▶ Vẽ dạng phẳng (**planar layout**)

## Biểu diễn đồ thị bằng hình học (cont.)



Hình 1.21: Các kiểu vẽ đồ thị

## Biểu diễn đồ thị bằng ma trận

- Cho một đồ thị không có cạnh song song  $G = (V, E)$  có  $n$  đỉnh  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  ta có thể biểu diễn đồ thị bằng **ma trận** kề (**adjacency matrix**) là một ma trận vuông  $A$  cấp  $n$

$$A = (a_{ij})$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E \\ 0 & (v_i, v_j) \notin E \end{cases} \quad (1.5)$$

### Nhận xét

- Ma trận kề của đồ thị phụ thuộc vào thứ tự liệt kê các đỉnh. Ta có  $n!$  cách liệt kê các đỉnh do đó sẽ có  $n!$  ma trận kề khác nhau cho một đồ thị
- Ma trận kề của đồ thị vô hướng là một ma trận đối xứng


## Biểu diễn đồ thị bằng ma trận (cont.)

- Cho một đồ thị  $G = (V, E)$  có  $n$  đỉnh  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  và có  $m$  cạnh  $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  ta có thể biểu diễn đồ thị bằng **ma trận** liên thuộc (**incidence matrix**) là một ma trận  $n \times m$

$$A = (a_{ij})$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ kề } e_j \\ 0 & v_i \text{ không kề } e_j \end{cases} \quad (1.6)$$

## Biểu diễn đồ thị bằng ma trận (cont.)




Hình 1.22: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề

## Biểu diễn đồ thị bằng ma trận (cont.)

### Nhận xét

Ma trận kề cũng có thể dùng để biểu diễn đồ thị vô hướng có cạnh khuyên và cạnh song song




(a) đa đồ thị

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(b) ma trận kề

Hình 1.23: Biểu diễn đa đồ thị bằng ma trận kề

## Biểu diễn đồ thị bằng ma trận (cont.)



(a) đồ thị

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(b) ma trận liên thuộc

Hình 1.24: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận liên thuộc

## Đồ thị đẳng cấu và Ma trận kề

### Định lý 1.8


Hai đồ thị  $G_1$  và  $G_2$  với hai ma trận kề tương ứng  $A_1$  và  $A_2$  tương ứng đẳng cấu với nhau khi và chỉ khi tồn tại một **ma trận hoán vị** (**permutation matrix**)  $P$  sao cho

$$P \cdot A_1 \cdot P^T = A_2 \quad (1.7)$$

### Lưu ý

Ma trận hoán vị là ma trận mà mọi dòng, mọi cột chỉ có một phần tử "1", còn lại là phần tử "0"


## Đồ thị đẳng cấu và Ma trận kề (cont.)



(a) đồ thị  $G_1$

$$A_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(b) ma trận kề  $A_1$



(c) đồ thị  $G_2$

$$A_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(d) ma trận kề  $A_2$

Hình 1.25: Đồ thị và ma trận kề

## Đồ thị đẳng cấu và Ma trận kề (cont.)

Xét ma trận hoán vị

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta có


$$P.A_1.P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A_2$$

Vậy đồ thị  $G_1$  và  $G_2$  đẳng cấu với nhau

## Biểu diễn đồ thị bằng danh sách


- ▶ Đồ thị  $G = (V, E)$  có thể được biểu diễn bằng **danh sách cạnh** và **danh sách đỉnh**
- ▶ Đồ thị  $G = (V, E)$  có thể được biểu diễn bằng **danh sách kề**

## Biểu diễn đồ thị bằng danh sách (cont.)



Hình 1.26: Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh & danh sách đỉnh

## Biểu diễn đồ thị bằng danh sách (cont.)



Hình 1.27: Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề

## Mật độ đồ thị

### Định nghĩa 1.30

**Mật độ đồ thị** (**graph density**) (hay **mật độ cạnh**) của đồ thị đơn  $G = (V, E)$  được định nghĩa là tỉ lệ số cạnh và bình phương số đỉnh

$$D = \frac{2|E|}{|V|(|V| - 1)} \quad (1.8)$$

- ▶ **Đồ thị thưa** **sparse graph** là đồ thị có mật độ cạnh thấp (so với số đỉnh)
- ▶ **Đồ thị dày** **dense graph** là đồ thị có mật độ cạnh cao (so với đỉnh)

## Biểu diễn đồ thị đơn bằng ma trận kề hay danh sách kề

Việc lựa chọn biểu diễn bằng ma trận kề hay danh sách kề cho một đồ thị ảnh hưởng đến thời gian và bộ nhớ sử dụng của các thuật toán đồ thị

- ▶ Nếu đồ thị thưa, chọn biểu diễn nào cho đồ thị? Tại sao
- ▶ Nếu đồ thị dày, chọn biểu diễn nào cho đồ thị? Tại sao

## CÁC KHÁI NIỆM VỀ DÂY CHUYỀN, ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH VÀ MẠCH

## Dây chuyền

### Định nghĩa 1.31

- ▶ Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , **dây chuyền** (**path**)  $P$  trong  $G$  là một dãy luân phiên các "đỉnh - cạnh"

$$P = v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 \dots v_m$$

sao cho  $e_i = (v_i, v_{i+1})$  hoặc  $e_i = (v_{i+1}, v_i)$

- ▶ Đỉnh  $v_1$  được gọi là **đỉnh đầu** và  $v_m$  được gọi là **đỉnh cuối** của dây chuyền  $P$
- ▶ **Chiều dài** (**length**) của dây chuyền là "số cạnh" hay "số đỉnh - 1" trong dây chuyền

## Dây chuyền (cont.)

### Định nghĩa 1.31

- ▶ Đối với đồ thị đơn chúng ta có thể viết dây chuyền bằng một dãy "đỉnh"

$$P = v_1 v_2 \dots v_m$$

hoặc


$$P = v_1 - v_m$$

## Dây chuyền (cont.)

### Định nghĩa 1.32

- ▶ Dây chuyền **đơn** (**simple**) là dây chuyền không có cạnh lặp lại
- ▶ Dây chuyền **sơ cấp** (**simple**) là dây chuyền không có đỉnh lặp lại

## Dây chuyền (cont.)



Hình 1.28: Một số dây chuyền

## Một số nhận xét về dây chuyền

### Nhận xét

1. Hai dây chuyền  $P_1 = v_1 \dots v_k$  và  $P_2 = v_k \dots v_m$  có đỉnh cuối của  $P_1$  là đỉnh đầu của  $P_2$  thì dây  $P$

$$P = P_1 \oplus P_2 = v_1 \dots v_k \dots v_m$$

cũng là một dây chuyền

2. Mọi dãy con của một dây chuyền cũng là một dây chuyền
3. Dây ngược của dây chuyền cũng là một dây chuyền

## Đường đi

### Định nghĩa 1.33

- Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , **đường đi (path)**  $P$  trong  $G$  là một dãy luân phiên các "đỉnh - cạnh"

$$P = v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 \dots v_m$$

sao cho  $e_i = (v_i, v_{i+1})$


- Đối với đồ thị đơn chúng ta có thể viết đường đi bằng một dãy "đỉnh"

$$P = v_1 v_2 \dots v_m$$

hoặc

$$P = v_1 - v_m$$

## Đường đi (cont.)



Hình 1.29: Đường đi "d f a c b"

## Chu trình và mạch


### Định nghĩa 1.34

**Chu trình (cycle)**  $C$  của một đồ thị  $G = (V, E)$  là một dãy chuyển khép kín có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối


### Định nghĩa 1.35

**Mạch (cycle)**  $C$  của một đồ thị  $G = (V, E)$  là một đường đi khép kín có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối

## Chu trình và mạch (cont.)



(a) chu trình "c f e c"



(b) mạch "d f a d"

Hình 1.30: Chu trình và mạch

# TÌM KIẾM, DUYỆT TRÊN ĐỒ THỊ

## Giới thiệu

### Định nghĩa 1.36

- ▶ **Tìm kiếm** hay **duyet** trên đồ thị là phương pháp **liệt kê** tất cả các đỉnh của đồ thị có thể **đến** được từ một đỉnh xuất phát  $s$  dựa trên thông tin **kề** của đồ thị.
- ▶ Một trong những yêu cầu là không được bỏ sót hay lặp lại bất kỳ một đỉnh nào.
- ▶ Hai chiến lược tìm kiếm tổng quát là **tìm kiếm theo chiều sâu** (**Depth First Search - DFS**) và **tìm kiếm theo chiều rộng** (**Breadth First Search - BFS**).

## Ý tưởng DFS

### Ý tưởng

Ý tưởng này được [Tarjan, 1972] tổng kết để giải quyết các bài toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị như tìm điểm cắt, tìm thành phần liên thông, tìm thành phần song liên thông ...

1. Bắt đầu từ đỉnh được cho
2. Tại mỗi đỉnh bất kỳ  $v$ 
  - ▶ Duyệt đỉnh  $v$
  - ▶ Sau đó lần lượt đi tới những đỉnh kề với  $v$  và *chưa được duyệt* và lặp lại các thao tác trên đối với những đỉnh này
  - ▶ Quay lại *đỉnh trước* của  $v$

### Lưu ý

- ▶ Để không một đỉnh nào liệt kê hai lần ta sử dụng kỹ thuật "đánh dấu"

## Thuật toán DFS


Cho một đồ thị  $G = (V, E)$  có  $n$  đỉnh  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$

### Algorithm 1 Tìm kiếm theo chiều sâu

```
1: procedure DFS( $v$ )
2:   Duyệt đỉnh  $v$ 
3:   for mỗi đỉnh  $u$  kề với  $v$  do
4:     if đỉnh  $u$  chưa được duyệt then
5:       DFS( $u$ )
```



## Minh họa DFS



Hình 1.31: Thứ tự duyệt các đỉnh đồ thị bắt đầu từ đỉnh a

## Ý tưởng BFS

### Ý tưởng

Ý tưởng này được [Moore, 1959] đưa ra để tìm đường đi trong một mê cung

- ▶ Bắt đầu từ một đỉnh được cho
- ▶ Tại mỗi đỉnh bất kỳ  $v$ 
  - ▶ Duyệt đỉnh  $v$
  - ▶ Sau đó đi đến và duyệt các đỉnh kề với nó.
  - ▶ Tiếp tục lặp lại chiến lược cho các đỉnh kề của nó.


## Thuật toán BFS

Cho một đồ thị  $G = (V, E)$  có  $n$  đỉnh  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$

### Algorithm 2 Tìm kiếm theo chiều rộng

```
1: procedure BFS( $v$ )
2:    $queue \leftarrow v$ 
3:   while  $queue \neq \emptyset$  do
4:      $x \leftarrow queue$ 
5:     Duyệt đỉnh  $x$ 
6:     for mỗi đỉnh  $u$  kề với đỉnh  $x$  do
7:       if đỉnh  $u$  chưa duyệt và không có trong  $queue$  then
8:          $queue \leftarrow u$ 
```

## Minh họa BFS



Hình 1.32: Thứ tự duyệt các đỉnh đồ thị bắt đầu từ đỉnh a

## Độ phức tạp của DFS và BFS

- ▶ Trong trường hợp đồ thị được biểu diễn bằng danh sách kề, độ phức tạp của DFS và BFS là

$$O(|V| + |E|)$$

- ▶ Trong trường hợp đồ thị được biểu diễn bằng ma trận kề thì độ phức tạp của hai thuật toán trên là

$$O(|V| + |V|^2)$$

## Các bài toán đường đi và chu trình

### Bài toán 1.1 (Bài toán tìm một đường đi sơ cấp)

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai đỉnh  $s$  và  $t$ . Hãy tìm **đường đi sơ cấp** từ  $s$  cho đến  $t$

### Bài toán 1.2 (Bài toán tìm tất cả đường đi sơ cấp)

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai đỉnh  $s$  và  $t$ . Hãy tìm tất cả **đường đi sơ cấp** từ  $s$  cho đến  $t$

## Các bài toán đường đi và chu trình (cont.)

### Bài toán 1.3 (Bài toán tìm tất cả đường đi đơn)

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai đỉnh  $s$  và  $t$ . Hãy tìm **đường đi đơn** từ  $s$  cho đến  $t$

### Bài toán 1.4 (Bài toán tìm một đường đi có chiều dài cho trước)

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai đỉnh  $s$  và  $t$  và một số dương  $k$ . Hãy tìm **đường đi** có chiều dài  $k$  đi từ  $s$  cho đến  $t$

## Các bài toán đường đi và chu trình (cont.)


### Bài toán 1.5 (Bài toán tìm chu trình sơ cấp)

Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai  $s$ . Hãy tìm **chu trình sơ cấp** đi qua  $s$ .

### Bài toán 1.6 (Bài toán tìm tất cả chu trình sơ cấp)


Cho đồ thị  $G = (V, E)$  và hai  $s$ . Hãy tìm tất cả **chu trình sơ cấp** đi qua  $s$ .

## Các bài toán đường đi và chu trình (cont.)



Hình 1.33: Đồ thị và một đường đi từ A đến D

## Các bài toán đường đi và chu trình (cont.)



Hình 1.34: Đồ thị và tất cả đường đi từ A đến D

## Áp dụng DFS để tìm đường đi

**Algorithm 3** Tìm đường đi  $P$  từ đỉnh  $v_s$  đến  $v_e$

```


1: function DFS_FIND_PATH( $v_s, v_e$ )
2:   Duyệt  $v_s$ 
3:   if  $v_s = v_e$  then
4:     return true
5:   for mỗi đỉnh  $v$  kề với đỉnh  $v_s$  do
6:     if  $v$  chưa được duyệt then
7:        $pre[v] \leftarrow v_s$ 
8:       if DFS_FIND_PATH( $v, v_e$ ) then
9:         return true
10:  return false
    
```

## Áp dụng DFS để tìm đường đi (cont.)

- Trong hàm trên đã sử dụng kỹ thuật lưu vết của đường đi thông qua việc lưu lại đỉnh trước của đỉnh  $v$  bằng phép gán  $pre[v] = v_s$
- Để xác định đường đi ta sử dụng cách lần ngược từ đỉnh  $v_e$  cho đến  $v_s$




## Áp dụng DFS để tìm đường đi (cont.)




Hình 1.35: Tìm đường đi trên bản đồ các thị trấn

## Áp dụng DFS để tìm đường đi (cont.)



Hình 1.36: Tìm đường đi cho con mã từ ô (1,1) đến ô (7,7)

## Áp dụng DFS để tìm đường đi (cont.)



Hình 1.37: Tìm đường đi qua một mê cung

## Những định lý về đường đi và chu trình

### Định lý 1.9

Cho  $G = (V, E)$  là một đồ thị đơn vô hướng có  $n \geq 3$  đỉnh mọi đỉnh  $v$  đều có  $d(v) \geq 2$  thì luôn tồn tại một chu trình sơ cấp trong  $G$

### Chứng minh

- ▶ Vì  $G$  là một đồ thị hữu hạn nên số đường đi sơ cấp trong  $G$  là hữu hạn.
- ▶ Giả sử  $P = v_1 v_2 \dots v_k$  là một trong các đường đi sơ cấp có độ dài cực đại. Do bậc của mỗi đỉnh không nhỏ hơn 2 nên đỉnh  $v_1$  phải kề với một đỉnh  $u$  nào đó. Hai tình huống xảy ra
  1. Nếu đỉnh  $u = v_i \in \{v_3, \dots, v_k\}$  thì đồ thị  $G$  sẽ có chu trình sơ cấp  $Q = v_1 \dots v_i v_1$

## Những định lý về đường đi và chu trình (cont.)

2. Ngược lại, nếu đỉnh  $u = v_i \in \{v_3, \dots, v_k\}$  khi đó trong  $G$  tồn tại đường đi sơ cấp  $Q = uv_1v_2\dots v_k$  có độ dài lớn hơn đường sơ cấp  $P$  có độ dài lớn nhất đã chọn (mâu thuẫn).  
Vậy tình huống này không thể xảy ra

- Vậy trong  $G$  tồn tại một chu trình sơ cấp

■

## Những định lý về đường đi và chu trình (cont.)

### Định lý 1.10

Cho  $G = (V, E)$  là một đồ thị đơn vô hướng có số đỉnh  $n \geq 4$  và mọi đỉnh đều có bậc lớn hơn 3 thì trong  $G$  luôn tồn tại một chu trình sơ cấp có độ dài chẵn.

### Chứng minh

- Vì  $G$  là một đồ thị hữu hạn nên số đường đi sơ cấp trong  $G$  là hữu hạn.
- Giả sử  $P = v_1v_2\dots v_k$  là một trong các đường đi sơ cấp có độ dài cực đại. Do bậc của mỗi đỉnh không nhỏ hơn 3 nên đỉnh  $v_1$  phải kề với hai đỉnh  $v_i, v_j \in \{v_3, \dots, v_k\}, i < j$

## Những định lý về đường đi và chu trình (cont.)

- Khi đó trong  $G$  có 2 chu trình sơ cấp

$$Q_1 = v_1\dots v_i v_1$$

$$Q_2 = v_1\dots v_j v_1$$

- Nếu một trong hai  $Q_1, Q_2$  có độ dài chẵn thì ta có điều phải chứng minh

## Những định lý về đường đi và chu trình (cont.)

- Nếu cả hai  $Q_1, Q_2$  có độ dài lẻ thì

$$R_1 = v_1\dots v_i$$

đường đi sơ cấp có độ dài chẵn

$$R_2 = v_i\dots v_j v_1$$

đường đi sơ cấp có độ dài lẻ

$$R_2 = v_1 v_i\dots v_j v_1$$

chu trình sơ cấp có độ dài chẵn (điều phải chứng minh)

■


# MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC TRÊN ĐỒ THỊ

## Đồ thị liên thông

### Định nghĩa 1.37

Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , Ta nói  $G$  là **đồ thị liên thông** (**connected graph**) khi và chỉ khi với mọi đỉnh  $x, y \in V$  luôn tồn tại dãy chuyển từ  $x$  đến  $y$ .

## Đồ thị liên thông (cont.)




Hình 1.38: Đồ thị liên thông và không liên thông

## Đồ thị liên thông (cont.)

### Định nghĩa 1.38

- ▶ Cho một đồ thị liên thông  $G$ ,  $v$  là một đỉnh của đồ thị,  $v$  được gọi là **đỉnh cắt** (**cut vertex**) nếu  $G - \{v\}$  không liên thông
- ▶ Cho một đồ thị liên thông  $G$ ,  $e$  là một cạnh của đồ thị,  $e$  được gọi là **cầu** (**bridge**) nếu  $G - \{e\}$  không liên thông

## Đồ thị liên thông (cont.)



Hình 1.39: Hãy xác định điểm cắt và cạnh cầu của đồ thị

## Đồ thị liên thông (cont.)

### Định nghĩa 1.39

- ▶ **Bậc liên thông đỉnh (vertex connectivity)** của một đồ thị  $G$  là số đỉnh ít nhất bỏ đi làm cho đồ thị mất tính liên thông. Ký hiệu là  $\kappa(G)$
- ▶ **Bậc liên thông cạnh (edge connectivity)** của một đồ thị  $G$  là số cạnh ít nhất bỏ đi làm cho đồ thị mất tính liên thông. Ký hiệu là  $\lambda(G)$

## Quan hệ liên thông

### Định nghĩa 1.40

Cho đồ thị  $G = (V, E)$ , Ta định nghĩa một **quan hệ liên thông**  $\sim$  trên tập đỉnh  $V$  như sau

$\forall x, y \in V, x \sim y$  hoặc  $x = y$  hoặc có dây chuyền từ  $x$  đến  $y$

## Các thành phần liên thông

### Định nghĩa 1.41

Một **thành phần liên thông (connected component)** của một đồ thị là một lớp tương đương được xác định bởi quan hệ liên thông

### Định nghĩa 1.42


Một thành phần liên thông của đồ thị  $G$  là **đồ thị con liên thông tối đại (maximal connected subgraph)** của  $G$

## Các thành phần liên thông (cont.)

### Nhận xét

- ▶ Số thành phần liên thông của một đồ thị là số lượng các lớp tương đương
- ▶ Các thành phần liên thông là các **đồ thị con**
- ▶ Một đồ thị được gọi là đồ thị liên thông nếu nó chỉ có một thành phần liên thông

## Các thành phần liên thông (cont.)



Hình 1.40: Đồ thị có 3 thành phần liên thông

## Áp dụng DFS tìm các thành phần liên thông

Cho một đồ thị  $G = (V, E)$  có  $n$  đỉnh  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$

### Algorithm 4 Đánh nhãn các thành phần liên thông

```
1: Khởi tạo biến  $label = 0$  và gán nhãn 0 cho tất cả các đỉnh
2: for  $i \leftarrow \{1 \dots n\}$  do
3:   if nhãn đỉnh  $v_i$  là 0 then
4:      $label \leftarrow label + 1$ 
5:     DFS_ASSIGN( $v_i, label$ )
6: procedure DFS_ASSIGN( $v, label$ )
7:   Gán nhãn  $label$  cho đỉnh  $v$ 
8:   for mỗi đỉnh  $u$  kề với  $v$  do
9:     if nhãn đỉnh  $u$  là 0 then
10:      DFS_ASSIGN( $u, label$ )
```

## Những định lý về liên thông

### Định lý 1.11

*Nếu trong đồ thị  $G = (V, E)$  có đúng hai đỉnh bậc lẻ thì hai đỉnh này phải liên thông với nhau*

### Chứng minh

- ▶ Giả sử đồ thị  $G = (V, E)$  có đúng hai đỉnh bậc lẻ  $x$  và  $y$  nhưng hai đỉnh này lại không liên thông với nhau. Do đó,  $x$  và  $y$  phải thuộc vào 2 thành phần liên thông  $G_1, G_2$  khác nhau của  $G$
- ▶ Theo giả thuyết do  $G$  chỉ có đúng 2 đỉnh bậc lẻ nên trong mỗi đồ thị con  $G_1$  và  $G_2$  chỉ có đúng một đỉnh bậc lẻ. Mâu thuẫn với tính chất số đỉnh bậc lẻ trong một đồ thị là một số chẵn.
- ▶ Vậy  $x$  và  $y$  phải liên thông với nhau.

■



## Những định lý về liên thông (cont.)

### Định lý 1.12

Cho đồ thị đơn  $G = (V, E)$  có số đỉnh  $n \geq 2$ , nếu  $\forall v_1, v_2 \in V$  và  $d(v_1) + d(v_2) \geq n$  thì đồ thị  $G$  liên thông

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Những định lý về liên thông (cont.)

### Hệ quả 1.2

Cho đồ thị đơn  $G = (V, E)$  có số đỉnh  $n$ , nếu  $\forall v \in V, d(v) \geq \frac{n}{2}$  thì đồ thị  $G$  liên thông

#### Chứng minh

Sinh viên tự chứng minh ■

## Đồ thị liên thông yếu

### Định nghĩa 1.43


Cho đồ thị có hướng  $G = (V, E)$ , ta nói  $G$  là **đồ thị liên thông yếu** (**weakly connected graph**) khi và chỉ khi đồ thị nền của nó là liên thông

## Đồ thị liên thông mạnh

### Định nghĩa 1.44

Cho đồ thị có hướng  $G = (V, E)$ , ta nói  $G$  là **đồ thị liên thông mạnh** (**strongly connected graph**) khi và chỉ khi  $\forall x, y \in V$  luôn tồn tại đường đi từ  $x$  đến  $y$  và ngược lại.

## Đồ thị liên thông mạnh (cont.)




Hình 1.41: Đồ thị liên thông mạnh và không liên thông mạnh

## Các thành phần liên thông mạnh

### Định nghĩa 1.45

Một thành phần liên thông mạnh (**strongly connected component**) của đồ thị  $G$  là đồ thị con liên thông mạnh tối đại (**maximal strongly connected subgraph**) của  $G$

## Các thành phần liên thông mạnh (cont.)



Hình 1.42: Đồ thị có các thành phần liên thông mạnh  $\{a\}, \{e\}, \{f\}, \{g\}$  và  $\{b, c, d\}$

## Đồ thị song liên thông

### Định nghĩa 1.46


Đồ thị song liên thông (**biconnectivity**) là đồ thị không chứa đỉnh cắt

## Các thành phần song liên thông

### Định nghĩa 1.47

Một thành phần song liên thông (**biconnected component**) của đồ thị  $G$  là đồ thị con song liên thông tối đại (**maximal biconnected subgraph**) của  $G$

## Các thành phần song liên thông (cont.)



Hình 1.43: Đồ thị có 4 thành phần song liên thông

## Đồ thị có gốc

### Định nghĩa 1.48

Cho đồ thị có hướng  $G = (V, E)$ , ta nói  $G$  là **đồ thị có gốc** (**rooted graph**) nếu tồn tại một đỉnh  $r \in V$  sao cho từ  $r$  có đường đi đến các đỉnh còn lại của đồ thị.

## ĐỒ THỊ CÓ TRỌNG SỐ

## Phân loại

**Đồ thị có trọng số (weighted graph)** có thể phân thành ba loại


- ▶ Đồ thị có trọng số đỉnh
- ▶ Đồ thị có trọng số cạnh
- ▶ Đồ thị có trọng số hỗn hợp

## Đồ thị có trọng số đỉnh

### Định nghĩa 1.49

Đồ thị  $G = (V, E, L)$  là **đồ thị có trọng số (weighted graph)** nếu mỗi đỉnh của nó có một giá trị số thực thông qua một hàm trọng số  $K$

$$\begin{aligned} K : V &\rightarrow R \\ v &\mapsto K(v) \end{aligned} \quad (1.9)$$




**Hình 1.44:** Đồ thị vô hướng có trọng số đỉnh

## Đồ thị có trọng số cạnh

### Định nghĩa 1.50

Đồ thị  $G = (V, E, L)$  là **đồ thị có trọng số (weighted graph)** nếu mỗi cạnh của nó có một giá trị số thực thông qua một hàm trọng số  $L$

$$\begin{aligned} L : E &\rightarrow R \\ e &\mapsto L(e) \end{aligned} \quad (1.10)$$



**Hình 1.45:** Đồ thị vô hướng có trọng số cạnh

## Đồ thị có trọng số cạnh (cont.)

### Định nghĩa 1.51

Cho đồ thị có trọng số  $G = (V, E, L)$ , trọng số của đồ thị là

$$L(G) = \sum_{e \in E} L(e) \quad (1.11)$$


## Biểu diễn đồ thị có trọng số cạnh bằng ma trận trọng số

- Cho một đồ thị có trọng số  $G = (V, E, L)$  có  $n$  đỉnh  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  ta có thể biểu diễn đồ thị bằng **ma trận trọng số** (**weighted matrix**) là một ma trận vuông  $A$  cấp  $n$

$$A = (a_{ij}) \quad (1.12)$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & i = j \\ L(v_i, v_j) & i \neq j, (v_i, v_j) \in E \\ \infty & i \neq j, (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

## Biểu diễn đồ thị có trọng số cạnh bằng ma trận trọng số (cont.)



(a) đồ thị có trọng số

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 5 & 2 & 1 & \infty & 6 \\ 5 & 0 & 4 & \infty & 3 & \infty \\ 2 & 4 & 0 & \infty & 1 & 3 \\ 1 & \infty & \infty & 0 & \infty & 4 \\ \infty & 3 & 1 & \infty & 0 & 2 \\ 6 & \infty & 3 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

(b) ma trận trọng số


Hình 1.46: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận trọng số

## Trọng số đường đi & chu trình

### Định nghĩa 1.52


Cho  $G = (V, E, L)$  là đồ thị có trọng số với  $V$  là tập đỉnh,  $E$  là tập cạnh và  $L$  là hàm trọng số trên miền tập cạnh. Trọng số của một đường đi  $P$  được định nghĩa là

$$L(P) = \sum_{e \in P} L(e) \quad (1.13)$$




Hình 1.47: Trọng số đường đi "a b c e f" là 14

## Trọng số đường đi & chu trình (cont.)



(a) trọng số chu trình "a b c a" là -3




(b) trọng số chu trình "a d f a" là 3

Hình 1.48: Trọng số các chu trình

## MỘT SỐ LOẠI ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG


## Một số loại đồ thị ứng dụng




Hình 1.49: Lược đồ thực thể kết hợp trong cơ sở dữ liệu

## Một số loại đồ thị ứng dụng (cont.)



## Một số loại đồ thị ứng dụng (cont.)



Hình 1.50: Máy trạng thái



Hình 1.51: Lưu đồ thuật toán

-  Moore, E. F. (1959).  
*The shortest path through a maze.*  
Bell Telephone System.
-  Tarjan, R. (1972).  
Depth-first search and linear graph algorithms.  
*SIAM journal on computing*, 1(2):146–160.