

外科

第一轮

30个选择，6名解、4个简答、2个问答
名解：dugas征、肾自截、cooper韧带、枕骨大孔疝、倾倒综合征，周围型肺癌
简答：胃溃疡的手术指征、纵隔的分法、骨折专有体征、门静脉四个交通
问答：
1.斜疝的诊断和鉴别诊断、腹腔镜主要手术方式（腹腔镜对疝的修复术具体哪些）
2.双侧上尿路梗阻的手术原则

第二轮

选择题主要是**甲乳和胃肠**，胃肠占大头，骨科和颅脑很少，泌尿也差不多三四道左右
二、名词解释(共6小题，每小题5分，共30分)
1、甲状腺危象
2、二尖瓣面容
3、胆囊三角
4、Colles 骨折
5、Cooper 韧带
6、早期胃癌
三、简答题(共4小题，每小题5分，共20分)
1、如何鉴别腹股沟斜疝和直疝？
2、高钾血症的治疗原则。
3、试述肺癌的手术禁忌证有哪些？
4、简述急性乳房炎的临床表现和治疗。
四、问答题(共2小题，每小题10分，共20分)
1、上消化道出血该与哪些疾病相鉴别？
2、急性阑尾炎的鉴别诊断？

第三轮

二、名词解释(共6小题，每小题5分，共30分)
1、骨筋膜室综合征
2、Whipple 三联征
3、丹毒
4、连枷胸
5、倾倒综合征
6、肾自截
三、简答题(共4小题，每小题5分，共20分)
1、阑尾切除术后并发症有哪些？
2、骨折治疗三大原则。
3、简述门静脉与腔静脉的主要交通支：
4、甲亢手术指征。
四、问答题(共2小题，每小题10分，共20分)
1、腹股沟斜疝与直疝如何鉴别(可画表)。
2、双侧上尿路结石的治疗原则。

第四轮

二、名词解释
1.直疝三角
2.Colles骨折
3.前哨淋巴结
4.压力性尿失禁
5.结肠充气试验（Rovsing征）
6.残胃癌
三、简答题
1.胆囊结石手术指征
2.尿路梗阻的原因
3.骨折的特殊体征
4.上消化道大出血的常见病因
四、问答题
1.什么是Child-Pugh评分？它是如何评分的？（可画表）
2.肠梗阻的诊断思路

第五轮

二、名词解释
1、Cooper韧带
2、纵隔扑动:
3、Pancoast综合征:
4、自截肾:
5、Richter疝:
6、Colles骨折:
三、简答题(共4小题，每小题5分，共20分)
1、简述甲状腺结节的手术指征。
2、简述胆囊三角(Calot三角)的解剖学特点。
3、简述小脑幕切迹疝的定义及其主要临床表现。
4、简述乳房的淋巴液输出途径。
四、问答题(共2小题，每小题10分，共20分)
1、男，30岁。突发上腹部疼痛10小时。患者10小时前他餐后突然出现上腹部“刀割”样剧痛，伴恶心、呕吐，腹痛很快波及右下腹)伴心悸及全身出冷汗。在社区门诊输液治疗2个小时后疼痛略减轻，4小时前腹痛又加重)虽金腹痛，伴发热。既往有饥饿时上腹痛2年，进食后腹痛缓解，未就诊。无药物过敏史，无手术、外伤史。无烟酒嗜好。
查体:T38.5℃，P120次/分，R26次/分，BP135/80mmHg。神志清，痛苦面容，曲体位，皮肤巩膜无黄染，浅表淋巴结未触及。肺检查未见异常。心率120次/分，律齐。腹平坦，腹式呼吸消失，腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛阳性，肝脾触诊不满意，肝浊音界消失，移动性浊音(士)，听诊肠鸣音减弱。
实验室检查:血常规:Hb140g/L，WBC18.5×109/L，N0.85，Plt280×109/L
(1)初步诊断
(2)诊断依据
(3)鉴别诊断
(4)进一步检查
(5)治疗原则
2、男性，45岁。突发右侧腰腹部疼痛2小时。患者在2小时前在搬重物时突然出现右侧腰腹部疼痛，为绞痛)阵发性加重，伴轻度恶心、呕吐，无发热，无腹泻、尿频、尿急，无肢体无力及活动障碍。既往体健。否认传染病病史及接触史。吸烟史25年，每天半包。无遗传家族史。
侧卧M位。全身皮肤未见红斑及出血点，浅表淋巴结未触及肿大。结膜无充血，巩膜无黄染甲状腺未触及肿大。双肺呼吸音清，未闻及干湿湿啰音。心率76次/分，律齐，心音有力,各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软，全腹无压痛及反跳痛，右侧腹部轻度肌紧张，Murphy征阴性，肠鸣音正常，四肢活动自如。神经系统检查无异常。专科查体:左肾区叩击痛阳性右肾区叩击痛阳性)双侧输尿管走行区无压痛，膀胱区无隆起。外生殖器发育正常，阴囊无水肿，双侧睾丸无异常。
实验室检查:血常规:Hb 130g/L，RBC4.5×10¹²/L，WBC 7.8×10⁹/L，N0.85，P1t 250×10⁹/L。尿常规:蛋白(一)，RBC10~15/HP，WBC 0~2/HP。
泌尿系彩超:右肾大小正常，肾盂轻度分离，肾孟内可见一强回声光团，其后有声影)大小约1.5cm*1.2cm，右肾无异常，双侧输尿管无扩张，膀胱充盈良好，膀胱粘膜光滑，无异常发现。
(1)初步诊断及诊断依据
(2)鉴别诊断
(3)进一步检查
(4)治疗原则
(5)治疗方法

部分选择题：最常见的脊柱肿瘤 最常见的肾肿瘤类型 小儿烧伤计算 正常颅内压 腰椎间盘突出最可靠影像学检查 硬膜外血肿最局特征性表现 颅内压升高三主。甲状腺腺亢进
腹部闭合型损伤出血性休克 治疗原则
还有急性胰腺炎最常见病因，脊椎骨折抬人类型——担架平躺，colle骨折形态，尿道感染最常见病原体