

# MATH 307: Individual Homework 21

Shaochen (Henry) ZHONG, sxz517@case.edu

Due and submitted on 04/28/2021  
Spring 2021, Dr. Guo

## Problem 1

See HW instruction.

Know that  $L_1 = I + \ell_1 e_1^T$  and W.T.S. that  $L_1^{-1} = I - \ell_1 e_1^T$ , we may simply check if  $L_1(I - \ell_1 e_1^T) = I$ .

$$\begin{aligned} L(I - \ell_1 e_1^T) &= (I + \ell_1 e_1^T)(I - \ell_1 e_1^T) = I - \ell_1 e_1^T + \ell_1 e_1^T - \ell_1 e_1^T \ell_1 e_1^T \\ &= I - \ell_1 (e_1^T \ell_1) e_1^T \\ &= I - \ell_1 \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} \\ \vdots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} \end{bmatrix} \right) \\ &= I - \ell_1 (0) e_1^T \\ &= I \end{aligned}$$

As  $L(I - \ell_1 e_1^T) = I$ , there must be  $L_1^{-1} = I - \ell_1 e_1^T$  as  $L_1 L_1^{-1} = I$ .

## Problem 2

See HW instruction.

Start with Gaussian elimination:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & | & 2 \\ -3 & 2 & 1 & 0 & | & -5 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}}_{R_2+3R_1 \rightarrow R_2, R_3-3R_1 \rightarrow R_3} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & 8 & 4 & 9 & | & 1 \\ 0 & -4 & -2 & -8 & | & -4 \end{bmatrix}}_{R_3+\frac{R_2}{2} \rightarrow R_3} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & 8 & 4 & 9 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & | & -\frac{7}{2} \end{bmatrix}}_{-\frac{2}{7}R_3 \rightarrow R_3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & 8 & 4 & 9 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{bmatrix}$$

So we have a system of:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 2 \\ 8x_2 + 4x_3 + 9x_4 = 1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

We have the first, second, and fourth columns being the pivot columns. Let the free column  $x_3 = 0$ , we have:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 0 + 3 = 2 \\ 8x_2 + 0 + 9 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

Thus,  $x_p = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ . Now to find  $\text{null}(A)$ , which we know is same as  $\text{null}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 8 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$ . We let the  $x_3 = 1$  and have:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 1 = 0 \\ 8x_2 + 4 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Thus, we have  $\text{null}(A) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ; which we may confirm by checking  $\text{null}(A) + \text{rank}(A) =$

$\dim(A) \iff 1 + 3 = 4$ . And we may there have the general solution as  $x_g = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

## Problem 2

See HW instruction.

(a)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 2 & | & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & -1 & | & 0 \\ -1 & 6 & 3 & 3 & 5 & | & c \end{bmatrix}}_{2R_1+R_2 \rightarrow R_2, -R_1+R_3 \rightarrow R_3} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 2 & | & -1 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 3 & | & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 3 & | & c+1 \end{bmatrix} \quad c+1 = -2 \Rightarrow c = -3$$

So we must have  $c = -3$  as otherwise there must be a conflict between  $R_2$  and  $R_3$ .

(b)

To find  $x_p$  we continue the row deduction:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 2 & | & -1 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 3 & | & -2 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 3 & | & -2 \end{bmatrix}}_{-R_2+R_3 \rightarrow R_3} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 2 & | & -1 \\ 0 & 4 & 2 & 3 & 3 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

By inspecting the reduced matrix we know that columns 3, 4, 5 are all free variables, thus we may have:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_5 = -1 \\ 4x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 3x_5 = -2 \end{cases}$$

Let  $x_3 = x_4 = x_5 = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_1 + 2x_2 = -1 \iff -x_1 - 1 = -1 & x_1 = 0 \\ 4x_2 = -2 & x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Thus, we may have  $x_p = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ .