

CMAT

Author Name

Universidad de las Américas Puebla

February 5, 2026

Abstract

This document provides a template for reports in the "AI in Financial Services" course, using EB Garamond for prose and Libertinus Math for formulas. It includes a cover page, abstract, table of contents, and sample sections for math and text. Additional content demonstrates tables, code, and references.

Contents

1 Overview

This document is a minimal example using EB Garamond for prose and libertinust1math for formulas.
Links like [this one](#) are active.

2 What is CMAT?

Centro de Matematicas, (Math Center), is a place where students go to take asesorias.

3 Exploratory Data Analysis

Las Figuras 3.1.1 y 3.1.2 presentan la distribución del *Número de Visitas* al CMAT por estudiante. En la Figura 3.1.1 se muestra un histograma con eje x en el rango $[0, 120]$ visitas y eje y ("Visitas") con conteos que alcanzan aproximadamente 7000. La Figura 3.1.2 reutiliza el mismo histograma pero separa a los estudiantes en dos grupos por umbral de 3 visitas: "Más de 3 visitas" (9.95%) y "3 o menos visitas" (90.05%), lo que anticipa un diseño comparativo con fuerte desbalance de tamaños muestrales.

3.1 How many people went to CMAT?

En la Figura 3.1.1 el histograma de *Número de Visitas* evidencia concentración en valores bajos (incluyendo 0) y una cola larga hasta alrededor de 120. Los ejes están rotulados como "Número de Visitas" (horizontal) y "Visitas" (vertical), con marcas cada 20 visitas. La Figura 3.1.2 introduce explícitamente la partición por frecuencia de uso del CMAT (más de 3 vs 3 o menos visitas) y reporta sus proporciones (9.95% vs 90.05%).

Figure 3.1.1: PDF imported as image

Figure 3.1.2: PDF imported as image

4 Are they better?

Para operacionalizar la comparación "Are they better?", la Figura 3.1.2 define el criterio de agrupamiento por visitas al CMAT (umbral > 3). En ese mismo gráfico se observa que el grupo de "Más de 3 visitas" representa 9.95% frente a 90.05% del grupo de "3 o menos visitas", por lo que cualquier contraste posterior debe considerar el desbalance. El eje x mantiene el rango aproximado $[0, 120]$ visitas, consistente con el histograma base.

4.1 How do we quantify that?

La Figura 3.1.2 proporciona la variable explicativa (frecuencia de visitas) y la regla de corte (3 visitas) que se utilizará para comparar desempeño entre grupos. El propio histograma con leyenda cuantifica los tamaños relativos (9.95% vs 90.05%), información necesaria para interpretar pruebas y estimadores que aparecen en figuras posteriores. No se muestra en esta sección una figura adicional de desempeño; por tanto, la evidencia visual disponible aquí se restringe a la estratificación por visitas.

4.2 Then, how do we compare it?

Sup: With their califications.

5 Califications

En esta sección se documenta el tratamiento de calificaciones y su heterogeneidad mediante varias figuras. La Figura 5.3.1 compara tres estrategias ante valores faltantes ("Eliminada", "Media" y "KDE") a partir de curvas de densidad sobre calificaciones en $[0, 10]$. Las Figuras 5.3.2–5.3.4 ilustran casos particulares (p.ej., rangos truncados y estandarización), mientras que las Figuras 5.3.5–5.3.6 muestran distribuciones agregadas por profesor, con proporciones de aprobados/reprobados reportadas en la propia gráfica.

5.1 Why are there missing values?

Students have the option to do not receive calification.

Sup: Students don't want to receive calification when they will not pass the course.

5.2 Imputation of missing values

En la Figura 5.3.1 se observa una comparación directa de métodos de imputación de calificaciones para un salón, con densidad en el eje y y calificación en el eje x . El gráfico superpone tres estimaciones identificadas en la leyenda como "Eliminada", "Media" y "KDE", permitiendo ver cómo cambia la forma de la distribución bajo cada manejo de faltantes. El rango horizontal cubre de 0 a 10 y la escala de densidad llega aproximadamente a 0.35.

5.3 The califications are relatable?

La Figura 5.3.1 ("Comparación de Métodos de Imputación de Calificaciones para un Salón") sintetiza el impacto de eliminar registros vs imputar por media vs imputar por KDE. Al compartir el mismo eje x (0–10) y el mismo eje y (densidad), el contraste es verificable visualmente por diferencias en alturas relativas y concentración de masa. En ausencia de más anotaciones numéricas dentro del PDF, esta figura aporta principalmente evidencia descriptiva sobre la forma de las distribuciones generadas por cada método.




Figure 5.3.1: PDF imported as image

Special cases

La Figura 5.3.2 muestra la "Calificaciones de un Salón con un Valor Atípico" como una distribución de densidad restringida al intervalo 7.5–10.0. El eje y está rotulado como "Densidad" (0.0 a 1.0),



Figure 5.3.2: PDF imported as image

lo que sugiere una concentración de observaciones en el tramo alto de la escala. El hecho de que el eje x comience en 7.5 es consistente con un caso donde no se observan calificaciones por debajo de ese umbral en ese salón.




Figure 5.3.3: PDF imported as image

En la Figura 5.3.3 se representa nuevamente el caso de "Calificaciones de un Salón con un Valor Atípico", pero ahora sobre el rango completo de calificación (marcas en 2, 4, 6, 8, 10). La escala de densidad alcanza aproximadamente 4.0, indicando picos más pronunciados que en la vista acotada de la Figura 5.3.2. Esta visualización permite contrastar el comportamiento del mismo salón cuando se incluye el dominio completo de la variable.

La Figura 5.3.4 compara "Métodos Estandarizados de Imputación de Calificaciones" (Eliminada, Media, KDE) usando nuevamente curvas de densidad. El eje x recorre 0–10 y el eje y (densidad) llega aproximadamente a 0.7, indicando que la estandarización cambia la escala de la estimación respecto a la Figura 5.3.1. La leyenda hace explícitos los tres tratamientos de faltantes para evaluar su efecto en la distribución resultante.

En la Figura 5.3.5 se muestra la "Distribución de Calificaciones Reportadas por Profesor" como un conjunto de curvas de densidad por docente. El gráfico incluye una barra/escala asociada a "Proporción de Estudiantes" y reporta tasas globales de "Reprobados: 9.43%" y "Aprobados: 90.57%". Los ejes están definidos en calificación (0–10) y densidad, permitiendo comparar concentraciones y dispersión entre profesores.

La Figura 5.3.6 presenta la "Distribución de Calificaciones por Profesor con Imputación de KDE", incorporando el manejo de faltantes mediante KDE. Se reportan explícitamente "Reprobados: 20.33%" y "Aprobados: 79.67%", junto con una escala de "Proporción de Estudiantes". El eje horizontal es la calificación (0–10) y el vertical es densidad, mostrando la heterogeneidad de formas entre docentes tras la imputación.




Figure 5.3.4: PDF imported as image




Figure 5.3.5: PDF imported as image

5.4 How does the teachers calificate their students?

Las Figuras 5.4.1–5.4.8 exploran la heterogeneidad docente y su posible agrupamiento a partir de distribuciones de calificaciones. En particular, la Figura 5.4.1 incorpora una matriz de estadísticos KS entre profesores (IMPKDE) y criterios de selección de k para k -medoids (método del codo y *silhouette*). Las Figuras 5.4.3–5.4.8 muestran distribuciones por profesor bajo imputación KDE, con distintas proporciones de reprobados/aprobados reportadas en cada gráfica.

En la Figura 5.4.1 aparece la "Matriz de Estadísticos KS entre Profesores (IMPKDE)", con ejes rotulados como CLAVEPROFESOR y marcas identificadas por claves numéricas. En el mismo entorno se incluyen dos diagnósticos para k -medoids: "Elbow Method" (inercia vs número de clusters k) con anotación $k^* = 3$, y "Silhouette Score" (*silhouette* vs k) con anotación $k^* = 10$. Ambos paneles usan k en el rango 2–10, haciendo explícito el criterio de validación interna para el agrupamiento.

En la Figura 5.4.2 no se extrae texto de títulos, ejes o leyendas desde el PDF, por lo que el contenido específico del gráfico no se distingue con claridad en esta conversión. Únicamente es verificable su numeración (Figura 5.4.2) y su coexistencia temporal con la Figura 5.4.1 dentro del flujo del documento. En consecuencia, cualquier interpretación adicional (p.ej., asignación de clusters o visualización de distancias) no puede afirmarse con certeza a partir del PDF disponible.

La Figura 5.4.3 muestra "Distribución de Calificaciones por Profesor con Imputacion de KDE"




Figure 5.3.6: PDF imported as image




Figure 5.4.1: PDF imported as image

con una escala de "Proporción de Estudiantes" y tasas: "Reprobados: 9.73%" y "Aprobados: 90.27%". El eje x es la calificación (0–10) y el eje y es densidad, sugiriendo la superposición de múltiples curvas correspondientes a distintos profesores. El propósito descriptivo es comparar la forma de las distribuciones docentes bajo el mismo esquema de imputación.

En la Figura 5.4.4 se presenta nuevamente la "Distribución de Calificaciones por Profesor con Imputación de KDE", ahora con "Reprobados: 17.16%" y "Aprobados: 82.84%". El formato coincide con la Figura 5.4.3: calificación en 0–10, densidad en el eje vertical y una codificación asociada a la proporción de estudiantes. La diferencia en la tasa reportada entre Figuras 5.4.3 y 5.4.4 es evidencia descriptiva de heterogeneidad agregada.

La Figura 5.4.5 mantiene la misma estructura de visualización por profesor bajo imputación KDE, pero reporta "Reprobados: 32.89%" y "Aprobados: 67.11%". Se observan los mismos ejes (calificación 0–10, densidad) y la referencia a "Proporción de Estudiantes". Comparada con Figuras 5.4.3–5.4.4, esta gráfica documenta un escenario con mayor fracción de reprobación en el agregado mostrado.

En la Figura 5.4.6 se vuelve a mostrar la distribución por profesor con imputación KDE, reportando "Reprobados: 9.73%" y "Aprobados: 90.27%". El rango de calificación permanece en 0–10 y el eje vertical está en densidad, con codificación por proporción de estudiantes. El hecho de que el




Figure 5.4.2: PDF imported as image




Figure 5.4.3: PDF imported as image

porcentaje de reprobados coincide con el de la Figura 5.4.3 sugiere que ambas gráficas corresponden a subconjuntos distintos con métricas agregadas similares (no se identifica el criterio del subconjunto en el PDF).

La Figura 5.4.7 repite la visualización de distribuciones por profesor con imputación KDE e indica "Reprobados: 17.16%" y "Aprobados: 82.84%". Los ejes y la escala de proporción se mantienen, permitiendo comparar directamente con Figuras 5.4.4 y 5.4.5. En el PDF no se distingue con claridad qué partición específica origina esta tasa, pero sí es verificable el valor reportado en la propia figura.

En la Figura 5.4.8 se reporta nuevamente "Distribución de Calificaciones por Profesor con Imputación de KDE" con "Reprobados: 32.89%" y "Aprobados: 67.11%". El diseño gráfico (calificación 0–10, densidad, escala de proporción de estudiantes) es consistente con Figuras 5.4.3–5.4.7. Esta repetición de tasas (p.ej., 32.89%) en diferentes figuras es consistente con comparaciones entre subconjuntos o agrupamientos, aunque el PDF no explicita el criterio en el propio panel.

Answer: There are 3 ways of califications




Figure 5.4.4: PDF imported as image




Figure 5.4.5: PDF imported as image

6 Which is the best way to estandarize?

Esta sección aborda la estandarización de calificaciones, y la Figura 6.2.1 aporta evidencia temporal para un profesor específico. En dicha figura se grafica la media de calificación por año (2019–2025) para el "Profesor 22471", con eje vertical "Media de Calificación" aproximadamente entre 5.5 y 8.5. El objetivo descriptivo es mostrar variación longitudinal que puede requerir estandarización dependiente del tiempo.

6.1 The califcotions depends on the teacher

La Figura 6.2.1 (media anual por profesor) ilustra que el nivel de calificación puede depender del docente y variar entre años, incluso manteniendo la misma métrica (media). El eje x es el año (2019–2025) y el eje y la media de calificación, con una trayectoria para el profesor identificado como 22471. En el PDF no se distinguen valores puntuales por año, pero sí el rango vertical y la estructura temporal del gráfico.




Figure 5.4.6: PDF imported as image




Figure 5.4.7: PDF imported as image

6.2 The califications depend on the teacher at time t

En la Figura 6.2.1 se presenta "Media de Calificaciones por Profesor a lo Largo de los Años" para el Profesor 22471. El gráfico es una serie temporal con años 2019–2025 en el eje horizontal y "Media de Calificación" en el eje vertical (aprox. 5.5–8.5). Este panel contextualiza la necesidad de considerar dependencia temporal (t) al comparar calificaciones entre cohortes.

La Figura 6.2.1 permite evaluar si la media anual del profesor 22471 se mantiene estable o fluctúa a lo largo de 2019–2025 dentro del rango mostrado (aprox. 5.5–8.5). No se distingue con claridad en el PDF la dirección exacta de la tendencia (creciente/decreciente) ni los valores año a año. Por tanto, la evidencia verificable aquí es la existencia de variación longitudinal potencialmente relevante para la estandarización.

6.3 Then, by salon

We standarize by classroom.

Hooray! We got it.




Figure 5.4.8: PDF imported as image



Figure 6.2.1: PDF imported as image

7 Analysis by calification

En el análisis por salón, las Figuras 7.0.1, 7.1.1 y 7.3.1 relacionan el número de visitas con la calificación estandarizada (KDE, Z-score). La Figura 7.0.1 muestra un diagrama de dispersión visitas–Z-score por salón y separa visualmente los grupos “Más de 3 visitas” y “3 o menos visitas”. La Figura 7.1.1 añade una comparación de distribuciones con estadístico $t = 24.34$ y p -valor 0.0000, mientras que la Figura 7.3.1 reporta pruebas no paramétricas, medianas y tamaños de efecto.

Figure 7.0.1: PDF imported as image

La Figura 7.0.1 (“Relación entre Número de Visitas y Calificación por Salón”) es un diagrama de dispersión con “Número de Visitas” en el eje x (0–120) y “Calificación Estandarizada (KDE, Z-score)” en el eje y . La leyenda distingue dos grupos: “Más de 3 visitas” y “3 o menos visitas”. El gráfico permite inspeccionar visualmente la dispersión de Z-scores a distintos niveles de visitas sin implicar causalidad.

7.1 Difference of means

La Figura 7.1.1 (“Comparación de Distribuciones de Calificaciones por Salón”) muestra densidades para los dos grupos de visitas y reporta t -estadístico 24.34 con p -valor 0.0000. El eje horizontal es la

”Calificación Estandarizada (KDE, Z-score)” y el eje vertical es ”Densidad”. En el panel se comparan las dos curvas etiquetadas como ”Más de 3 visitas” y ”3 o menos visitas”.

Figure 7.1.1: PDF imported as image

En la Figura 7.1.1 el contraste paramétrico se presenta como un resumen numérico ($t=24.34$, $p=0.0000$) junto a la superposición de densidades por grupo. El rango del eje de Z-score incluye valores negativos y positivos, permitiendo apreciar diferencias de localización y dispersión entre grupos. El PDF no muestra explícitamente las medias de cada grupo en este panel, por lo que la dirección del cambio debe inferirse de la posición relativa de las curvas.

7.2 Confidence Intervals

Aunque esta subsección no incluye una figura exclusiva, los intervalos de confianza aparecen anotados en la Figura 7.3.1. En particular, se reporta una diferencia de medianas ”mediana = 0.205” con IC95% [0.190, 0.224], junto con un p de permutación para la mediana ($p_{\text{mediana}} = 0.0003999$). Estos elementos visuales conectan la cuantificación de incertidumbre con la comparación entre grupos por salón.

7.3 Robust tests

La Figura 7.3.1 sintetiza pruebas no paramétricas y tamaños de efecto para la comparación por salón. El panel reporta medianas por grupo (0.489 para ”Más de 3 visitas” y 0.284 para ”3 o menos visitas”), además de resultados de Mann–Whitney U ($p = 4.958 \times 10^{-117}$) y Brunner–Munzel ($p = 9.599 \times 10^{-122}$). También incluye métricas de tamaño de efecto (CL=0.620, $r_{rb} = 0.240$, Cliff’s $\delta = 0.243$) sobre el eje de calificación estandarizada.

Figure 7.3.1: PDF imported as image

En la Figura 7.3.1 se detallan, en el propio gráfico, estimadores robustos: diferencia de medianas 0.205 con IC95% [0.190, 0.224] y prueba de permutación para la mediana ($p_{\text{mediana}} = 0.0003999$). El panel incluye además CL=0.620 y $r_{rb} = 0.240$, junto con Cliff’s $\delta = 0.243$, todos asociados a la comparación entre los dos grupos de visitas. El eje x es ”Calificación Estandarizada (KDE, Z-score)” y el eje y es densidad, por lo que las anotaciones se interpretan en la escala estandarizada.

7.4 Confidence intervals

La información de intervalos de confianza para el análisis por salón está integrada en la Figura 7.3.1, no en un panel separado. Además del IC95% para la diferencia de medianas, el gráfico reporta un valor puntual de mediana diferencial (0.205) y el p de permutación asociado. En el PDF no se distinguen bandas de confianza sobre la curva de densidad; la cuantificación de incertidumbre se presenta como texto anotado.

7.5 Interpretation

Para interpretación descriptiva por salón, la Figura 7.3.1 muestra que la mediana del grupo con más de 3 visitas (0.489) excede la del grupo con 3 o menos (0.284) en la escala Z. Los p -valores extremadamente pequeños reportados (Mann–Whitney y Brunner–Munzel) respaldan una diferencia estadísticamente detectable entre distribuciones. Sin embargo, la figura por sí sola no establece causalidad; únicamente documenta separación entre grupos definidos por visitas.

8 Analysis by student

El análisis por estudiante se resume visualmente en las Figuras 8.0.1, 8.1.1 y 8.3.1, todas en la escala "Calificación Estandarizada (KDE, Z-score)". La Figura 8.0.1 muestra la relación visitas–Z-score por estudiante (dispersión), mientras que la Figura 8.1.1 compara densidades e incluye un contraste t con medias y tamaños muestrales. La Figura 8.3.1 añade un bloque de pruebas robustas (no paramétricas) con medianas, tamaños de efecto e intervalos de confianza.

Figure 8.0.1: PDF imported as image

La Figura 8.0.1 ("Relación entre Número de Visitas y Calificación por Estudiante") es un diagrama de dispersión con "Número de Visitas" en el eje x (0–120) y Z-score estandarizado en el eje y . La leyenda distingue "Más de 3 visitas" y "3 o menos visitas". Esta figura permite contrastar la variabilidad individual frente al uso del CMAT, sin agregar por salón.

8.1 Difference of means

En la Figura 8.1.1 ("Comparación de Distribuciones de Calificaciones por Estudiante") se reporta $t = 21.93$ con p -valor 0.0000 y se declara la diferencia como estadísticamente significativa. El gráfico anota las medias: 0.34 (más de 3 visitas) y -0.08 (3 o menos), con diferencia de medias 0.41. También se reportan tamaños muestrales: $n = 1036$ (más de 3) y $n = 9377$ (3 o menos).

Figure 8.1.1: PDF imported as image

La Figura 8.1.1 incluye, además de las curvas de densidad por grupo, marcadores/etiquetas para las medias de cada grupo en la escala Z. El resumen numérico (medias 0.34 vs -0.08; diferencia 0.41; $t = 21.93$; $p=0.0000$) está impreso en el propio panel. Esto permite una lectura verificable de dirección y magnitud del desplazamiento promedio entre grupos, a nivel estudiante.

8.2 Confidence Intervals

Los intervalos de confianza relevantes para el análisis por estudiante se presentan como anotaciones en la Figura 8.3.1. En esa figura se reporta $CL=0.641$ con IC95% [0.625, 0.657] y $r_{rb} = 0.282$ con IC95% [0.250, 0.313]. También se incluye un IC95% para la diferencia de medianas (0.237 con [0.202, 0.284]).

8.3 Robust tests

La Figura 8.3.1 ("Comparación robusta de distribuciones por Estudiante") reporta medianas 0.422 (más de 3 visitas) y 0.185 (3 o menos visitas). Se incluyen pruebas no paramétricas: Mann–Whitney U ($p = 3.224 \times 10^{-50}$) y Brunner–Munzel ($p = 2.023 \times 10^{-57}$), además de tamaños de efecto con intervalos de confianza. El panel también presenta una prueba de permutación para la mediana con $p_{\text{mediana}} = 0.0003999$.

Figure 8.3.1: PDF imported as image

En la Figura 8.3.1 se muestran explícitamente $CL=0.641$ (IC95% [0.625, 0.657]) y Cliff's $\delta = 0.283$ (IC95% [0.234, 0.326]). La diferencia de medianas anotada es 0.237 con IC95% [0.202, 0.284],

junto con $r_{rb} = 0.282$ (IC95% [0.250, 0.313]). Estas cantidades permiten comparar no solo significancia, sino tamaño de efecto entre grupos definidos por visitas, a nivel estudiante.

8.4 Confidence intervals

En ausencia de una figura separada para intervalos, la Figura 8.3.1 concentra la información de incertidumbre mediante IC95% impresos para varios estimadores. En particular, el IC95% para la diferencia de medianas (0.237 con [0.202, 0.284]) y los IC95% para CL y r_{rb} están disponibles en el mismo panel. El PDF no muestra bandas gráficas; los intervalos se reportan como texto anotado.

9 Cute plot

En la sección "Cute plot" se reutilizan visualizaciones del análisis por salón y se añade una agregación por número de visitas. Las Figuras 9.0.1 y 9.1.1 replican, respectivamente, el diagrama de dispersión visitas-Z-score y la comparación de densidades con estadístico t . La Figura 9.3.1 muestra el promedio de Z por salón contra número de visitas, incluyendo un intervalo de confianza del 95%.

Figure 9.0.1: PDF imported as image

La Figura 9.0.1 muestra "Relación entre Número de Visitas y Calificación por Salón" con "Calificación Estandarizada (KDE, Z-score)" en el eje y y "Número de Visitas" en el eje x. Se distinguen dos grupos (más de 3 visitas vs 3 o menos visitas) mediante la leyenda. El rango horizontal llega a aproximadamente 120 visitas, permitiendo ver el comportamiento en la cola de uso intensivo.

9.1 Difference of means

La Figura 9.1.1 (Comparación de Distribuciones de Calificaciones por Salón) superpone densidades de Z-score para ambos grupos y reporta $t = 24.34$ con p -valor 0.0000. El eje x está en Calificación Estandarizada (KDE, Z-score) y el eje y en densidad. El panel permite una lectura directa de la diferencia detectada por la prueba t junto con la forma de las distribuciones.

Figure 9.1.1: PDF imported as image

En la Figura 9.1.1, el resultado paramétrico ($t=24.34$, $p=0.0000$) aparece como texto en el mismo gráfico de densidades. Las curvas están etiquetadas por grupo de visitas, facilitando la comparación visual en la escala estandarizada. No se distinguen en el PDF valores de media explícitos en este panel; la interpretación se apoya en la superposición de densidades y el estadístico reportado.

9.2 Confidence Intervals

Los intervalos de confianza en esta sección se visualizan principalmente en la Figura 9.3.1. Ahí se muestra la serie Media Z por visitas y se incluye explícitamente IC 95% como banda o barras alrededor de la media agregada. Por tanto, la cuantificación de incertidumbre está asociada a la relación promedio Z-número de visitas, no a las densidades de la Figura 9.1.1.

9.3 Robust tests

La Figura 9.3.1 (Z Promedio por Salón vs Número de Visitas) grafica la Media de Z en función del Número de visitas. El panel incluye dos elementos en la leyenda: la media (Media Z por visitas) y su IC 95%. El eje x cubre aproximadamente 0-30 visitas y el eje y muestra medias de Z en el rango aproximado [-0.5, 1.5].

Figure 9.3.1: PDF imported as image

En la Figura 9.3.1, la media de Z por número de visitas se presenta como una serie agregada acompañada de su IC 95%. El PDF no permite distinguir con claridad valores exactos punto a punto, pero sí la escala del eje vertical (media de Z) y el rango de visitas considerado (hasta 30). Esta figura está pensada para inspeccionar tendencias promedio con incertidumbre, sin establecer relaciones causales.

9.4 Confidence intervals

La información de intervalos de confianza para la agregación por visitas está contenida en la Figura 9.3.1 mediante el elemento IC 95%. En el PDF no se muestra una tabla de valores; la incertidumbre se expresa visualmente en torno a la media de Z. En consecuencia, la lectura del IC depende del trazo/banda en la propia figura y de las escalas $[-0.5, 1.5]$ en Z y 0–30 en visitas.

10 Conclusions

10.1 Context and Variables

The outcome variable is the standardized grade per student, `MEAN_IMP KDE_Z`. For each classroom, raw grades were standardized to a Z-score and missing values were imputed using kernel density estimation (KDE). All analyses are therefore carried out on a common standardized scale within classrooms.

Students were divided into two groups according to their cumulative use of the CMAT (Mathematics Learning Center):

- **Group A (frequent CMAT):** students with more than three recorded visits to CMAT ($n_A = 1036$).
- **Group B (low or no CMAT):** students with three or fewer visits ($n_B = 9377$).

10.2 Hypothesis

Null hypothesis:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

Students with frequent CMAT use do not differ in their standardized grades from students with low or no CMAT use.

Alternative hypothesis:

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

There is a difference in mean standardized grades between the two groups.

10.3 Parametric Test

A Welch two-sample t -test was conducted comparing standardized grades across groups. The test yielded:

- $t = 21.93$
- $p < 0.0001$
- $\text{Mean}(A) = 0.34$
- $\text{Mean}(B) = -0.08$
- Difference in means = 0.41

Conclusion: Since the p -value is effectively zero, the null hypothesis is rejected. Frequent CMAT users have significantly higher standardized grades on average.

10.4 Robust (Non-Parametric) Evidence

Given the non-normality of standardized grades, robust tests were also applied. Results were consistent with the parametric finding:

- $\text{Median}(A) = 0.422$
- $\text{Median}(B) = 0.185$
- Difference in medians = 0.237 (CI95% [0.202, 0.284])

- Mann-Whitney U test: $p = 3.224 \times 10^{-50}$
- Brunner-Munzel test: $p = 2.023 \times 10^{-57}$
- Common-language effect size: $CL = 0.641$ (CI95% [0.625, 0.657])
- Rank-biserial correlation: $r_{rb} = 0.282$ (CI95% [0.250, 0.313])
- Cliff's delta: $\delta = 0.283$ (CI95% [0.234, 0.326])

Interpretation: A student with more than three CMAT visits has a 64% probability of having a higher standardized grade than a student with three or fewer visits. Effect sizes are moderate but consistent.

10.5 Final Conclusion

Across both parametric and robust tests, students who attended CMAT more than three times exhibited significantly higher standardized grades. The evidence supports the claim that frequent CMAT use is associated with improved academic performance, although the analysis is observational and does not establish causality.