Dr.
Juan Carlos Hernaiz Leonardo
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Cirugía de Senos Paranasales y Base de Cráneo
Cirugía de Cabeza y Cuello

INR LGII

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE PULMICORT CON ATOMIZADOR

1. Antes de administrar el medicamento, asegúrate de tener lo siguiente:
   a. (1) Ampolleta de Pulmicort (2 mg de 0.5 mg/mL).
   b. (1) Dispositivo atomizador de mucosa con la punta asegurada a una jeringa de 3 mL.
2. Lávate las manos con agua tibia y jabón. Seca bien tus manos.

3. Abre la ampolleta de Pulmicort girando la tapa hasta que esté completamente desprendida, dejando abierta la ampolleta para verter el medicamento.

4. Coloca la jeringa con la punta hacia abajo (sin aguja) y coloca un dedo en la punta de la jeringa. La parte trasera de la jeringa debe estar abierta (sin el émbolo) y mirando hacia arriba, lista para ser cargada con el medicamento.

5. Vierte el medicamento de la ampolleta en el extremo abierto de la jeringa (parte trasera). Es importante cubrir la punta de la jeringa con el dedo para evitar que se derrame el medicamento. Asegúrate de que no quede medicamento en la ampolleta.

6. Coloca nuevamente el émbolo en la jeringa y gírala, para que quede la punta hacia arriba. Avanza el émbolo suavemente para eliminar el aire de la jeringa. Ten cuidado de no presionar demasiado, ya que el medicamento puede salir. Asegúrate de que haya 2 mL de medicamento dentro de la jeringa. Coloca el dispositivo atomizador de mucosa.

7. Recuéstate en tu cama dejando que tu cabeza cuelgue por el borde.
   (Consulta la imagen o visita https://www.stpaulssinuscentre.com/patients/ y después desliza hacia abajo para ver los video de "Mucosal Atomization Device (MAD)" si quieres ver un video tutorial).



8. Introduce la punta hasta donde sea cómodo. Usa tu mano derecha para aplicar Pulmicort en tu fosa nasal izquierda y tu mano izquierda para aplicarlo en tu fosa nasal derecha (mano contraria a la fosa nasal a tratar). **Esto asegura que la jeringa esté orientada hacia el ojo del lado de la fosa nasal en la que se aplica y alejada del tabique nasal – puente de la nariz**.

9. Presiona el émbolo firmemente hasta que se haya administrado la mitad del medicamento. Aproximadamente 1 mL debe quedar dentro de la jeringa. La mitad restante se usará para la otra fosa nasal.

10. Repite los pasos #8 y #9 en la fosa nasal contraria. Ahora se habrán utilizado los 2 mL del medicamento, distribuidos por igual en ambas fosas.

11. Una vez completado, permanece recostado con la cabeza colgando por el borde de la cama durante 1 minuto. Esto es importante para asegurar que el medicamento alcance los senos frontales.

12. Después de 1 minuto, levántate lentamente de la cama y limpia cualquier exceso de medicamento que pueda haberse derramado por la nariz.

13. La administración de Pulmicort en tus senos paranasales está completa. Asegúrate de repetir estos pasos tan frecuentemente como lo indique el Dr. Juan Carlos Hernaiz.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA JERINGAS, ATOMIZADOR Y FRASCO MEZCLADOR

Materiales necesarios:

- Alcohol isopropílico al 70%
- Un recipiente pequeño de vidrio o plástico, lo suficientemente grande para contener las jeringas, el frasco y el atomizador.
  Recipiente limpio lavado con agua caliente y jabón; enjuagado y seco.
- Una toalla de papel limpia para colocar el equipo a secar al aire.

Procedimiento:

1. Extrae el émbolo de la jeringa. Desenrosca la tapa. Enjuaga bajo agua corriente fría y luego colócalos en el recipiente. Usa agua fría hervida o embotellada para enjuagar si el agua de tu zona no es segura para beber.

2. Vierte alcohol al 70% sobre los artículos hasta que estén completamente cubiertos. Déjalos remojando durante una hora.

3. Con las manos limpias, retira los artículos del recipiente y colócalos sobre una toalla de papel limpia. Déjalos secar completamente al aire sobre una superficie limpia.

4. Si estás usando un atomizador, enjuágalo con alcohol y deja que la jeringa se seque al aire sobre una toalla de papel limpia.

5. Una vez seco, guarda todo en una bolsa de plástico tipo "Ziploc" después de cada limpieza.

6. Desecha la jeringa y el atomizador y cámbialos por unos nuevos cada mes.

Consejo para viajar:

1. Es recomendable llevar jeringas adicionales para cada aplicación, para reducir la cantidad de equipo necesario (como el alcohol embotellado).

2. Empaca equipo adicional en caso de mal funcionamiento, daño o pérdida (por ejemplo, el atomizador). Guarda las secciones de toalla de papel en una bolsa Ziploc limpia y usa pañuelos desechables o toallas de papel para que el equipo se seque al aire. Usa toallitas con alcohol, si no tienes acceso a una botella de alcohol.

3. En caso de que tu medicamento deba mantenerse refrigerado, puedes usar una hielera pequeña de plástico, tela aluminizada o unicel