

Material suplementar

Padrões contrastantes de resposta da fotossíntese líquida MODIS ao ENSO ao longo de um gradiente hidroclimático tropical
Oliveira, Benfica e Zanchi

Tabela 1: **Tabela S1.** Os dez efeitos cujo intervalo de confiança exclui o zero com o mês como unidade amostral, recalculados com o episódio como unidade. Δ é a mesma estatística nos dois esquemas; o que muda é a reamostragem. Entre parênteses, o valor de q de Benjamini-Hochberg sobre a família dos 30 testes. Em negrito, os três efeitos com p bruto abaixo de 0,05 no esquema por episódio; nenhum deles sobrevive à correção.

Bioma	Var.	Fase	Δ (p.p.)	Mês como unidade		Episódio como unidade	
				IC95%	p (q)	IC95%	p (q)
Mata Atlântica	TST	El Niño	+3,07	+1,7 a +4,4	<0,001 (0,002)	+ 0,9 a + 5,3	0,005 (0,15)
Caatinga	PSN	La Niña	+10,45	+4,4 a +16,4	0,001 (0,005)	+ 0,4 a + 16,9	0,044 (0,44)
Mata Atlântica	PSN	El Niño	-5,44	-8,7 a -2,3	0,001 (0,005)	- 9,2 a - 0,05	0,048 (0,44)
Cerrado	PSN	La Niña	+11,75	+4,3 a +18,9	0,003 (0,011)	-1,5 a +24,3	0,081 (0,44)
Caatinga	WAI	La Niña	+12,47	+5,2 a +19,6	<0,001 (0,004)	-2,2 a +22,0	0,086 (0,44)
Cerrado	WAI	La Niña	+13,99	+6,8 a +21,1	<0,001 (0,002)	-2,6 a +27,9	0,087 (0,44)
Caatinga	EV	La Niña	+10,85	+4,5 a +17,2	<0,001 (0,004)	-2,2 a +19,8	0,103 (0,44)
Cerrado	EV	La Niña	+10,22	+4,3 a +15,8	<0,001 (0,004)	-3,5 a +21,5	0,135 (0,51)
Cerrado	EV	El Niño	+7,51	+0,6 a +14,5	0,031 (0,093)	-6,8 a +23,2	0,322 (0,73)
Caatinga	TST	La Niña	-2,14	-3,7 a -0,6	0,008 (0,027)	-5,2 a +2,1	0,327 (0,73)

As 30 comparações completas dos dois esquemas, a estratificação sazonal completa e o código que as produz estão em <https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia> (arquivos `bootstrap_unidade_amostrai.csv` e `estratificacao_sazonal.csv`).