

### TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

#### Nombre del autor

Asesorada por Nombre del asesor

#### UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



#### ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

#### TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

TRABAJO DE GRADUACIÓN
PRESENTADO A LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
POR

### NOMBRE DEL AUTOR

ASESORADA POR NOMBRE DEL ASESOR

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE LICENCIADA EN MATEMÁTICA APLICADA

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2015

# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS



#### CONSEJO DIRECTIVO INTERINO

Director M.Sc. Jorge Marcelo Ixquiac Cabrera

Representante Docente Arqta. Ana Verónica Carrera Vela

Representante Docente M.A. Pedro Peláez Reyes

Representante de Egresados Lic. Urías Amitaí Guzmán García

Representante de Estudiantes Elvis Enrique Ramírez Mérida

Representante de Estudiantes Oscar Eduardo García Orantes

Secretario Ing. Edgar Damián Ochóa Hernández

#### TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

Director Director

Examinador 1

Examinador Examinador 2

Examinador Examinador 2

Secretario Secretario

	Fecha
datos	
cuerpo	
despedida	
firma	
nombre	

Este archivo pdf es una muestra

## AGRADECIMIENTOS

## **DEDICATORIA**

# ÍNDICE GENERAL

INDICE DE FIGURAS	III
ÍNDICE DE TABLAS	V
LISTA DE SÍMBOLOS	VII
OBJETIVOS	IX
INTRODUCCIÓN	XI
1. CONCEPTOS PRELIMINARES  1.1. Conjuntos, funciones y sucesiones	. 1
2. CITAS BIBLIOGRÁFICAS	7
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES	11
BIBLIOGRAFÍA	13

# ÍNDICE DE FIGURAS

1.1.	Titulo en el índice de	figuras	(opcional).															4	Į
------	------------------------	---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

# ÍNDICE DE TABLAS

1.1.	título optativo de la tabla	 	4
1.2.	Long table caption	 	ŗ

# LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
:=	es definido por
$\cong$	es isomorfo a
$\Leftrightarrow$	si y sólo si
Ø	conjunto vacío
$E^c$	complemento de $E$
≨	estrictamente contenido
$E \setminus F$	diferencia entre $E$ y $F$
$E\Delta F$	diferencia simétrica entre $E$ y $F$
$\mathcal{P}(X)$	conjunto potencia de $X$
$\chi_E$	función característica de ${\cal E}$
$E_n \uparrow$	$E_n$ es una sucesión creciente
$\mathfrak{L}$	$\sigma$ -álgebra de los conjuntos Lebesgue-medibles
$\mathscr{S}$	espacio muestral
$\mathfrak{A}$	$\sigma$ -álgebra de eventos
$(\mathscr{S},\mathfrak{A},P)$	espacio de probabilidad
$\mathscr{D}$	espacio de las funciones de prueba
$\mathscr{D}'$	espacio de las distribuciones
$\delta_0$	medida de Dirac, función $\delta$ de Dirac o $\delta\text{-función}$
$\Phi^{ imes}$	espacio antidual de $\Phi$
$\Phi\subset\mathcal{H}\subset\Phi^{\times}$	espacio de Hilbert equipado o tripleta de Gel'fand
$ \psi angle$	vector ket
$\langle \psi  $	funcional $bra$
$\langle arphi   \psi  angle$	braket

## **OBJETIVOS**

## General

Escriba el objetivo general.

# Específicos

Enumere los objetivos específicos.

1.

2.

# INTRODUCCIÓN

#### 1. CONCEPTOS PRELIMINARES

### 1.1. Conjuntos, funciones y sucesiones

En adición a los conjuntos de puntos que se trabajan con normalidad en Matemáticas —puras y aplicadas—, se tendrá que hacer uso frecuentemente de los conjuntos de conjuntos, si por ejemplo X es la recta real, como un intervalo es un conjunto de puntos, es decir un subconjunto de X, se tendrá que el conjunto de todos los intervalos es un conjunto de conjuntos.

En especial, cuando una clase hace referencia a subconjuntos del conjunto X, la llamaremos **familia**. En especial el **conjunto potencia**  $\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$  es una familia de X. Asimismo, se definirá el **complemento** de A por

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}.$$

- **1.1 Definición.** Una función de selección para un conjunto X es una función f la cual asocia a cada subconjunto no vacío E de X un elemento de E:  $f(E) \in E$ .
- 1.2 Axioma (de selección). Para cualquier conjunto existe una función de selección.
- **1.3 Nota.** Con frecuencia el axioma 1.2 se presenta en la forma: para cada  $E \in \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ , elegimos un elemento  $x \in E$ . Asimismo, es equivalente al lema de Zorn, para más detalles consultar [8, p. 97], [9, p. 338] o [11, p. 14].

Una clase disjunta es una clase A de conjuntos tal que para cualquier par de conjuntos distintos de A son disjuntos, en este caso nos referiremos a la unión de conjuntos de A como unión disjunta.

Si E es un subconjunto de X, la función  $\chi_E$  definida para  $x \in X$  por la relación:

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in E, \\ 0, & \text{si } x \notin E. \end{cases}$$
 (1.1)

Es llamada función característica del conjunto E. La correspondencia entre los conjuntos y sus funciones características es inyectiva, y todas las propiedades de conjuntos y operaciones entre conjuntos pueden ser expresadas por medio de funciones características.

**Tabla 1.1.** Propiedades de los espacios  $L^p$ .

Espacio	Reflexivo <sup>1</sup>	Separable	Dual
$L^p, 1$	Si	Si	$L^q$ , $1/p + 1/q = 1$
$L^1$	No	Si	$L^{\infty}$
$L^{\infty}$	No	No	$L^1 \subsetneq (L^\infty)'$

Fuente: tomada de [2, Cap. 3].

**1.4 Definición.** Si  $\{E_n\}$  es una sucesión de conjuntos, definiremos los conjuntos  $\overline{\lim} E_n$  y  $\underline{\lim} E_n$  de la siguiente forma:

$$\overline{\lim} E_n = \limsup_{n \to \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=n}^{\infty} E_i, \quad \underline{\lim} E_n = \liminf_{n \to \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{i=n}^{\infty} E_i$$

y los llamaremos **límite superior** y **límite inferior**, respectivamente, de la sucesión  $\{E_n\}$ . Si tenemos  $\overline{\lim}E_n = \underline{\lim}E_n$ , usaremos la notación  $\lim_n E_n$  para este conjunto. Si la sucesión es tal que  $E_n \subset E_{n+1}, n = 1, 2, ...$  le llamaremos **creciente** y se denotará por  $E_n \uparrow$  y su límite será  $\lim_{n \to \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ ; si es tal que  $E_n \supset E_{n+1}, n = 1, 2, ...$  le llamaremos **decreciente** y se denotará por  $E_n \downarrow$  y su límite será  $\lim_{n \to \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ . En ambos casos nos referiremos a ella como **monótona**.

**1.5 Definición.** Sea f una aplicación definida del conjunto X al conjunto Y, es decir  $f: X \longrightarrow Y$ . Para cualquier subconjunto  $T \subseteq Y$ , definimos la **imagen inversa** de T, bajo f, denotada por  $f^{-1}(T)$ , como sigue:

$$f^{-1}(T) = \{ s \in X \mid f(s) \in T \}.$$

**1.6 Teorema.** Para la aplicación  $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$  se tienen las propiedades siguientes:

1. 
$$f^{-1}(\bigcup_j T_j) = \bigcup_j f^{-1}(T_j)$$
.

2. 
$$f^{-1}(\bigcap_j T_j) = \bigcap_j f^{-1}(T_j)$$
.

3. Si 
$$T_1 \cap T_2 = \emptyset$$
, entonces  $f^{-1}(T_1) \cap f^{-1}(T_2) = \emptyset$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>En el sentido topológico.

4. 
$$f^{-1}(T^c) = [f^{-1}(T)]^c$$
.

5. 
$$f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$$
.

6. 
$$f^{-1}(Y) = X$$
.

Las propiedades (1) y (3) del teorema 1.6 establecen las condiciones para la unión disjunta en una familia en Y. Sea ahora  $\mathfrak{D}$  una familia cualquiera de subconjuntos de Y, y definamos la familia  $f^{-1}(\mathfrak{D})$  de subconjuntos de X como sigue:

$$f^{-1}(\mathfrak{D}) = \{ A \subseteq X \mid A = f^{-1}(T) \text{ para algún } T \in \mathfrak{D} \} = \{ f^{-1}(T) \mid T \in \mathfrak{D} \}.$$
 (1.2)

El sistema de números reales extendido o **recta real extendida** es el conjunto definido por  $[-\infty, +\infty] := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ , con la siguiente relación de orden: para  $a \in \mathbb{R}$  tenemos  $-\infty < a < +\infty$ . La topología para este conjunto se define por declarar como abiertos a los siguientes conjuntos: (a, b),  $[-\infty, b)$ ,  $(a, +\infty]$  y cualquier unión de conjuntos de este tipo. Cuando se haga referencia a los **números reales extendidos** o **valor real extendido**, se estará hablando de los números reales y de los símbolos  $\pm \infty$ . Cuando trabajamos con teoría de la integración, nos encontraremos con  $\infty$ , una razón es que algunas veces trataremos de integrar sobre conjuntos de medida infinita, este es caso de la recta real.

Por tal motivo, se hacen las siguientes definiciones para facilitar su manejo:  $a+\infty=\infty+a:=\infty$  si  $0\leq a\leq \infty$ , y

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a := \begin{cases} \infty, & \text{si } 0 < a \le \infty \\ 0, & \text{si } a = 0 \end{cases}$$
 (1.3)

las leyes de cancelación se tratan así:  $a+b=a+c \ \Rightarrow \ b=c \ \text{y} \ a\cdot b=a\cdot c \ \Rightarrow \ b=c$  sólo cuando  $0< a<\infty$ .

1.7 **Definición.** Sea  $\{a_j\}$  una sucesión en la recta real extendida, y sean  $b_k = \sup\{a_k, a_{k+1}, a_{k+2} \dots\}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , y  $\beta = \inf\{b_1, b_2, b_3, \dots\}$ . Entonces llamaremos a  $\beta$  el **límite superior** de  $\{a_j\}$ , y escribiremos  $\beta = \limsup_{j \to \infty} (a_j)$ . El **límite inferior** se define análogamente, al intercambiar sup e inf en las anteriores definiciones; notemos que


$$\lim_{j \to \infty} \inf(a_j) = -\lim_{j \to \infty} \sup(-a_j).$$

Si  $\{a_j\}$  converge, entonces tenemos  $\liminf_{j\to\infty}(a_j)=\limsup_{j\to\infty}(a_j)=\lim_{j\to\infty}(a_j)$ .

- **1.8 Proposición.** Si  $0 \le a_1 \le a_2 \le \cdots$ ,  $0 \le b_1 \le b_2 \le \cdots$ , tales que  $a_j \longrightarrow a$  y  $b_j \longrightarrow b$ . Entonces  $a_j b_j \longrightarrow ab$ .
- **1.9 Definición.** Supongamos que  $\{f_j\}$  es una sucesión de funciones de valor real extendido en un conjunto X. Entonces  $\sup_j f_j$  y  $\limsup_{j\to\infty} f_j$  son las funciones definidas en X por:

$$\left(\sup_{j} f_{j}\right)(x) := \sup_{j} (f_{j}(x)), \quad \left(\limsup_{j \to \infty} f_{j}\right)(x) := \limsup_{j \to \infty} (f_{j}(x)).$$

Si  $f(x) = \lim_{j \to \infty} f_j(x)$ , y asumimos que el límite existe para cualquier  $x \in X$ , entonces llamaremos a f el **límite puntual** de la sucesión  $\{f_j\}$  y hablaremos de **convergencia puntual** en este contexto.



**Figura 1.1.** Título en el documento. Las imágenes pueden ser raster (de preferencia jpg, png con buena resolución para imprimir) o vectorial (convertir a pdf, en este caso la resolución no afecta) Fuente: imagen tomada de [15].

**1.10 Lema.** Sean  $z, w \in \mathbb{C}$ , 1 y <math>1/p + 1/q = 1. Entonces tenemos

$$|z+w|^q + |z-w|^q \le 2(|z|^p + |w|^p)^{\frac{1}{p-1}}.$$

Demostración. Consultar [11, p. 227].

- **1.11 Definición.** Sea  $f: X \longrightarrow [-\infty, +\infty]$  una aplicación. Se definen las aplicaciones  $f^+ := \max\{f, 0\}, \ f^- := -\min\{f, 0\}, \ a \ f^+ \ y \ f^-$  se les llama la **parte positiva y negativa** de f, respectivamente.
- **1.12 Proposición.** Para cualquier aplicación  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$  denotaremos su valor absoluto con |f|, entonces tenemos

$$|f| = f^+ + f^-, \quad f = f^+ - f^-.$$

Texto. Texto.

Tabla 1.2. Long table caption.

Begin of Table			
Something	something else		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		

Continuation of Table 1.2			
Something	something else		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
Lots of lines	like this		
End o	of Table		

Fuente: La tabla se generó a partir del código dado en https://www.overleaf.com/learn/latex/tables con ligeros cambios.

Continúa el texto.

### 2. CITAS BIBLIOGRÁFICAS

#### 2.1 Teorema. Un teorema para este capítulo.

Comando	Salida
\cite{Brez}	[2]
\cite[sufijo]{Hewit}	[11, sufijo]
\cite[prefijo][sufijo]{Brez}	[prefijo 2, sufijo]
\citet{Brez,liu}	Brezis [2], Liu y otros [15]
\citep{Brez,liu}	[2, 15]
\citealt{Brez,liu}	Brezis 2, Liu y otros 15
\citealp{Brez,liu}	2, 15
\citeauthor{liu}	Liu y otros
\citeauthor*{liu}	Liu, Sun y Yau
\citeyear{Brez,Hewit}	1992, 1965
\citeyearpar{Brez,Hewit}	[1992, 1965]
·	

Los comando aceptan [sufijo] y [prefijo], el segundo requiere agregar un sufijo.

En algunos casos es necesario dar la cita completa (es costumbre en algunos ámbitos al citar por primera vez), el código \citefull{liu}, p. 573 produce Liu, Kefeng; Sun, Xiaofeng y Yau, Shing-Tung: «Canonical metrics on the moduli space of Riemann surfaces. I». *J. Differential Geom*, 2004, **68(3)**, pp. 571–637, p. 573.

# CONCLUSIONES

- 1. Conclusión 1.
- 2. Conclusión 2.
- 3. Conclusión 3.

## RECOMENDACIONES

- 1. Recomendación 1.
- 2. Recomendación 2.
- 3. Recomendación 3.

### BIBLIOGRAFÍA

- [1] Albin, Pierre; Leichtnam, Eric; Mazzeo, Rafe y Piazza, Paolo: «The signature package on Witt spaces». *Ann. Sci. Ec. Norm. Supér.*, 2012, **45(2)**, pp. 241–310.
- [2] Brezis, H.: Analyse functionnelle, théorie et applications. Collection Mathématiques Appliquées pour la Maítrise. Masson, Paris, 1992.
- [3] CHOQUET-BRUHAT, Y; DEWITT-MORETTE, C y DILLARD-BLEICK, M: Analysis, manifolds and physics. volumen 1. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1996.
- [4] COURANT, R y HILBERT, D: Methods of mathematical physics. volumen 2. Interscience Publishers, Nueva York, 1962.
- [5] DE LA MADRID, R.: «The Rigged Hilbert Space of the Free Hamiltonian». *International Journal of Theoretical Physics*, 2003, **42**, pp. 2441–2460. doi: 10.1023/B:IJTP.0000005968.76452.6b.
- [6] ESCAMILLA-CASTILLO, J. Topología. s.e., Guatemala, 2ª edición, 1992.
- [7] HAASER, N y SULLIVAN, J: Análisis real. Traducido por Ricardo Vinós. Trillas, México, 1978.
- [8] HALMOS, P.: Teoría intuitiva de los conjuntos. Traducido por Antonio Martín. Compañía Editorial Continental S.A., México, 8<sup>a</sup> edición, 1973.
- [9] HAUSDORFF, FELIX: Set theory. Chelsea Publishing Company, Nueva York, 2<sup>a</sup> edición, 1962.
- [10] Heisenberg, Werner: The physical principles of the quantum theory. Dover Publications, Inc., Nueva York, 1949.
- [11] HEWITT, E. y STROMBERG, K.: Real and abstract analysis. Springer-Verlag, New York, 1965.

- [12] KOLMOGOROV, A. y FOMIN, S.: Elementos de la teoría de funciones y del análisis funcional. Traducido por Carlos Vega. MIR, Moscú, 1975.
- [13] KRONZ, FRED y LUPHER, TRACY: «Quantum Theory: von Neumann vs. Dirac». En: Edward N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University, verano 2012<sup>a</sup> edición, 2012. https://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/qt-nvd/
- [14] LEADER, ELLIOT y LORCÉ, CÉDRIC: «The angular momentum controversy: What's it all about and does it matter?» *Physics Reports*, 2014, **541(3)**, pp. 163–248.
- [15] LIU, KEFENG; SUN, XIAOFENG Y YAU, SHING-TUNG: «Canonical metrics on the moduli space of Riemann surfaces. I». *J. Differential Geom*, 2004, **68(3)**, pp. 571–637.
- [16] OMNES, ROLAND: The interpretation of quantum mechanics. Princeton University Press, 1994.
- [17] PENROSE, R.: La mente nueva del emperador. Traducido por José García. Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- [18] STERNBERG, SHLOMO: «Theory of functions of a real variable.», 2005. http://www.math.harvard.edu/~shlomo/docs/Real\_Variables.pdf
- [19] TESCHL, GERALD: Mathematical methods in quantum mechanics. volumen 157. American Mathematical Soc., 2014.