

Verifica del Software - Esercizi parte 2

Università degli Studi di Padova

Mirko Bez

18 febbraio 2017

Indice

Esercizio 1	2
Esercizio 2	2
Esercizio 3	2
Esercizio 4	3
Esercizio 5	3
Esercizio 6	3
Esercizio 7	3
Esercizio 8	4
Esercizio 9	4

Esercizio 1

Consegna Let (α, C, A, γ) be a Galois connection. Prove that:

(A) γ is injective, \iff

(B) $\alpha \circ \gamma = id$ \iff

(C) α is surjective.

Svolgimento

Esercizio 2

Consegna Let C and A be complete lattices and let (α, C, A, γ) be a Galois connection. Prove the following properties:

1. $\gamma(\alpha(\top_C)) = \top_C$
2. for any $a \in A, \gamma(a) = \bigwedge \{c \in C \mid \alpha(c) \leq_A a\}$
3. for any $c_1, c_2 \in C, \alpha(c_1 \vee_C c_2) = \alpha(c_1) \vee_A \alpha(c_2)$
4. for any $c \in C, \gamma(\alpha(\gamma(\alpha(c)))) = \gamma(\alpha(c))$

Svolgimento

1. $\gamma(\alpha(\top_C)) = \top_C$

Dimostrazione. Posso dimostrare le seguenti disuguaglianze per ottenere il risultato cercato:

- a) $\gamma(\alpha(\top_C)) \leq_C \top_C$: Segue direttamente dal fatto che $\gamma : A \rightarrow C$. Infatti γ restituisce un valore in C che è sicuramente minore o uguale a \top_C . Il tutto vale perchè α e γ sono funzioni totali.
- b) $\top_C \leq_C \gamma(\alpha(\top_C))$: Segue direttamente dalla proprietà numero (3) ($\forall c \in C. c \leq_C \gamma(\alpha(c))$) della Galois Connection.

visto che valgono le disuguaglianze 1a e 1b, per l'antisimmetria del poset (C, \leq_C) posso concludere $\gamma(\alpha(\top_C)) = \top_C$. \square

2. $\forall a \in A, \gamma(a) = \bigwedge \{c \in C \mid \alpha(c) \leq_A a\}$

3. $\forall c_1, c_2 \in C, \alpha(c_1 \vee_C c_2) = \alpha(c_1) \vee_A \alpha(c_2)$

4. $\forall c \in C, \gamma(\alpha(\gamma(\alpha(c)))) = \gamma(\alpha(c))$ Dimostro le due disuguaglianze separatamente:

- a) $\forall c \in C. \gamma(\alpha(c)) \leq_C \gamma(\alpha(\gamma(\alpha(c))))$ segue direttamente dalla proprietà (4) e dalla totalità di α e γ .
- b) $\forall c \in C. \gamma(\alpha(\gamma(\alpha(c)))) \leq_C \gamma(\alpha(c))$ Per la proprietà (5) della Galois Connection (e la totalità di α e γ) vale la seguente relazione

$$\alpha(\gamma(\alpha(c))) \leq_A \alpha(c)$$

vale per ogni c perchè ogni c viene mappato ad un a . Per via della monotonia di γ ottengo:

$$\gamma(\alpha(\gamma(\alpha(c)))) \leq_C \gamma(\alpha(c))$$

che era la relazione da dimostrare.

Ora siccome valgono le due relazioni per l'antisimmetria vale anche l'uguaglianza.

Esercizio 3

Consegna Let C and A be complete lattices, (α, C, A, γ) be a Galois insertion, $op : C^2 \rightarrow C$ be a monotone concrete operation and $op^a : A^2 \rightarrow A$ be a monotone abstract operation. Prove the following equivalence:

$$\begin{aligned} \forall (a_1, a_2) \in A^2 . \alpha(op(\gamma(\alpha_1), \gamma(\alpha_2))) \leq_A op^a(a_1, a_2) \\ \iff \\ \forall (c_1, c_2) \in C^2 . op(c_1, c_2) \leq_C \gamma(op^a(\alpha(c_1), \alpha(c_2))) \end{aligned}$$

Svolgimento

Esercizio 4

Consegna Let $\langle C, \leq_C \rangle$ be a complete lattice and let $S \subseteq C$ be a subset of C which is meet-closed, that is:

$$\forall Y \subseteq S. \bigwedge_C Y \in S$$

Prove that $\langle S, \leq_C \rangle$ can be viewed as an abstract domain of C where the concretization map $\gamma : S \rightarrow C$ is the identity.

Svolgimento

Esercizio 5

Consegna Let C and A be complete lattices, (α, C, A, γ) be a Galois insertion, $f : C \rightarrow C$ be a monotone concrete operation and $f^\# : A \rightarrow A$ be a monotone abstract operation such that: $f \circ \gamma = \gamma \circ f^\#$. Prove that $\alpha(gfp(f)) = gfxp(f^\#)$.

Svolgimento

Esercizio 6

Consegna Let C and A be complete lattices, (α, C, A, γ) be a Galois insertion, $f : C \rightarrow C$ be a monotone concrete operation and $f^\# : A \rightarrow A$ be a monotone abstract operation such that: $\alpha \circ f = f^\# \circ \alpha$.

1. Prove that $\alpha(lfp(f)) = lfp(f^\#)$.
2. Give a counterexample to the equality $lfp(f) = \gamma(lfp(f^\#))$.

Svolgimento

Esercizio 7

Consegna Let $(\alpha, \langle A, \leq_A \rangle, \langle \wp(Z), \subseteq \rangle, \gamma)$ be a Galois connection. Let $\mathbb{S}^A : Var \rightarrow A$ and consider the standard pointwise order \sqsupseteq between functions: $s_1^\# \sqsupseteq s_2^\#$ when for any $x \in Var$, $s_1^\#(x) \leq_A s_2^\#(x)$. Prove that $(\alpha_s, wp(State), \mathbb{S}^A, \gamma_s)$ is a Galois connection, where:

- $\alpha_s(T) \triangleq \lambda x. \alpha(\{s(x) \mid s \in T\})$
- $\gamma_s(s^\#) \triangleq \{s \in State \mid \forall x \in Var. \alpha(\{s(x)\}) \leq_A s^\#(x)\}$

Svolgimento

Esercizio 8

Consegna *Consider the following abstract domain of $\langle \wp(\mathbb{Z}, \subseteq) \rangle$*

Svolgimento

Esercizio 9

Svolgimento