OC2 Reaktionen

13. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aldehyde und Ketone **2**

1.1 wichtige Vertreter . . . 2

1.2 technische Synthese Formaldehyd . . . 2

1.3 technische Synthese Acetaldehyd . . . 2

1.4 Elektrophile Additionen . . . 2

1.4.1 Protonierung von Carbonylen . . . 2

1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation . . . 2

1.5 Nucleophile Additionen . . . 3

1.5.1 Hydrate . . . 3

1.5.2 Bisulfit-Addukte . . . 3

1.5.3 Halbacetale/Acetale . . . 4

1.5.4 Halbacetale/Acetale . . . 4

1.5.5 N,N-Acetale . . . 6

1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 technische Synthese Formaldehyd

1.3 technische Synthese Acetaldehyd

1.4 Elektrophile Additionen

1.4.1 Protonierung von Carbonylen



1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation



1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.



1.5.1 Hydrate



Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

1.5.3 Halbacetale/Acetale



Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nichr das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale



Acetalspaltung



Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.



Dithioacetale



Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Saurerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung



Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stablisiert.

1.5.5 N,N-Acetale