

OC2 Reaktionen

19. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aldehyde und Ketone	4
1.1	wichtige Vertreter	4
1.2	Technische Synthese Formaldehyd	4
1.3	Technische Synthese Acetaldehyd	4
1.4	Elektrophile Additionen	4
1.4.1	Protonierung von Carbonylen	4
1.4.2	Oligomerisierung/Polymerisation	5
1.5	Nucleophile Additionen	5
1.5.1	Hydrate	6
1.5.2	Bisulfit-Addukte	6
1.5.3	Halbacetale/Acetale	7
1.5.4	Halbacetale/Acetale	7
1.5.5	N,N-Acetale	9
1.5.6	Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone	9
1.5.7	sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom	10
1.5.8	Cyanhydrine	10
1.5.9	Alkohole durch Grignard-Addition	11
1.5.10	Benzoinkondensation	11
1.5.11	Stetter Reaktion	12
1.5.12	Aminotriphenylmethanfarbstoffe	13
1.5.13	Wittig Reaktion	13
1.5.14	Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion	15
1.6	Oxidationen und Reduktionen	15
1.6.1	Oxidation von Aldehyden	15
1.6.2	Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure	15
1.6.3	Baeyer-Villiger-Oxidation	16
1.6.4	Clemmensen-Reduktion	16
1.6.5	Katalytische Hydrierung	16
1.6.6	Wolf-Kishner-Reduktion	17
1.6.7	Reduktion mit Metallhydriden	18
1.6.8	Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation	18
1.6.9	Cannizzaro-Reaktion	18
1.6.10	Leuchat-Wallach-Reaktion	19
1.6.11	Einelektronenreduktion	19
1.6.12	Enzymatische Reduktion	20
1.7	Reaktionen von Enolen und Enolaten	20
1.7.1	Allgemeines	20
1.7.2	Erzeugung von Nucleophilen Kohlenstoffen über Enolate	20
1.7.3	Halogenierung	21
1.7.4	Mannich Reaktion	21
1.7.5	Aldol Kondensation	22
1.7.6	Gekreuzte Aldolkondensation	23
1.7.7	Claisen'sche Ester Kondensation	23


1.7.8	Dieckmann-Kondensation	24
1.7.9	Acetessigester-Synthese	24
1.7.10	Säurespaltung von Claisen-Ester-Kondensations-Produkten	24
1.7.11	Malonester-Synthese	25
1.7.12	Darzens-Glycidester-Synthese	25
1.7.13	Knoevenhagel-Reaktion	25
1.7.14	Michael Reaktion	26
1.7.15	Robinson Anellierung	26
2	Metallorganische Verbindungen	27
2.1	Reaktionen	27
2.1.1	Hydrolyse	27
2.1.2	Oxidation	27
2.1.3	Reaktionen als C-Nucleophile	28
3	Carbonsäuren und Derivate	28
3.1	Stoffchemie der Carbonsäuren	28
3.2	Carbonsäuren	29
3.2.1	Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren	29
3.2.2	Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)	29
3.2.3	Decarboxylierung von β -Ketosäuren	30
3.3	Ester und Amide	31
3.3.1	Veresterung mit Diazomethan	31
3.3.2	Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe	31
3.3.3	Fischer-Veresterung	31
3.3.4	Esterverseifung	32
3.3.5	Schotten-Baumann-Reaktion	32
3.3.6	Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren	32
3.3.7	Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden	33
3.3.8	Darstellung von Amiden aus Anhydriden	33
3.3.9	Darstellung von Amiden aus Estern	33
3.3.10	Darstellung von Amiden aus Nitrilen	33
3.4	Carbonsäurehalogenide	34
3.4.1	Darstellung mit Thionylchlorid	34
3.4.2	Darstellung mit Oxalylchlorid	34
3.4.3	Darstellung mit Phosphorpentachlorid	34
3.4.4	Halogenidaustausch der Säurehalogenide	35
3.5	Anhydride	35
3.5.1	Darstellung mit Phosphorpentoxid	35
3.5.2	Darstellung aus Säurehalogeniden	35
3.5.3	Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung	35
3.6	Hydrazide	35
3.6.1	Stoffchemie	35
3.6.2	Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese	36
3.7	Orthoester	36
3.7.1	Darstellungsmöglichkeiten	36
3.8	Kohlensäurederivate	37
3.8.1	Darstellung von Phosgen	37
3.8.2	Reaktionen von Phosgen	37
3.9	Ketene	37
3.9.1	Darstellung	37
3.9.2	Reaktionen von Ketenen	38
3.10	Reaktionen von Carbonsäurederivaten	39
3.10.1	Reduktionen	39

4	Nitrile	41
4.1	Stoffchemie	41
4.2	Darstellung von Nitrilen durch S_N	41
4.3	Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden	42
5	Aminosäuren, Peptide	42


1 Aldehyde und Ketone

1.1 wichtige Vertreter

1.2 Technische Synthese Formaldehyd




1.3 Technische Synthese Acetaldehyd




1.4 Elektrophile Additionen


1.4.1 Protonierung von Carbonylen




1.4.2 Oligomerisierung/Polymerisation




Polymerisierung von Formaldehyd




1.5 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.




1.5.1 Hydrate




Die Hinreaktion ist begünstigt wenn kein sterisch gehindertes Molekül hydriert wird. Elektronenziehende Substituenten vorhanden sind. Die Rückreaktion ist begünstigt bei elektronenschiebenden Substituenten.

1.5.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.


1.5.3 Halbacetale/Acetale




Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nicht das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.5.4 Halbacetale/Acetale




Acetalspaltung




Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.




Dithioacetale




Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Sauerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung




Würde hier anstelle des Schwefels ein Sauerstoff sitzen, würde die REaktion nicht stattfinden. Schwefel ist weniger elektronegatativ und größer. Das Carbenium-Ion wird durch die d-Orbitale am Schwefel stabilisiert.

1.5.5 N,N-Acetale









1.5.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone




Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.


	Oxim	Hydrazon	2,4-Dinitrophenylhydrazin	Semicarbazon
Produkt				
Edukt	$\text{H}_2\text{N}-\text{OH}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$		

1.5.7 sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom


Sekundäre Amine und Ketone mit α -H-Atom reagieren zu Enaminen.




1.5.8 Cyanhydrine




1.5.9 Alkohole durch Grignard-Addition




Übersicht Grignard




1.5.10 Benzoinkondensation




1.5.11 Stetter Reaktion



Als Alternative zu Cyanid können Thiazoliumsalze als Katalysatoren verwendet werden.




1.5.12 Aminotriphenylmethanfarbstoffe




Oxidationsmittel für den letzten Reaktionsschritt können Bleioxid, Schwefelsäure oder schon Luftsauerstoff sein. Auxochrome Gruppen wie NH_2 , NHR , NR_2 , OH , OMe üben einen -M-Effekt auf die Triphenylmethanfarbstoffe aus und verstärken dadurch die Farbe. Ein Farbiges Stoff der chromophore Gruppen enthält (Gruppen weshalb er Farbig ist) ist nicht direkt ein Farbstoff. Erst durch die Einführung auxochromer Gruppen wird eine Farbiges Verbindung zum Farbstoff.

1.5.13 Wittig Reaktion

Reaktionsgleichung



Reaktionsmechanismus




Die Phosphoniumylide weisen unterschiedliche Stabilitäten auf. Dies sind nachfolgend aufgeführt.

Phosphoniumylid	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Alkyl}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{Ar}$	$\text{Ph}_3\text{P}^+-\text{CH}^--\text{CO}_2\text{R}$
Stabilität	labil	semistabil	stabil
Darstellung	in situ	in situ	separat

Die Darstellung der Phosphoniumylide mit verschiedenen Reagenzien führt zu unterschiedlichen Stereoselektivitäten.

Reagenzien	n-BuLi KO ^t Bu NaNH ₂ Na ⁺ ⁻ CH ₂ SOCH ₃	NaOEt NaOH _(aq)	NaOH
Stereoselektivität	≥ 90% Z-Isomer	Z/E-Gemisch	>90%E


1.5.14 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion



Das Wasserlösliche Phosphonat ermöglicht eine leichtere Abtrennung im Vergleich zur Wittig-Reaktion. Der Nachteil der HWE Reaktion ist, dass das Phosphonat im Abwasser nicht durch Mikroorganismen abgebaut.


1.6 Oxidationen und Reduktionen

1.6.1 Oxidation von Aldehyden



Diese Oxidation ist eine chemoselektive Oxidation gegenüber Doppelbindungen. Dies bedeutet es wird in einem Molekül nur eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall der Aldehyd, umgesetzt, andere bleiben unberührt. Als Oxidationsmittel eignen sich: CrO_3 , Ag_2O , H_2O_2 , KMnO_4 und Persäuren.


1.6.2 Oxidation von Benzaldehyd zur Perbenzoesäure



Der Kettenabbruch ist analog zur Radikalischen Substitution.


1.6.3 Baeyer-Villiger-Oxidation

Reaktionsgleichung




Cyclische Ketone reagieren analog und bilden ein Lacton.


Mechanismus




Handelt es sich um ein unsymmetrisches Keton, so gibt es folgende Wanderungstendenzen von Resten am ursprünglichen Carbonyl-Kohlenstoff zum Sauerstoff.




1.6.4 Clemmensen-Reduktion



1.6.5 Katalytische Hydrierung






Die Katalytische Hydrierung mit Raney-Nickel ist chemoselektiv und hydriert keine Doppelbindungen. Für die Hydrierung mit Platin gilt dies nicht.

1.6.6 Wolf-Kishner-Reduktion


Reaktionsgleichung




Dies ist eine Alternative wenn man die Clemmensen Reduktion mit Quecksilber umgehen will.

Mechanismus

Nachfolgend ist der Mechanismus ab dem Hydrazone gezeigt.




1.6.7 Reduktion mit Metallhydriden




LiAlH_4 reagiert heftig mit protischen Lösemitteln daher müssen bei Verwendung des Reduktionsmittels stets aprotische Lösemittel wie THF oder Diethylether verwendet werden. NaBH_4 hingegen hat eine größere Stabilität in protischen Lösemitteln und kann daher auch verwendet werden sofern sich die zu reduzierende Substanz nicht in aprotischen Lösemitteln löst.

1.6.8 Meerwein Ponndorf Verley Reduktion / Oppenheimer Oxidation




Mechanismus




1.6.9 Cannizzaro-Reaktion


Bilanzgleichung



Mechanismus




Gekreuzte Cannizzaro-Reaktion mit Formaldehyd




1.6.10 Leuchat-Wallach-Reaktion

Anderer Name: **Reduktive Aminierung von Ketonen/Aldehyden**

Bilanzgleichung




Mechanismus




1.6.11 Einelektronenreduktion

Pinakolkupplung




1.6.12 Enzymatische Reduktion



Die Reaktion ist chemoselektiv (reduziert in diesem Beispiel nur das Keton und nicht das Chlor) und enantioselektiv.

1.7 Reaktionen von Enolen und Enolaten


1.7.1 Allgemeines



Die Gleichgewichtslage bei Keto-Enol-Tautomerie ist abhängig von Substituenten und Lösemittel. In Polaren Lösemitteln überwiegt die Keto-Form, in unpolaren die Enol-Form.

1.7.2 Erzeugung von Nucleophilen Kohlenstoffen über Enolate


Die Erzeugung von Enolaten erfolgt über die Deprotonierung des α -H-Atoms. Benachbarte Elektronenziehende Gruppen stabilisieren das Enolat und sorgen für eine leichtere Deprotonierung.




Es gilt die Regel: Eine CH-Säure wird von einer äquimolaren Base zum größten Teil deprotoniert, wenn der pKs der CH-Säure kleiner ist als der pKs der konjugierten Säure der Base. Nicht Nucleophile Basen sind LTMP, LDA, LiHMDS, Nucleophile Basen sind t-BuLi, s-BuLi, n-BuLi und PhLi.

1.7.3 Halogenierung

Basenkatalysiert




Säurekatalysiert



Im Säuren entsteht nur das Monohalogenierte Produkt, da der -I Effekt des Halogenids verhindert, dass das Elektronenpaar der $\text{C}=\text{O}$ Doppelbindung zum Sauerstoff klappt.


1.7.4 Mannich Reaktion

Es handelt sich um eine Aminomethylierung (rot) und häufig mit einer nachfolgenden Hoffmann Eliminierung (blau).




1.7.5 Aldol Kondensation

Basenkatalysiert




Säurekatalysiert




1.7.6 Gekreuzte Aldolkondensation

Bei der gekreuzten Aldolkondensation können bis zu 4 Aldolprodukte entstehen. Um dies zu verhindern ist eine Carbonyl-Komponente **Enolisierbar** und die andere nicht. Nicht Enolisierbar ist zum Beispiel Benzaldehyd, da hier keine α -CH-Acidität vorliegt.

1.7.7 Claisen'sche Ester Kondensation




1.7.8 Dieckmann-Kondensation




1.7.9 Acetessigester-Synthese


Es handelt sich nicht um die Synthese von Acetessigester sondern dieser wird hier als Edukt verwendet! Die Reaktion bildet aus Claisen'schen-Ester-Kondensations-Produkten Ketone.




1.7.10 Säurespaltung von Claisen-Ester-Kondensations-Produkten



1.7.11 Malonester-Synthese




1.7.12 Darzens-Glycidester-Synthese




1.7.13 Knoevenhagel-Reaktion


Allgemein




Mechanismus



1.7.14 Michael Reaktion



1.7.15 Robinson Anellierung



2 Metallorganische Verbindungen

Metallorganische Verbindungen liegen nicht in der einfachen Schreibweise R-M, wobei M das Metall ist, vor. Stattdessen liegen sie als Aggregate in Lösung vor.




Abbildung 1: Tetramer des MeLi in Diethylether. Die Schreibweise bedeutet nicht, dass Kohlenstoff sechsbindig ist.

Das Aggregat sorgt dafür, dass jedes Metallkation seinen Elektronenmangel verringern kann. Neben Tetrameren können auch andere Geometrien vorkommen wie zum Beispiel Tetraeder.






Abbildung 2: Dimer von EtMgBr.

2.1 Reaktionen

2.1.1 Hydrolyse




Deuterierung über Grignard



2.1.2 Oxidation

Et₂Zn, Me₃B, Me₃Al sind pyrophor. MeLi, n-BuLi, RMgBr sind nur in Lösung unter Schutzgas handhabbar.


2.1.3 Reaktionen als C-Nucleophile



3 Carbonsäuren und Derivate

3.1 Stoffchemie der Carbonsäuren

Ameisensäure



Die Ameisensäure weist neben ihrer Carbonsäure-Gruppe noch einen Wasserstoff als Substituenten auf. Dadurch kann die Ameisensäure ebenso als Reduktionsmittel wirken.

Seifen

Seifen sind Alkalisalze langkettiger Carbonsäuren. Sie besitzen einen hydrophilen und einen hydrophoben Rest und sind daher amphiphil. Kernseifen sind Natriumsalze und Schmierseifen sind Kaliumsalze.




Abbildung 3: Natriumlaurat aus Dodecansäure.


Neben solchen Anionenseifen gibt es auch Kationenseifen z.B. aus Aminen. Die Darstellung von Carbonsäuren kann über Esterhydrolyse, Oxidation von Alkoholen und Methylaromaten und über das abfangen von Metallorganischen Verbindungen mit CO_2 erfolgen. Oxidationsmittel für die Oxidation von Alkoholen zu Carbonsäuren ist z.B. Natriumdichromat.

Carbonsäurehalogenide

Bei den Säurehalogeniden sind oft nur die Chloride in Verwendung. Alle anderen Halogene sind selten. Carbonsäurechloride sind die reaktivste Substanzklasse aller Carbonylverbindungen und Carbonsäuren, da das Chlor und das Carbonyl-Sauerstoff die Carbonylaktivität stark erhöhen.


Amide

Amide kommen vorallem in Proteinen und in synthetischen Polyamiden (Kunststoffen) vor.




3.2 Carbonsäuren

3.2.1 Allgemeine Reaktionsmöglichkeiten von Carbonsäuren




3.2.2 Hunsdiecker-Reaktion (Decarboxylierung)





Mechanismus



Kettenstart:



Kettenfortpflanzung:




Kettenabbruch



3.2.3 Decarboxylierung von β -Ketosäuren


Carbonylgruppen in Nachbarstellung zu Carbonsäuren begünstigen die Decarboxylierung.




3.3 Ester und Amide

3.3.1 Veresterung mit Diazomethan

Darstellung von Diazomethan




Veresterung mit Diazomethan




Die Veresterungsmethode ist mild unter neutralen Bedingungen und daher für Naturstoffisolierung sehr gut geeignet.

3.3.2 Bildung des tert-Butylesters als Schutzgruppe




3.3.3 Fischer-Veresterung

Der Veresterungs-Mechanismus besteht aus einer Abfolge einer Addition und anschließender Eliminierung.




3.3.4 Esterverseifung

Die Esterverseifung (alkalische Esterhydrolyse) ist irreversibel. Im Säuren liegt ein Gleichgewicht vor, da sie reversibel ist.




3.3.5 Schotten-Baumann-Reaktion


Die Schotten-Baumann-Reaktion ist eine Veresterung eines Säurehalogenids mit Alkoholen oder aminen zu Estern bzw. Amiden.




3.3.6 Direkte Amidbildung aus Carbonsäuren




3.3.7 Thermische Zersetzung von Ammoniumcarboxylaten zu Amiden




3.3.8 Darstellung von Amiden aus Anhydriden




3.3.9 Darstellung von Amiden aus Estern



3.3.10 Darstellung von Amiden aus Nitrilen




Mechanismus




3.4 Carbonsäurehalogenide


3.4.1 Darstellung mit Thionylchlorid




3.4.2 Darstellung mit Oxalylchlorid



3.4.3 Darstellung mit Phosphorpentachlorid




3.4.4 Halogenidaustausch der Säurehalogenide




3.5 Anhydride


3.5.1 Darstellung mit Phosphorpentoxid



3.5.2 Darstellung aus Säurehalogeniden




3.5.3 Darstellung von Anhydriden über in situ Aktivierung




3.6 Hydrazide



3.6.1 Stoffchemie



3.6.2 Hydrazinolyse bei der Gabriel-Synthese




3.7 Orthoester




3.7.1 Darstellungsmöglichkeiten

a) Williamsonsche Synthese




(1)


b) aus Nitrilen




3.8 Kohlensäurederivate



3.8.1 Darstellung von Phosgen




3.8.2 Reaktionen von Phosgen




Diese Reaktion kann auch mit doppelten Äquivalenten stattfinden und liefert dann das Triphosgen.

3.9 Ketene




3.9.1 Darstellung


a) Pyrolyse von Ketonen



b) aus Säurehalogeniden




c) aus α -Halogensäurebromiden




3.9.2 Reaktionen von Ketenen

Ketene reagieren als Superanhydride.


Reaktion mit Wasser



Reaktion mit Anilin



3.10 Reaktionen von Carbonsäurederivaten




Als Faustregel gilt, dass umso negativer die Abgangsgruppe X ist, desto bessere Acylierungsmittel sind die Carbonsäurederivate. Eine Ausnahme sind Thioester, welche reaktiver sind als Ester. Der Grund hierfür ist die geringe Mesomeriestabilisierung des Thioesters, da Schwefel ein größeres Atom ist als Sauerstoff und dadurch eine schlechte orbitalüberlappung zustandekommt.

3.10.1 Reduktionen

Einelektronen Reduktionen


Sowohl die Bouveault Blanc Reduktion als auch die Acyloin Kondensation können auch intramolekular stattfinden um Cyclen zu bilden. Die Bouveault Blanc Reduktion findet in protischen Lösemitteln statt und die Acyloin-Kondensation in aprotischen Lösemitteln.

1. Bouveault-Blanc-Reduktion




2. Acyloin-Kondensation


Reaktionsgleichung



Mechanismus




Reduktion mit komplexen Hydriden




Dieser Hydrid-Transfer ist Analog bei DIBAL (Diisobutylaluminiumhydrid), jedoch ist bei DIBAL bei tiefen Temperaturen die Isolierung des Aldehyds möglich, während $LiAlH_4$ bis zum Alkohol direkt reduziert.

Reduktion mit komplexen Hydriden




4 Nitrile

4.1 Stoffchemie




Acetonitril

dipolar aprotisches
Solvens




Propionitril




Benzonitril

4.2 Darstellung von Nitrilen durch $\text{S}_{\text{N}}2$



4.3 Darstellung von Nitrilen aus Säureanhydriden



5 Aminosäuren, Peptide