OC2 Reaktionen

14. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aldehyde und Ketone **2**

1.1 Elektrophile Additionen . . . 2

1.1.1 Protonierung von Carbonylen . . . 2

1.1.2 Oligomerisierung/Polymerisation . . . 2

1.2 Nucleophile Additionen . . . 2

1.2.1 Hydrate . . . 3

1.2.2 Bisulfit-Addukte . . . 3

1.2.3 Halbacetale/Acetale . . . 4

1.2.4 Halbacetale/Acetale . . . 4

1.2.5 N,N-Acetale . . . 6

1.2.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone . . . 6

1.2.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom . . . 7

1 Aldehyde und Ketone

1.1 Elektrophile Additionen

1.1.1 Protonierung von Carbonylen



1.1.2 Oligomerisierung/Polymerisation



1.2 Nucleophile Additionen



Häufig ist der nucleophilen Substitution eine Aktivierung der Carbonylgruppe vorgelagert.



1.2.1 Hydrate



1.2.2 Bisulfit-Addukte



Die Bisulfit-Addukte wurden in der Vergangenheit als Nachweis verwendet, da die kristallinen Feststoffe Aussagen über das zu analysierende Edukt der Reaktion geben.

1.2.3 Halbacetale/Acetale



Die Reaktion wird von Säuren katalysiert, sie beeinflussen nichr das Gleichgewicht. Unter Wasserentziehenden Bedingungen ist die Acetalbildung begünstigt.

Cyclische Halbacetale

1.2.4 Halbacetale/Acetale



Acetalspaltung



Acetale als Schutzgruppen

Acetale, besonders cyclische Acetale können als Schutzgruppe für Carbonsäuren dienen. Cyclische Acetale sind stabiler als acyclische, da die Entropieänderung $\Delta S = 0$ ist, während sie bei acyclischen Acetalen $\Delta S < 0$ ist.



Dithioacetale



Der Mechanismus ist analog zur Acetalisierung mit Saurerstoffen. Dithioacetale finden Anwendung in der Corey-Seebach-Umpolung

Corey-Seebach-Umpolung



1.2.5 N,N-Acetale



1.2.6 Imine, Oxime, Hydrazone, Semicarbazone



Die optimale Reaktionsgeschwindigkeit ist beim pK_s des Amins. Säureaktivierung der Carbonylverbindung beschleunigt die Reaktion, zuviel Säure ist kontraproduktiv, da das Amin vollständig protoniert wäre und damit nicht mehr nucleophil wäre.

Für alle anderen Stoffklassen gilt der Mechanismus analog.



1.2.7 sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom

Sekundäre Amine und Ketone mit α-H-Atom reagieren zu Enaminen.