## 単因子

行列に対し、行と列に対する変形を繰り返し行い対角成分以外を 0 とする。このとき、 対角成分を因子の順に並べたものを単因子という。

例えば、(2,6,18) など。

1.  $R = \mathbb{Z}$  として、次の行列の単因子を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 3 & 7 & 5 \\ -4 & 2 & 8 \end{pmatrix} \tag{1}$$

グラットントマボザルトナイン エロットントマボザルトナノンファルファル カゲミマ

行における変形は左から、列における変形は右からかけることにより行える。 次の行列  $P_1, \ldots, P_5$  を A にかけることにより行列の変形をおこなう。

$$AP_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ -4 & 14 & 16 \end{pmatrix}, \qquad P_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (2)

$$AP_1P_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 44 & -18 & 16 \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$
 (3)

$$P_3AP_1P_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -18 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -22 & 16 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$P_3AP_1P_2P_4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix}, \qquad P_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
 (5)

$$P_5 P_3 A P_1 P_2 P_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -18 \end{pmatrix}, \qquad P_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 (6)

よって、単因子は (-1,2,-18) である。

2.  $R = \mathbb{C}[x]$  として、次の行列の単因子を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} x - 2 & -1 & 0 \\ -1 & x - 2 & 0 \\ -1 & 1 & x - 3 \end{pmatrix}$$
 (7)

.....

$$P_1 A = \begin{pmatrix} 0 & (x-1)(x-3) & 0 \\ -1 & x-2 & 0 \\ 0 & -x+3 & x-3 \end{pmatrix}, \qquad P_1 = \begin{pmatrix} 1 & x-2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$
(8)

$$P_1 A P_2 = \begin{pmatrix} 0 & (x-1)(x-3) & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-3 \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & x-2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
(9)

$$P_1 A P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & (x-1)(x-3) \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & x-3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
(10)

$$P_{1}A = \begin{pmatrix} 0 & (x-1)(x-3) & 0 \\ -1 & x-2 & 0 \\ 0 & -x+3 & x-3 \end{pmatrix}, \qquad P_{1} = \begin{pmatrix} 1 & x-2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$
(8)  

$$P_{1}AP_{2} = \begin{pmatrix} 0 & (x-1)(x-3) & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-3 \end{pmatrix}, \qquad P_{2} = \begin{pmatrix} 1 & x-2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
(9)  

$$P_{1}AP_{2}P_{3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & (x-1)(x-3) \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & x-3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_{3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
(10)  

$$P_{4}P_{1}AP_{2}P_{3} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & x-3 & 0 \\ 0 & 0 & (x-1)(x-3) \end{pmatrix}, \qquad P_{4} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
(11)

これにより単因子は(-1, x-3, (x-1)(x-3))である。