
多項式環

可換環 R と文字 x を用いた形式的な有限和

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \qquad (a_i \in R) \tag{1}$$

を R 上の多項式という。

R 上の多項式全体の集合を多項式環 $R[x]$ と書く。

既約

多項式環 $R[x]$ において、 $f \in R[x]$ が可約であるとは、 $f = gh$ となる単元ではない $g, h \in R[x]$ が存在することをいう。

(単元とは逆元をもつ元のこと。)

f が可約でない時、既約であるという。

$f \in \mathbb{R}[x]$ を次のように定める。 f が $\mathbb{R}[x]$ において既約であるか否かを判定せよ。

1. $f = x + \sqrt{2}$

.....
ある $g, h \in \mathbb{R}[x]$ により $f = gh$ とする。
 $\deg f = 1$ より $\deg gh = 1$ である。 $\deg g \geq 0, \deg h \geq 0$ であるので、 $\deg g = 1, \deg h = 0$ または $\deg g = 0, \deg h = 1$ である。
 $\deg h = 0$ であれば、 $h \in \mathbb{R}$ である。 \mathbb{R} の元は全て逆元を持つので $f = gh$ となる場合、一方は単元となる。よって、 f は既約となる。

2. $f = 2x + 4$

.....
上記の問いと同様に $\deg f = 1$ より既約である。
 $f = 2(x + 4)$

3. $f = x^2 + 4x + 5$

.....
 f が可約であるとする。可約であれば $\deg g \geq 1, \deg h \geq 1$ となる $g, h \in \mathbb{R}[x]$ が存在し、 $f = gh$ となる。
 $\deg f = 2$ より、 $\deg g = \deg h = 1$ である。1 次多項式は $ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) の形をしているので、 $f(x) = (ax + b)(cx + d)$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) となる。この時、

$x = -\frac{b}{a}, -\frac{d}{c}$ を f に代入すると $f(x) = 0$ となる。

しかし、 $f = x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1 > 0$ であるので、 $f(x) = 0$ となる実数は存在しない。

よって、 f は既約多項式である。

4. $f = x^2 - 6x + 8$

.....

$f = (x - 2)(x - 4)$ であり、 $\deg x - 2 = \deg x - 4 = 1$ である為、 f は既約な多項式の積で表せる。

よって、 f は可約である。

5. $f = x^3 + 12x^2 - x + 1$

.....

$f = x^2(x + 12) - x + 1$ より次のように計算ができる。

$$f(-12) = (-12)^2(-12 + 12) - (-12) + 1 = 13 > 0 \quad (2)$$

$$f(-13) = (-13)^2(-13 + 12) - (-13) + 1 = -(-13)^2 + 14 < 0 \quad (3)$$

これにより -12 と -13 の間に実数 a が存在し、 $f(a) = 0$ となる。

代数学の基本定理により \mathbb{C} において f は複素係数の 1 次多項式の積に分解できる。

この複素係数の 1 次式の一つは実数 a を用いて $(x - a)$ である。

$\deg f = 3$ であるので、 $x - a, g \in \mathbb{R}[x]$ で $\deg x - a = 1$ 、 $\deg g = 2$ となる多項式により $f = (x - a)g$ と分解される。

よって、 f は可約である。

6. $f = x^4 + 12$

.....

$\deg f = 4$ であるので、 $f = gh$ と分解できるなら $\deg g = 1, \deg h = 3$ か $\deg g = \deg h = 2$ である。

任意の実数に対して $f = x^4 + 12 > 0$ であるので、 $f(a) = 0$ を満たす $a \in \mathbb{R}$ は存在しない。つまり、 $\deg g = 1, \deg h = 3$ となる多項式の積に分けられない。

$\deg g = \deg h = 2$ の場合を考える。
