

---

$G$  を群とする。

**共役類 (conjugacy class)**

$a \in G$  に対して、 $a$  を含む共役類を  $K(a)$  を書く。

$$K(a) = \{xax^{-1} \mid x \in G\} \tag{1}$$

$a, b \in G$  について  $b = xax^{-1}$  となる  $x \in G$  が存在するとき、 $b$  は  $a$  に共役 (conjugate) であるという。ここでは共役であるとき  $a \sim b$  と書く。共役は同値関係である。

.....

**中心**

$G$  の任意の元と可換な元全体の集合を  $Z(G)$  とかく。

$$Z(G) = \{a \in G \mid ab = ba \ (\forall b \in G)\} \tag{2}$$

$Z(G)$  は  $G$  の正規部分群である。この  $Z(G)$  を  $G$  の中心という。

.....

**中心化群**

群  $G$  の部分集合  $S$  の中心化群  $Z(S)$  は次で定義される。

$$Z(S) = \{g \in G \mid gs = sg \ (\forall s \in S)\} \tag{3}$$

特に部分群が要素一つだけの集合  $\{a\}$  であるとき、中心化群は  $Z(a)$  と書く。

$$Z(a) = \{g \in G \mid ga = ag\} \tag{4}$$

.....

**同値関係**

集合  $S$  において次の 3 つの性質をすべて満たす関係を同値関係という

- 反射律  $a \sim a$
- 対称律  $a \sim b$  ならば  $b \sim a$
- 推移律  $a \sim b, b \sim c$  ならば  $a \sim c$

.....

**正規部分群**

部分集合  $N \subset G$  について、 $gNg^{-1} \subset N \ (\forall g \in G)$  が成り立つとき、 $N$  を  $G$  の正規部分といい、 $N \triangleleft G$  と書く。

---

$G$  は群とする。

1. 共役が同値関係であることを示せ。

.....

$G$  を群とし、 $a, b \in G$  とする。

$a$  と  $b$  が共役  $\Leftrightarrow \forall x \in G \ b = xax^{-1}$

同値関係の 3 条件 (反射律、対称律、推移律) を確認する。

**反射律**

$e \in G$  を単位元とする。

$$eae^{-1} = eae = a \quad (5)$$

よって、 $a \sim a$  である。

**対称律**

$$a \sim b \Rightarrow b = xax^{-1} \Rightarrow x^{-1}bx = x^{-1}xax^{-1}x \Rightarrow x^{-1}bx = a \quad (6)$$

$$\Rightarrow a = x^{-1}bx \Rightarrow a = (x^{-1})b(x^{-1})^{-1} \quad (7)$$

$$\Rightarrow a = yby^{-1} \quad (y = x^{-1} \in G) \Rightarrow b \sim a \quad (8)$$

よって、 $a \sim b$  ならば  $b \sim a$  である。

**推移律**

$$a \sim b, b \sim c \Rightarrow b = xax^{-1}, c = bxx^{-1} \Rightarrow c = xxa x^{-1} x^{-1} \quad (9)$$

$$\Rightarrow c = (xx)a(xx)^{-1} \Rightarrow a \sim c \quad (10)$$

よって、 $a \sim b, b \sim c$  ならば  $a \sim c$  である。

以上により、共役  $\sim$  は同値関係である。

---

2. 次を示せ。

(a)  $a \in Z(G) \Rightarrow K(a) = \{a\}$ 。特に  $K(e) = \{e\}$

.....

$Z(G)$  は群  $G$  の中心である。

$$Z(G) = \{a \in G \mid ab = ba \ (\forall b \in G)\} \quad (11)$$

$a$  の共役類  $K(a)$  は次のような集合である。

$$K(a) = \{xax^{-1} \mid x \in G\} \quad (12)$$

$a \in Z(G)$  より、 $a$  は  $G$  の任意の元と可換である。よって、 $xax^{-1} = xx^{-1}a = ea = a$  であるので、 $K(a)$  の元は  $a$  のみになる。

単位元  $e \in G$  も  $e \in Z(G)$  であるから同様に  $K(e) = \{e\}$  である。

---

(b)  $G \triangleright N \Rightarrow N$  は  $G$  の共役類のいくつかの合併集合である。

.....

$n \in N$  とすると  $n \in K(n)$  である。つまり、 $\{n\} \subset K(n)$  であるから

$$N = \bigcup_{n \in N} \{n\} \subset \bigcup_{n \in N} K(n) \quad (13)$$

$n \in N$  の共役類  $K(n)$  の定義は

$$K(n) = \{xnx^{-1} \mid x \in G\} \quad (14)$$

であるから正規部分群  $N$  に含まれ、 $K(n) \subset N$  を満たす。

つまり、

$$\bigcup_{n \in N} K(n) \subset N \quad (15)$$

である。

よって、次の式を満たす。

$$N = \bigcup_{n \in N} K(n) \quad (16)$$

3.  $a \in G$  に対し、 $f : G \rightarrow K(a)$  を  $f(x) = xax^{-1}$  とする。このとき、次を示せ。

(a)  $f$  は全射

.....

任意の  $K(a)$  の元は  $gag^{-1}$  ( $g \in G$ ) という形をしている。

よって、 $f(g) = gag^{-1}$  となる  $g \in G$  が存在する為、 $f$  は全射である。

(b)  $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x, y$  は  $G/Z(a)$  の同じ類に属する

.....

$f(x) = f(y)$  とする。

$f(x) = xax^{-1}$ ,  $f(y) = yay^{-1}$  より  $xax^{-1} = yay^{-1}$  である。

右から  $x$ 、左から  $y^{-1}$  をかけると  $y^{-1}xa = ay^{-1}x$  である。

$y^{-1}xa = ay^{-1}x$  より  $y^{-1}x \in Z(a)$  である。

よって、 $G/Z(a)$  上で  $y^{-1}x = e$  である為、 $x = y$  である。

これを逆にたどると  $x, y$  が  $G/Z(a)$  同じ類に属することから  $f(x) = f(y)$  を示せる。

4. 定理 1.7.1 より  $|K(a)| = (G : Z(a))$  が示せたので、これを  $h_i$  と置いた。

$(G : Z(a))$  は  $G$  の元の数  $|G|$  を  $Z(a)$  の元の数  $|Z(a)|$  で割った値を意味するので、 $(G : Z(a)) = |G| \div |Z(a)|$  である。このとき、必ず割り切れるようになっている。  
 $h_i = (G : Z(a_i))$  と置けば、 $h_i \times |Z(a_i)| = |G|$  であるので、 $h_i$  は  $|G|$  を割り切る数である。

---

5.  $g = |G|$ ,  $h_i = K(a_i)$  とする。

集合の直和  $G = \bigsqcup_{i=1}^t K(a_i)$  から  $g = h_1 + \cdots + h_t$  である。

.....  
 集合の直和  $G = \bigsqcup_{i=1}^t K(a_i)$  は  $G = \bigcup_i K(a_i)$  かつ任意の 2 つの元  $a_i, a_j$  について  $K(a_i) \cap K(a_j) = \emptyset$  である。

$G$  の位数は  $|K(a_i)|$  の和になっているので、 $g = h_1 + \cdots + h_t$  である。

---

6.  $h_1 = |K(e)|$  とすれば、 $h_1 = 1$  である。

.....  
 $K(a)$  は次のように定義されている。

$$K(a) = \{xax^{-1} \mid x \in G\} \tag{17}$$

単位元  $e \in G$  は  $G$  の任意の元を常に可換である。つまり、 $\forall g \in G$  に対して  $geg^{-1} = gg^{-1}e = ee = e$  である。

これにより  $K(e) = \{e\}$  であるから  $|K(e)| = 1$  である。

---