

\mathbb{C}^\times の部分群 H を次のように定める。

$$H = \{z \in \mathbb{C}^\times \mid z^6 = 1\}, \quad \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad (1)$$

1. 次の中で H に属する複素数を全て選べ。

$$1, -1, i, -i, \sqrt{3}i, -\sqrt{3}i \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}i, \frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}i, -\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}i, -\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}i \quad (4)$$

.....
 $z^6 = 1$ を満たす複素数を探す。

全ての複素数はオイラーの公式から $re^{i\theta}$ と表せる。 $(re^{i\theta})^6 = r^6 e^{6i\theta}$ であり、 $e^{2\pi ni} = 1$ であるので、 $r = 1$, $6\theta = 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) を満たせばよい。

$$1 = e^{i0}, -1 = e^{i\pi}, i = e^{\frac{\pi}{2}i}, -i = e^{\frac{3\pi}{2}i}, \sqrt{3}i = \sqrt{3}e^{\frac{\pi}{2}i}, -\sqrt{3}i = \sqrt{3}e^{\frac{3\pi}{2}i} \quad (5)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i = e^{\frac{5\pi}{3}i}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i = e^{\frac{2\pi}{3}i}, \quad (6)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i = e^{\frac{\pi}{3}i}, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i = e^{\frac{4\pi}{3}i} \quad (7)$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}i = e^{\frac{7\pi}{4}i}, \frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}i = e^{\frac{\pi}{4}i}, \quad (8)$$

$$-\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}i = e^{\frac{3\pi}{4}i}, -\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{1}{2}\sqrt{2}i = e^{\frac{5\pi}{4}i} \quad (9)$$

これにより $r = 1$ でない数 ($\pm\sqrt{3}i$) や $6\theta = 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) を満たさない数 ($\pm i, \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$) は H に含まれない。

よって、 H に含まれる数は次の通り。

$$1, -1, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}i, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}i \quad (10)$$

2. H の要素数を求めよ。

.....
 代数学の基本定理により $z^6 = 1$ を満たす複素数は最大で 6 つだが、先程の答えより次の数は式を満たす。

$$z = e^0, e^{\frac{\pi}{3}i}, e^{\frac{2\pi}{3}i}, e^{\pi i}, e^{\frac{4\pi}{3}i}, e^{\frac{5\pi}{3}i} \quad (11)$$

よって、 H の位数は 6 である。

3. H が巡回群であるか否かを答えよ。

.....
 H のすべての元は $(e^{\frac{\pi}{3}i})^k$, $(k = 1, \dots, 6)$ と表せる。

つまり、 $H = \langle e^{\frac{\pi}{3}i} \rangle$ であるので巡回群である。

問題

1. $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。任意の整数 k に対して、 $\bar{k} \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ を k の n による剰余とする。このとき、 $\phi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ を $k \mapsto \bar{k}$ とすると、 ϕ は準同型写像であることを示せ。

.....
 準同型写像である為には $f(a+b) = f(a) + f(b)$ を示せばよい。

$a, b \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\bar{a} = a + n\mathbb{Z}$, $\bar{b} = b + n\mathbb{Z}$ である。これにより次の式が成り立つ。

$$f(a) + f(b) = \bar{a} + \bar{b} = a + n\mathbb{Z} + b + n\mathbb{Z} = a + b + n\mathbb{Z} = \overline{a+b} = f(a+b) \quad (12)$$

よって、写像 f は準同型写像である。

2. $\phi: \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow D_4$ を $(i, j) \mapsto r^i s^j$ とすると ϕ は同型写像であることを示せ。

.....
 D_4 は 4 次二面体群

$$\langle r, s \mid r^4 = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\} \quad (13)$$

ではなく、位数 4 の二面体群

$$\langle r, s \mid r^2 = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle = \{e, r, s, rs\} \quad (14)$$

として扱う。

.....
 二面体群 D_4 は次のような元を持つ可換群である。

$$D_4 = \langle r, s \mid r^2 = s^2 = e, rs = sr^{-1} \rangle \quad (15)$$

$$= \{e, r, s, rs\} \quad (16)$$

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は偶数を $\bar{0}$ 、奇数を $\bar{1}$ とする群で直積は次のような集合である。

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{(\bar{0}, \bar{0}), (\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{1})\} \quad (17)$$

成分ごとの和を演算として群を成す。

$$(\bar{a}_1, \bar{b}_1) + (\bar{a}_2, \bar{b}_2) = (\overline{a_1 + a_2}, \overline{b_1 + b_2}) \quad (18)$$

写像 ϕ は次のような対応を取るので全単射である。

$$(\bar{0}, \bar{0}) \mapsto e, (\bar{1}, \bar{0}) \mapsto r, (\bar{0}, \bar{1}) \mapsto s, (\bar{1}, \bar{1}) \mapsto rs \quad (19)$$

また、次により準同型写像でもある。

$$f(\bar{a}_1, \bar{b}_1) + f(\bar{a}_2, \bar{b}_2) = r^{a_1} s^{b_1} r^{a_2} s^{b_2} = r^{a_1 + a_2} s^{b_1 + b_2} = f(\overline{a_1 + a_2}, \overline{b_1 + b_2}) \quad (20)$$

以上より、 ϕ は同型写像である。
