

Appunti di Algebra e Geometria

Ettore Forigo

Chapter 1

Insiemi

1.1 Cardinalità di Insiemi Finiti

$|A| = n \in \mathbb{N}$ dove n è il n° di elementi in A .

1.2 Multiinsiemi o Sistemi

Insieme con molteplicità, ovvero una collezione non ordinata di elementi con ripetizioni.

$$[a, b, c]$$

1.3 Insiemi Famosi

\mathbb{N} = Numeri Naturali = $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$

\mathbb{Z} = Numeri Interi

\mathbb{Q} = Numeri Razionali

\mathbb{R} = Numeri Reali

\mathbb{C} = Numeri Complessi

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$\mathbb{Q}^x = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

$\mathbb{R}^x = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\mathbb{C}^x = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

1.4 Definizione di Sequenza (o Ennupla / n-upla)

Collezione ordinata di elementi.

$$(a, b, c)$$

$$\begin{aligned}(a, b) &:= \{\{a\}, \{a, b\}\} \\ (a, a) &= \{\{a\}, \{a, a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\}\end{aligned}$$

Chapter 2

Relazioni

2.1 Definizione di Relazione

Si dice che $R \subseteq A \times B$ è una relazione tra due insiemi A e B .

Se:

$$C = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$$

Si scrive:

$$b_1 = C(a_1)$$

$$b_2 = C(a_2)$$

2.1.1 Proprietà delle Relazioni

Totalità a Sinistra

Una relazione R tra A e B si dice **ovunque definita** (o totale a sinistra) se:

$$\forall x \in A. \exists y \in B : (x, y) \in R$$

Funzionalità

Una relazione R tra A e B si dice **funzionale** se:

$$\forall x \in A. \exists y \in B : (x, y) \in R \implies \exists! y \in B : (x, y) \in R$$

2.2 Definizione di Funzione

Una relazione f si dice funzione se è funzionale e ovunque definita.

“Funzione” si riferisce alla terna: associazione di elementi, dominio e codominio, non solo all’associazione di elementi. Specificare solo un’associazione non definisce una funzione: occorre specificare anche dominio e codominio. Infatti, due funzioni che hanno una “stessa” associazione di elementi ma diverso dominio e/o diverso codominio sono funzioni diverse.

Si scrive:

$$f : A \rightarrow B$$

dove A è il dominio di f e B è il codominio di f .

2.2.1 Proprietà delle Funzioni

Iniettività

Una funzione da A a B si dice **iniettiva** se:

$$\forall x, x' \in A. f(x) = f(x') \implies x = x'$$

Suriettività

Una funzione da A a B si dice **suriettiva** (o totale a destra) se:

$$\forall y \in B. \exists x \in A : y = f(x)$$

(equivalentemente: $im(f) = codom(f)$)

Biiettività

Una funzione si dice **biiettiva** (o biiezione, o anche corrispondenza 1 a 1 o biunivoca) se è sia iniettiva che suriettiva.

Osservazione:

$$f : A \rightarrow B \text{ è biiettiva } \implies |A| = |B|$$

A e B possono essere infiniti.

$$|X| < |Y| \iff \exists \text{ una funzione iniettiva } X \rightarrow Y \wedge \nexists \text{ una biiezione } X \rightarrow Y.$$

2.2.2 Definizione di Immagine

L’insieme di tutti i valori di $f : A \rightarrow B$ valutata in ogni elemento di un insieme $S \subseteq A$ si dice l’immagine di S tramite f :

$$f[S] = f(S) := \{f(s) \in B : s \in S \subseteq A\} \subseteq B$$

$$\text{Im}f = \text{im}(f) = f[A]$$

L'immagine del dominio di una funzione f tramite f si dice immagine di f .

Il valore di $f : A \rightarrow B$ valutata in $x \in A$ si dice immagine di x tramite f .

$$\text{im}(f) \subseteq \text{codom}(f)$$

2.2.3 Definizione di Controimmagine

L'insieme degli elementi del dominio di una funzione $f : A \rightarrow B$ che f associa a tutti gli elementi di S si dice controimmagine, preimmagine o immagine inversa di S tramite f :

$$f^{-1}[S] = f^{-1}(S) := \{x \in A : f(x) \in S \subseteq B\} \subseteq A$$

2.2.4 Definizione di Restrizione

Detta anche restrizione del dominio o restrizione a sinistra.

$$f : A \rightarrow B, X \subseteq A$$

Si dice restrizione di f ad X la funzione:

$$\begin{aligned} f_X : X &\rightarrow B \\ f_X(x) &= f(x) \quad \forall x \in X \end{aligned}$$

O equivalentemente:

$$f_X : X \rightarrow B = \{(a, b) \in f : a \in X\}$$

O ancora:

$$f_X : X \rightarrow B = f \circ i$$

Dove $i : X \rightarrow A$ è l'inclusione di X in A data da $i(a) = a$.

2.2.5 Definizione di Troncatura

Detta anche corestrizione, restrizione del codominio o restrizione a destra.

Data $f : A \rightarrow B \wedge \text{Im}(f) \subseteq Y$, si dice **troncatura** di f ad Y la funzione:

$$f^Y : A \rightarrow Y = \{(a, y) \in A \times Y : y = f(a)\}$$

Osservazione:

Il codominio viene ristretto.

In generale prima si restringe e poi si tronca una funzione.

2.2.6 Composizione

L'elemento b che compone in $(g \circ f)$ è unico $\forall a \in A$.

2.3 Strutture Algebriche

2.3.1 Definizione di Operazione Binaria

Sia U un insieme. Si dice **operazione binaria** una funzione $o : U \times U \rightarrow U$.

2.3.2 Definizione di Struttura Algebrica

Una **struttura algebrica** è una n -upla data da un insieme ed una o più operazioni su di esso:

$$(U, o)$$

2.3.3 Definizione di Associatività

Si dice che $*$ è associativa se $\forall a, b, c \in A. a * (b * c) = (a * b) * c$.

2.3.4 Definizione di Elemento Neutro

Sia $(A, *)$ un insieme con una operazione binaria (magma):

$$\begin{aligned} * : A \times A &\rightarrow A \\ (a, b) &= a * b \end{aligned}$$

Si dice che $e \in A$ è un **elemento neutro** per $*$ se:

$$\forall a \in A. e * a = a * e = a$$

2.3.5 Definizione di Inverso, Inverso Destro e Inverso Sinistro

Se $(X, *)$ ammette elemento neutro e si dice che $\forall x \in X$:

$$\begin{aligned} x' &\text{ è inverso destro di } x \text{ se } \exists x' \in X : x * x' = e \\ x'' &\text{ è inverso sinistro di } x \text{ se } \exists x'' \in X : x'' * x = e \\ x''' &\text{ è inverso di } x \text{ se } x''' \text{ è inverso destro di } x \wedge x''' \text{ è inverso sinistro } x. \end{aligned}$$

2.3.6 Definizione di Commutatività

Si dice che $*$ è commutativa se $\forall a, b \in A. a * b = b * a$.

2.3.7 Definizione di Monoide

$(A, *)$ (magma) è detto **monoid** se $*$ è associativa (semigrupp) e ammette elemento neutro.

2.3.8 Definizione di Gruppo

$(A, *)$ è detto **gruppo** se è un monoid \wedge ogni elemento di A ammette inverso (necessariamente unico, destro e sinistro, solitamente indicato con a^{-1}).

2.3.9 Definizione di Gruppo Abelliano

$(A, *)$ è detto **gruppo abelliano** o commutativo se oltre ad essere un gruppo, $*$ è commutativa.

2.3.10 Definizione di Sottrazione

La sottrazione è definita come somma con l'opposto di un elemento in $(\mathbb{Z}, +)$.

$$a - b = a + (-b)$$

2.4 Definizione di Successione

Una funzione f si dice successione se:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow A$$

2.5 Matrici

Matrice $m \times n$ a coefficienti in \mathbb{K} : $Mat_{m,n}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^{m,n}$

Elementi $a_{i,j}$

$m \neq n \rightarrow$ matrice rettangolare

$m = n \rightarrow$ matrice quadrata

$$A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K})$$

\ = diagonale principale
 / = diagonale secondaria

2.5.1 Matrici quadrate particolari

Triangolare superiore

$$a_{i,j} = 0 \quad \forall i > j$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Triangolare inferiore

$$a_{i,j} = 0 \quad \forall j > i$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{pmatrix}$$

Diagonale

$$a_{i,j} = 0 \quad \forall i > j$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Scalare (Diagonale)

$$\text{con } a_{i,i} = k \in \mathbb{K}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

Identica (o identità) di ordine n (Scalare con $k = 1$)

$$a_{i,i} = k$$

$$I_n$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

Nulla $\underline{0}$

$$a_{i,j} = 0 \quad \forall i, j$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.5.2 Matrice Trasposta

$$A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K})$$

Matrice trasposta di A:

$$A^T$$

Righe e colonne scambiate.

$$a_{i,j} = a_{j,i}$$

$$A = (A^T)^T$$

$$A = A^T \implies A \text{ è simmetrica, } A \text{ è quadrata}$$

2.5.3 Somma tra matrici

Somma elemento per elemento (per matrici di dimensioni uguali)

$(Mat_{m,n}(\mathbb{K}), +)$ è un gruppo abelliano.

2.5.4 Prodotto per scalare

Proprietà

Distributivo rispetto all'addizione

2.5.5 Prodotto righe per colonne

Proprietà

Non commutativo

Associativo

Distributivo rispetto alla somma

$$A \cdot B = \underline{0} \not\Rightarrow A = \underline{0} \vee B = \underline{0}$$

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

2.5.6 Calcolo del determinante

Solo per matrici quadrate.

$$|A|$$

$$\det(A)$$

$$2 \times 2$$

Differenza prodotto diagonali

$$3 \times 3 \text{ (Sarrus)}$$

Differenza (somme prodotti diagonali e prodotti sovradiagonali).

Se A è triangolare superiore il determinante è il prodotto della diagonale

Regola di Laplace

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K}), n \geq 2$$

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \cdot |A_{i,j}|$$

Dove $A_{i,j}$ è la matrice ottenuta da A togliendo ad A la i -esima riga e la j -esima colonna.

Il valore $(-1)^{i+j} |A_{i,j}|$ è detto complemento algebrico di $a_{i,j}$.

Osservazione:

Il termine $(-1)^{i+j}$ indica che se la somma degli indici di riga e colonna è dispari, il segno nella somma va cambiato, altrimenti va mantenuto.

Osservazione:

Si può applicare Laplace per righe / colonne qualsiasi, ma per snellire i conti conviene scegliere righe / colonne con il maggior n° di 0.

Proprietà dei Determinanti

$$|I_n| = 1$$

$$|A| = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Quando A è triangolare / diagonale (anche rispetto alla diagonale secondaria, anche se in quel caso non si chiama triangolare / diagonale)

$$|A| = |A^T|$$

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

Osservazione:

In generale non vale per la somma.

Se in A c'è una riga / colonna nulla, allora $|A| = 0$

Scambiando righe e colonne il determinante cambia di segno.

Se una riga / colonna è combinazione lineare di altre righe / colonne, allora $|A| = 0$ e viceversa.

Definizione di Combinazione Lineare

Quando una riga / colonna si può scrivere utilizzando le altre righe / colonne combinate solo con operazioni di somma / prodotto e/o prodotto per scalare.

Osservazione:

Se una riga / colonna è multipla di un'altra riga / colonna allora è una sua combinazione lineare.

Sommando a una riga / colonna una combinazione lineare delle altre righe / colonne il determinante non cambia.

2.5.7 Definizione di Matrice Singolare

Una matrice quadrata si dice non singolare se il suo determinante è $\neq 0$. Altrimenti si dice singolare.

2.5.8 Definizione di Matrice Inversa

Si dice inversa di A , se \exists , la matrice A^{-1} tale che:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Osservazione:

Sia $A \in Mat_n(\mathbb{K})$, $\exists A^{-1} \iff |A| \neq 0$

Cioè A ammette inversa se e solo se A è non singolare.

Calcolo della Matrice Inversa (Metodo del Complemento Algebrico)

Data $A = (a_{i,j}) \in Mat_n(\mathbb{K})$ si dice aggiunta di A la matrice $A_a \in Mat_n(\mathbb{K})$ ottenuta sostituendo in A ogni elemento col suo complemento algebrico (c).

$$c_{i,j} = (-1)^{i+j} |A_{i,j}|$$

$$|A| \neq 0 \implies A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A_a^T$$

2.5.9 Rango

Definizione di Minore di Ordine p

Data una matrice $A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K})$ si dice minore di ordine p una matrice quadrata di ordine p ottenuta da A sopprimendo $n-p$ colonne e $m-p$ righe.

Definizione di Rango

Data una matrice $A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K})$ dire che il rango di A è p :

$$\left(\begin{array}{l} rg(A) = p \\ r(A) = p \\ \rho(A) = p \end{array} \right)$$

$$\text{con } p \leq \min(m, n)$$

significa dire che A ha un minore non singolare di ordine p , e che ogni eventuale minore di ordine $p+1$ è singolare.

$$r(A) = 0 \iff A = \underline{0}$$

$$\text{Se } A \in Mat_n(\mathbb{K}) \text{ allora } r(A) = n \iff |A| \neq 0$$

$$A \text{ ha rango massimo} = A \in Mat_n(\mathbb{K}), r(A) = n$$

$$1 \leq rg(A) \leq \min(m, n), A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K}), A \neq \underline{0}$$

Teorema degli Orlati (Teorema di Kronecker)

$$A \in Mat_{m,n}(\mathbb{K}).$$

Il rango di A è $p \iff \exists$ in A un minore di ordine p (M_p) non singolare \wedge ogni minore di ordine $p+1$ che contiene completamente M_p è singolare.

Definizione di Contiene Completamente

Che ha al suo interno.