

古中医炁脉油象痧象分类表

分型大类		分型说明	油象	油象配图	痧象	痧象配图
炁	炁虚	强调因心神外驰、房事劳倦、年老体衰、饮食失调、久病耗伤、先天不足等引起的炁能匮乏	色淡青，质稀		不易出痧，痧色淡红，有红点，分布不均	
	炁损		色炭黑，质较稠		痧象可见黑白色块夹杂，分布不均	
	脉堵炁滞	强调因情志不舒、饮食失调、过度安逸、外伤闪挫等引起的炁行不畅	色青黄，质稠呈冻状		痧象深红色，伏于皮下，分布不均	
	毒痹炁滞		色绿，质稠		痧色暗红，伏于皮下，无光泽感，分布不均	

毒	炁足外毒 亢盛	强调因饮食失调引起的外毒亢盛，或兼具炁虚病因引起的炁能匮乏，多犯及六腑、皮部	色深灰，质较稠		痧色偏亮红，有光泽感	
	炁虚外毒 亢盛		色淡灰或灰（炁虚程度引起深浅差异），质较稀		痧色偏红，无光泽感	
	炁足内毒 亢盛	强调因饮食失调、情志过激等引起的内毒亢盛，或兼具炁虚病因引起的炁能匮乏，多犯及五脏、经络	色黑，质稠呈糊状		痧色暗黑，片状或斑块状	
	炁虚内毒 亢盛		色白或浅褐（炁虚程度引起深浅差异），质较稠		痧色暗红，片状或斑块状	

脉	炁虚脉堵	强调因炁能不足、饮食失调、 过度安逸等引起的血运不畅	色青黄，质较稀		不易出痧，痧色鲜红， 有血泡，分布不均	
	外毒亢盛脉堵		色深灰，质稠呈糊状		痧色鲜红，有血泡，分 布不均	
	内毒亢盛脉堵		色黑，质稠呈冻状		痧色乌黑，有血泡，分 布不均	
	炁虚外毒亢盛脉堵		色淡灰或灰（炁虚程度引起深浅 差异），质较稠		痧色偏红，无光泽感， 有血泡，分布不均	

	炁虚内毒 亢盛脉堵		色白或浅褐（炁虚程度引起深浅差异），质稠呈糊状		痧色暗红，片状或斑块状，分布不均	
	后天直接 损伤或先 天缺损	强调因跌仆金疮、先天缺损等引起的脉道损伤	色灰，质稠如糊状		不易出痧，痧色淡红，分布不均	
邪	毒邪两盛	强调因外感邪炁（病毒、细菌等）引起的邪炁亢盛，兼具内毒亢盛病因引起的体毒亢盛，该类邪炁需借毒而存	色深灰，质稠呈糊状		痧色深红，伴有血泡	
	邪盛	强调因外感邪炁（物理场能，成瘾物质）引起的邪炁亢盛，该类邪炁可独立自存	色灰绿，质较稀		痧象色块异形	

规律：①证型由虚到实，痧象颜色逐渐变深，油象颜色也逐渐变深且质地逐渐变稠；②脉道有瘀堵，色块就会散在，分布不均。